



DDb7

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF LONDON

Accession Number

Press Mark

LIEUTAUD, J.
vol. 2

209

65536/A

CONFIDENTIAL

S6

COMPENDIO
DELLA
MEDICINA PRATICA,
CHE CONTIENE
L'ISTORIA DELLE MALATTIE,
E LA MANIERA DI TRATTARLE:

CON OSSERVAZIONI , E RIFLESSIONI CRITICHE
INTORNO AI PUNTI PIU' RILEVANTI

DEL SIGNOR
GIUSEPPE LIEUTAUD,

MEDICO DI MONSIGNORE IL DUCA DI BORGOGNA ,
E DEGL' INFANTI DI FRANCIA :

MEMBRO DELL'ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE,
E DELLA SOCIETA' REALE DI LONDRA .

TRADOTTO DALLA LINGUA FRANCESE.

TOMO SECONDO.



NON-MEDICAL
SOCIETY

IN VENEZIA , MDCCLXXIV.

Presso GIAMBATISTA PASQUALI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI , E PRIVILEGIO .

GOVERNMENT

OF THE

REPUBLIC OF THE UNITED STATES

OF AMERICA

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LANDS

WASHINGTON, D. C.

1890

NO. 1

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1889

AND

THE PROCEEDINGS OF THE

LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1889

AND

THE PROCEEDINGS OF THE

LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1889

AND

THE PROCEEDINGS OF THE

LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1889

AND

THE PROCEEDINGS OF THE

LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1889

TAVOLA DEGLI ARTICOLI,

Che contengono le malattie esterne.

TOMO SECONDO.

SEZIONE PRIMA.

Malattie generali, e quelle, che non hanno alcuna sede particolare assegnata.

G Rassezza eccessiva. pag.1	Scirro, e cancro.	23
L' Atrofia. 2	Aneurisma, e varici.	28
L' Emorragia. 6	Tumori insaccati.	31
Flemmone, e abscesso. 8	Sarcoma, porri, e corni.	33
Ulcera, e fistola. 11	Morso, e puntura d' animali.	35
Il bubbone. 15	Idrofobia, e tarantola.	40
Il Carbonchio. 18	Contusioni, e piaghe.	44
Il chiodo, e l' epinittide. 20	La Scottatura.	49
Edema, e enfisema. 21	La Cancrena.	51

SEZIONE II.

Malattie esterne della Testa.

C efalalgia. 54	Malattie degli occhi.	67
Insolazione. 58	del naso.	80
La Commozione. 60	dell' orecchie.	85
La Pavoride. 62	della bocca.	89
Il Gozzo. 64	L' Angina.	100
Rossor di viso. 65		

SEZIONE III.

Malattie del tronco, e dell' estremità.

P leuritide spuria. 105	li.	112
Nefritide spuria. 106	Malattie dell' ano.	126
Ernie. 107	delle estremità.	134
Malattie delle parti genita-	delle ossa.	146

SEZIONE IV.

Malattie della cute:

V izi del sudore.	152	L' Elefantiasi.	163
Morbo pedicolare.	154	La Resipola.	164
Macchie della cute.	155	La Scarlattina.	166
Volatiche, e prurito.	158	La Rosolia.	167
La rogna.	160	Il Vajuolo.	170
Rogna lebbrosa.	162		

Le Sezioni seguenti contengono le malattie delle
Donne, e dei Fanciulli.

SEZIONE PRIMA.

Quelle del Sesso.

A ffezione isterica.	177	delle donne di parto.	199
Gusto depravato.	183	delle mammelle.	207
Colori pallidi.	184	delle parti genitali.	209
Sconcerto de' menstrui.	185	Falsa gravidanza.	215
La sterilità.	192	Fluor bianco.	220
Mali delle Donne gravide.	193		

SEZIONE II.

Malattie dei Fanciulli.

G eneralitadi.	223	Vermi.	239
Colostrazione.	226	Ventre teso.	241
La febbre.	227	L' Ernie.	ivi.
L' Atrofia.	228	Il calcolo.	242
Idropisia, e itterizia.	229	Vizi dell' ano.	ivi.
Il celtico.	230	Convulsioni.	243
Lo scorbuto.	231	Aste.	245
Le scrofole.	232	La dentificazione.	246
La tosse.	233	L' Idrocefalo.	248
Il vomito.	235	La rachitide.	250
Dolori colici.	236	Male di coscia.	251
Scioglimento del ventre.	237	Malattie della cute.	254
Costipazione.	238		



COMPENDIO
DELLA
MEDICINA PRATICA

RISGUARDANTE LE MALATTIE ESTERNE .

SEZIONE PRIMA.

*Le malattie generali, e quelle, che non hanno
alcuna sede particolare assegnata .*

GRASSEZZA ECCESSIVA .



Quantunque un tale stato (*obesitas*) non venga sempre considerato come un' infermità, tuttavia non è manco da temersi, non solo a motivo degli accidenti, ch'ei minaccia, come la morte subitanea, l'apoplezia, l'idropisia, l'asma, e somiglianti; ma eziandio per gl' incomodi abituali, che ne sono inseparabili, come lo stentare a muoversi, l'oppressione ad ogni leggiero esercizio, ec. Il grasso, che in tal circostanza s'accumula nel basso ventre, e intorno al cuore, che vi è come sepolto, non può se non se nuocere alle funzioni vitali, e naturali, ed inceppare la circolazione: una tal verità potrebbe essere stabilita dalla sola ispezione

dei cadaveri, qualora non venisse troppo dimostrata da una fatale esperienza.

In questa trasmodata grassezza niente di meglio può farsi dello scemarsi la quantità degli ordinarij alimenti, del dormir manco del consueto, del fare esercizio, o di lavorare in alcuna cosa faticosa: non se ne ricaverà mai ugual profitto dai *purganti*, dai *diuretici*, e dai *sudorifici*, rimedj messi ugualmente in opera, e che però non lasciano di far del bene. Gli alimenti debbon essere poco nutritivi, e aromatizzati: a molti giova il farvi entrare gli anaci, e il finocchio; ma l'aceto, e singolarmente quello di *Scille* pare, che abbia più, che ogn'altra cosa giovato. Certuni colla stessa mira hanno fatto uso dell'acqua del mare; ma oltre l'esser la medesima disgustosissima, il farne uso non è cosa punto indifferente. In questo caso dobbiamo far gran conto delle *fregagioni*, delle *stuse*, e d'altri mezzi, che eccitano il sudore. Il tabacco non meno a fumare, che a masticare, e gli altri salivanti, posson dar qualche ajuto: lo *ptialismo* stesso promosso dai mercuriali molte volte ha prodotto buon effetto; ma tutti non si sottoscrivono a un tal rimedio.

L' ATROFIA.

Così denominano la malattia contraria, vale a dire, l'*estrema magrezza* di tutto il corpo: vien chiamata anche *marasmo*, *tabe*, ec. Importa il non confondere, come molti hanno fatto, l'*atrofia essenziale*, o *primitiva*, con quella, che è semplicemente il sintoma d'un altro male: bisogna altresì distinguere la *consumazione dei giovani* dal *marasmo dei vecchi*, malattie, che si somigliano soltanto negli effetti loro. L'*atrofia essenziale*, che per conseguenza non dipende da alcun altro mal noto, è assai più rara dell'altra. I disgusti, le cure, l'amore, e le altre passioni violente, vi danno motivo: viene ancora dopo eccessive fatiche, lunghe astinenze, l'abuso di liquori spiritosi, lo stravizzo delle donne, ec. Questo emaciamento è usuale nei giovani, che vi danno assai sovente motivo colla frequente effusione spermatica: gl'Inglese, e gli Olandesi vi vanno soggetti più che ogn'altra Nazione. Il *marasmo dei vecchi* rade volte nasce dalle indicate cagioni, ma è prodotto dal disseccamento dei vasi, sebbene vien talora conservato in essi da qualche intacco delle
visce-

viscere. L'*atrofia sintomatica*, che è comunissima, è la conseguenza della maggior parte dei mali cronici, e d'alcuni acuti. Le suppurazioni, l'ulceri, gli scirri, ed altri sconcerti interni; la dissenteria ostinata; gli antichi scioglimenti di ventre; la salivazione; i sudori abituali, e il diabete, son le cagioni ordinarie della medesima: le affezioni ipocondriache, scorbutiche, scrofulose, ec. parimente la producono: ella è eziandio l'effetto d'alcuni veleni, ec. dal che risulta, che appartiene a parecchi altri Articoli.

L'uno, e l'altro marasma alquanto avanzati, sono accompagnati dalla *febbre lenta*: con frequenza sull'esempio di molti Scrittori vien questa presa per la malattia principale: veramente ella è cosa assai comoda il ridurre a una sola denominazione numero grandissimo di malattie malagevolissime a distinguersi; ma io domando, se un tal metodo sia vantaggioso per i poveri pazienti? Io farò anche osservare di passaggio, come fuor di proposito vien creduto, che la febbre non possa chiamarsi *lenta*, se non dopo 40. ovvero 50. giorni: gli accurati Pratici non debbono ignorare, che veggonfi con grandissima frequenza febbri di questo carattere, le quali, anzichè essere così antiche, finiscono prima dell'accennato termine: i melancolici soprattutto ce ne somministrano frequenti esempj. Il da me detto potrà prendersi peravventura per una logomachia; ma in Medicina non è da spregiarsi; imperciocchè si può egli ignorare, che molti, i quali l'esercitano, seguano al letto dei pazienti le idee, che nascono dalla denominazione, che a caso i medesimi hanno dato alla malattia?

E' spesso sommamente difficile il distinguer l'*atrofia essenziale* dalla *sintomatica*: non se ne può giudicare con qualche certezza, se non dalla più esatta istoria circostanziata a dovere di ciò, che è preceduto, e dal più scrupoloso esame del presente stato del male: avvegnachè queste due specie d'emaciamento talora si somigliano perfettamente, e sieno anche seguite dai medesimi accidenti. Nulladimeno la consunzione primitiva in alcune circostanze ha delle intermissioni vere, ed anche ben lunghe; lo che non segue mai nella *sintomatica*: nella prima la febbre non si manifesta, se non dopo che la malattia ha fatto un tal progresso: non manca l'appetito, e nel suo principio il respiro è liberi simo;

ma in progresso ad ogni menomo esercizio s'inceppa : il polso si fa più sensibilmente febbrile la sera , che la mattina : molti si lagnano d'informicolamenti , ed anche di dolori lungo la spina , d'una dolorosa gravezza di testa , del tintinno dell'orecchie : alcuni patiscono polluzioni notturne , o una perdita involontaria di seme , che gli precipita in uno strano spoffamento : sopravviene la svogliatezza : il ventre , che fino allora era stato infingardo , si scioglie talvolta a dismisura ; e quella diarrea , che addimandasi *colliquativa* , accompagnata il più delle volte da sudori dell'indole stessa , precipita i pazienti in un orrido abbandono , che talora toglie loro l'uso stesso delle gambe : la pelle del viso finalmente si dissecca , divien livida , o verdastra , si affila il naso , s'incavernano le tempie : da tale concorso nasce ciò , che addimandasi *faccia ipocratica* , che corrisponde all'orrido emaciamento dell'altre parti . L'*eufia* dei vecchi di rado è accompagnata da tutti questi sintomi : i suoi progressi son meno rapidi , ma guidano con più sicurezza al sepolcro : alcuni cadono nell'idropisia , altri hanno un pizzicore per tutto il corpo , che non lascia loro un momento di riposo ; tutti perdono il gusto degli alimenti , e per lo più si muojono in una gran calma , e talora eziandio senza che se l'aspettino : tuttavia il fine loro viene con frequenza annunziato dalla cancrena , che si comunica al di fuori , o da altri accidenti , che sono i prodotti dell'atrofia .

Il *marasmo essenziale* , che perciò non dipende da alcuno sconcerto interno , si risana assai familiarmente , quando non è invecchiato : si è osservato , come nella maggior parte dei giovani finiva in capo ai sette anni ; ma talora accade , che prima di questo termine s'intacchi il petto , e seguano degli stravasamenti nelle cavità della testa , del petto , e del basso ventre . Gli esacerbamenti della febbre , la diarrea , ed i sudori colliquativi , le orine oleose , l'estremo abbandono , e la faccia ipocratica annunziano la morte : la febbre acuta , che termina il più delle volte , l'atrofia sintomatica , nell'essenziale e più rara .

Tutte le aperture dei cadaveri , delle quali trovo l'istoria , non risguardano se non quasi l'atrofia sintomatica ; ed io stenterei molto a scegliere ciò , che s'adatta al mio soggetto , se non m'ajutassero le mie proprie osservazioni . Trovansi delle concrezioni fango-

fe nel cuore, e nelle arterie grandi: le vene quasi piene d'aria: il cuore riarso, e alcuna volta esulcerato; le viscere lacere, e scolorite: incordamenti più, o meno considerabili nelle cavità, e singolarmente nel cervello, e nella midolla spinale: stivamenti al polmone, o altrove: vermi nelle prime vie. Si è veduta in un emaciamento dei più compiuti una quantità sorprendente di grasso nel mesenterio, nell'epiploon, e nelle altre parti del basso ventre, che ne sono suscettibili. Ciò, che più particolarmente si osserva nei vecchi, riguarda le ossificazioni delle cartilagini, dei tendini, dei ligamenti, delle arterie, delle valvole del cuore, della falce, della tenda del cerebello, ec. per non parlare dell'alterazione delle viscere, che incontrasi solo per accidente: finalmente ho veduto in un soggetto, il cui stomaco, e il pancreas erano scirrofi, le membra, tuttochè fredde, conservare tutta la loro flessibilità. Si vede bene, come la maggior parte dei da me enunciati sconcerti debbon esser considerati, come il prodotto del morbo, che forma il soggetto di questo Articolo.

In questo luogo radissime volte è necessario il cavar sangue: vi si debbono impiegare gli emetici, e i purganti, quando lo vuole lo stato delle prime vie: fuori di questo caso dobbiamo dargli con gran riserva: tuttavia lo stomaco dev'esser considerato, come la cucina di questo morbo; ed appunto per ricovrarne le sue funzioni facciamo uso degli stomachici, degli amari, e dei fortificanti: tali sono i cedri, la china-china, l'assenzio, i marziali, e le acque minerali, che partecipano della loro natura. Gli emettanti, i temperanti, i depuranti, e gli antiscorbutici; gli addolcenti, e i rinfrescanti, come le creme d'orzo, e di riso, le gelatine, i brodi di pollo, di gamberi, di chiocciole, e di tartaruga; il latte, il siero, le emulsioni, ec. sono gli alimenti, e i rimedj, che convengono all'atrofia, allorchè lo stomaco ne permette l'uso. Sono spesso necessari i calmanti: la canfora, il liquore anodino minerale, la polvere temperante, ec. son quelli, che si amministrano con più sicurezza. Le pittime stomachiche, i bagni, le fregagioni, sono accessori, che possono essere proficui. Ultimamente si ritrae vantaggio grande dal divertimento, dal mutar aria, dal piacevole esercizio, e singolarmente dal cavalcare, ec. La maggior parte di questi rimedj può applicarsi al ma-

rasmo dei vecchi , e ritardarne gli avanzamenti : ma si deve molto più insistere sopra gli analettici , e specialmente sul vino , ch' è , come suol dirsi , il latte de' vecchi .

L' EMORRAGIA.

Quantunque abbiamo destinato varj Articoli per le emorragie , che con più frequenza ci si offrono nella Pratica , non lasceremo tuttavia di collocare in questo alcune osservazioni generali , non meno per ischivare le ripetizioni , che per introdurvi alcuni lumi , dei quali gli altri non sono suscettibili . Il naso , i bronchi , lo stomaco , le budella , le parti genitali d'ambi i sessi , le emorroidi , e le varici delle gambe , l'alveolo dei denti estratti , e le piaghe , sono la sede delle più considerabili emorragie . Il sangue può anche scolare dagli occhi , dalle orecchie , dalle labbra , e da tutte le parti della bocca ; dalle mammelle , dal bellico , dall'anguinaia , dall'orecchie , e dalle estremità , per non far parole dei sudori sanguigni : tutti questi casi però sono assai rari , e lo sborso del sangue non può esser gran fatto eccessivo .

I giovani , le persone di temperamento sanguigno , e bilioso ; gli uomini più vigorosi , quei , che son inclinati alla collera , i grandi bevitori , coloro , che vivono nell'abbondanza , e finalmente gli scorbutici , sono i più sottoposti all'emorragie . L'aria calda , e umida , l'uso d'alimenti con aromi , e di liquori spiritosi , le fatiche penose , ec. vi dispongono . L'emorragie del polmone , dello stomaco , dei reni , della vescica , e della matrice delle donne incinte , sono le più da temersi : quelle del naso , delle emorroidi , e della matrice , sono più spesso utili , che dannose , massime quando sono periodiche ; per non parlar delle critiche , ch' è noto , esser la strada , che prende la natura per la guarigione di molti morbi acuti . L'emorragie , che vengono da accidenti , come da una percossa , da una caduta , ec. son poco da temere : quelle , che suppliscono ai corsi mestruali , o seguano per la via dello stomaco , del polmone , o d'altre strade , non debbon farci paura : quanto alle altre , posson precipitare nella gonfiezza , nell'idropisia , nella tifezza , nel marasmo , ec.

Ognun sa , esser cosa imprudente il fermar troppo presto un'emorragia ; ma è molto difficile il decidere
fino

fino a qual segno si dee lasciar colare il sangue: si può dire intorno a ciò, che si commettono più falli col fermarlo troppo presto, che col lasciarne sgorgar soverchio; essendo cosa rarissima, che altri muoja di un' emorragia, e per lo contrario non v' essendo cosa più comune degli sconcerti, che seguono il suo troppo pronto cessamento: lo stato del polso, e le debolezze sono indizj poco certi, veggendosi alla giornata uomini robustissimi cadere in sincope a una mezza cavata di sangue; e se si ha da credere a tutti gli osservatori, si può perdere in pochissimo tempo dalle 20. fino alle 40. libbre di sangue, senza morire; ma se si resiste a uno sborso di sangue sì prodigioso, non si ha egli motivo di temerne le conseguenze, veggendosene ogni giorno delle orridissime, dopo emorragie molto lontane da questi eccessi? Gli sborsi di sangue, sì accidentali, che abituali, o periodici, cessano comunemente di per sé; ma se sono eccessivi, richieggono ajuto; è altresì necessario per le emorragie frequenti, e irregolari delle quali debbonsi temere perpetuamente le conseguenze.

S' impedisce l' emorragia con aprir la vena, e con le mignatte, coi rinfrescanti, tanto farinosi, che acidi, e nitrosi; con i temperanti, e con gli assorbenti; col siero, ec. Quando altri n'è minacciato, deve starsi in quiete, e vivere frugalmente, astenersi soprattutto da alimenti riscaldanti, dal vino, dai liquori spiritosi, e dal caffè: fanno anche ad alcuni gran bene i bagni. L' emorragia eccessiva, e attuale richiede altri rimedj: vi si impiegano i calmanti, e gli antispasmodici; ma i loro effetti sono sì lenti, che non vi si può far fondamento: si ritrae molto maggior vantaggio dalle cavate di sangue, dalle legature ai polsi, ed ai malleoli, dalle fregagioni nelle parti lontane, dall' immersione di queste parti stesse nell' acqua calda ec. Si fa ancora uso dei topici astringenti, e degli stittici per quelle emorragie, che ne sono suscettibili: si applicano dei pezzi di tela inzuppati nell' acqua fredda, nell' aceto, o nell' officrate, intorno al collo, allo scroto, ec. senza però trascurare i rimedj interni, come la polvere dell' *Elvezio*, composta d' allume, e di sangue di drago, ec. ma io torno a dirlo, tutti questi astringenti, sì interni, che esterni non si debbono mettere in opera, salvo che nei casi pressanti, e quando è in pericolo la vita del paziente. Non parlo della *polvere*

simpatica, perchè nota a chicchessia, e i Medici non hanno bisogno d'essere disingannati rispetto alle chimeriche proprietà che le vengono attribuite.

FLEMMONE, E ABSCESSO.

L'innalzamento, la tensione lucida, ed il rossore in una parte d'una certa estensione; il dolore sovente pulsativo, ed il calore manifestano a sufficienza il tumore infiammatorio denominato *flemmone*: la resipola, che più vi si avvicina, s'innalza meno, si stende di più, ed occupa la sola pelle: il bubbone ha la sua sede nelle glandule: il carbonchio, e il furuncolo, sono spezie di flemmoni, che hanno i loro segni particolari: i geloni, e i patercelli investono le sole estremità; per non far parola d'alcuni altri tumori infiammatorj, che nascono dalle scottature, dal morso, e dalla puntura d'animali, e che avranno i loro Articolli rispettivi. Quando l'infiammazione non s'innalza in tumore per formare ciò, che addimandasi flemmone, se le dà il nome di *flogosi*; ma si varia molto rispetto all'applicazione, che vien fatta di questi termini. L'infiammazione dell'una, e dell'altra specie è d'ordinario prodotta da un vizio del sangue, o degli umori; nasce la medesima talora da cagione esterna: la febbre più, o meno considerabile, che l'accompagna, può eccitare grandissimi sintomi, a cagion d'esempio, il delirio, l'oppressione, le ansietà, ec. Partecipa talora il flemmone della resipola, dell'edema, e dello scirro: va a finire il più delle volte colla risoluzione, o colla suppurazione: in alcune circostanze precipita in cancrena, o s'indurisce, e divien scirroso.

L'*abscesso* è la conseguenza più ordinaria del *flemmone*, e d'altre infiammazioni interne: noi ce lo dobbiamo aspettare, quando il dolore, il calore, e la pulsazione s'aumentano fino al quarto giorno: se è superficiale, la cute si rilaschia, il centro del tumore si fa bianco, e sentesi una molto manifesta fluttuazione: ma la cute non muta il colore, e si sienta a sentire il liquido, se l'*abscesso* è situato profondamente: allora la suppurazione è più tarda; ciò non ostante la maturità della marcia può essere indicata dal cessamento dei dolori, dell'infiammazione, e d'altri accidenti. Abbiamo detto, che gli *abscessi* interni ci venivano indicati da bri-
vidu-

vidure irregolari ; ma gli esterni ne risvegliano più di rado : la febbre accompagna l'aumento degli uni, e degli altri : bisogna anche un certo grado di calor febbrile per la formazione della marcia ; e si è con grandissima frequenza osservato , che la sua assenza , o la sua debolezza rendeva imperfetta la suppurazione , e che allora il tumore poteva prendere il carattere di scirro : e ugualmente da temersi la veemenza della febbre : ritarda questa la suppurazione , e talvolta eccita la cancrena .

Il flemmone non è pericoloso , quando il soggetto non è nè cachetico , nè scorbutico , nè scrofoloso , nè infetto di celtico ; ma può avere conseguenze tristi , allorchè partecipa d'alcuno dei divisati morbi . Se il dolore , e il calore cessano in un subito , e che il tumore appassisca prima del tempo usuale , si deve temere per le parti interne . Se il tumore va insensibilmente indurendosi , si corre pericolo , come dicemmo , che divenga scirroso : se è livido , e se vi si innalzano delle pustule , siamo minacciati dalla cancrena : si fa bene , come gli abscessi superficiali , che s'innalzano in punta , imbiancano , e scoppiano sovente per se medesimi . Abbiamo fatto osservare altrove , che gli abscessi interni , i quali si disseccano , danno talora motivo a deposizioni verso la cute : può seguir lo stesso degli abscessi esterni , la cui marcia talvolta vien riassorbita per iscagliarsi sul fegato , sul polmone , e sopra le altre viscere . Accade ancora , che negli uni , e negli altri la materia purulenta riassunta dai vasi prenda la via del secesso , delle orine , ec. Sonosi veduti abscessi sul petto , che comunicavano con quelli della capacità ; e una tal comunicazione non segue , senza che ne restino intaccate le costole . Sonosi negli abscessi trovate pietre , spilli , aghi , reste , ossi , spine , palle di piombo , lombrici , ec.

Vuole il flemmone sul principio cavate di sangue più , o meno numerose , secondo la sua estensione , il grado del calore , e della febbre . Fa d' uopo tenere in tutti i tempi il ventre obbediente ; ma i purganti non vi vengono gran fatto messi in opera , se non quando lo richiede lo stato delle prime vie , o quando i pazienti sono cachetici ; tuttavia posson essere atti ad impedir la metastasi , che talora minaccia le viscere . Gli umettanti , i rinfrescanti , e i temperanti , come il siero , l'acqua d'orzo , la limonata lunga , le
emul-

emulsioni nitate, ec. vi si pongono molto in opera. La violenza dei dolori ci forza a ricorrer talora ai calmanti; ma questo dee farsi con gran riserva. Sonosi anche amministrati i diaforetici, e i vulnerarij, allorchè hannolo voluto le circostanze. Ma il punto principale della medicatura consiste nei topici: tali sono gli emollienti, e gli anodini, i risolutivi, e i digestivi: dee regolar poi la scelta, e la combinazione dei medesimi lo stato del tumore, più o meno doloroso, tendente alla risoluzione, o alla suppurazione. I cataplasmi col latte, e colla midolla di pane, colle radici di pazienza, e di malva, colle foglie d'acetosa, di malva, di brodo bianco, con le mucilaggini, i fichi, i grassi, gli olj, ec. sono i più acconci ad ammolliare: quelli, che si preparano con i fiori di camomilla, di meliloto, e di sambuco, colle farine di segale, di comino, e di fiengreco, ec. passano per risolutivi. Si fa finalmente entrare in quelli, che son destinati a favorire la suppurazione, oltre le cipolle ordinarie, e quelle di giglio, il levito istantio, l'unguento basilico, quello della madre, ec. Talvolta s'iano necessitati a render *calmanti*, sì gli uni, che gli altri per atturar la violenza dei dolori, coll'aggiungervi 15. o 20. grani d'oppio; ma bisogna far questo con moltissima circospezione per non dar motivo alla cancrena: si dee altresì temer l'uso dei *percussivi*, i quali possan far degenerare il tumore in scirro, come ci ha con grandissima frequenza fatto toccar con mano il tristo evento.

Quando dai segni espolti si rileva, che l'*abscesso* si trova nella sua *maturezza*, non si dee lasciar d'aprirlo o con istrumento tagliente, e col caustico: si dee preferir l'uno all'altro di questi mezzi secondo la cognizione delle parti, lo che appartiene alla Chirurgia, la quale insegna parimente a dirigere acconciamente l'incisione. Se si apre l'*abscesso* acerbo, se ne ritarda la guarigione: se si lascia covar soverchio la marcia, si espongono ad intaccarsi le parti adjacenti: importa infinitamente il fare tali attenzioni non meno per l'*abscesso* della gola, e dell'ano, che per quelli, che trovansi situati sopra i ligamenti, sul perioftio, e su le future: quei che son piantati sul petto, e nel basso ventre, che per conseguenza possono aprirsi entro le loro cavità, richiedono le medesime diligenze. Si medica l'*abscesso* aperto coll'unguento basilico, col mon-

difica-

disficcativo d'appio, coll'unguento della madre, col diaquilon, e con altri unguenti e detergenti, secondo che gli orli stivati richieggono, che si conservi la suppurazione: negli altri casi, in cui ci proponghiamo di dissecare, si fa uso del diapalma, dell'impiaastro di Norimberga, ec. ma sembra, che la natura sia più laboro della natura, che dell'arte. Se il flemmone, e l'abcisso sono il prodotto d'un altro male, non vi è dubbio, che non si debba ricorrere ai rimedj, che se gli addicono: esporremo in altri Articoli quei, che convengono all'ulcera, allo scirro, alla cancrena, che possono, come indicammo, esser le conseguenze del flemmone.

ULCERA, E FISTOLA.

Non vi è dubbio, che si debban distinguer l'*ulceri*, che sono la conseguenza del flemmone, della resipola, del bubbone, e dello scirro, da quelle, che sono il prodotto delle piaghe, della contusione, della scottatura, dei caustici, della cancrena, ec. ma importa anche di vantaggio il fare delle ricerche intorno al vizio del sangue, o degli umori, scorbutici, celtici, scrofolosi, o cancerosi, che posson conservarle. Le *fistole* non differiscono dalle ulceri, che per i seni, e andirivieni, che la marcia vi scava; dal che risulta, che la loro bocca è più angusta del loro fondo; le fistole dell'ano, e la lacrimale sono le più famose; e noi ne parleremo altrove.

Le ulceri recenti nei soggetti giovani, e di buona costituzione, massime quando vengono in conseguenza del flemmone; si risanano facilmente, ma non segue lo stesso di quelle, che si portano in un'età avanzata, che sono il prodotto della resipola, dell'edema, dello scirro, o che s'incontrano in soggetti cachetici, scorbutici, infetti, di celtico, o scrofolosi. Si sa, che le ulceri del naso, della gola, delle mammelle, delle parti genitali, sono le più ostinate: le putride, le verminose, quelle, che gettano una marcia fetente, collosa, sciolta, sanguigna: verdastrea, o di qualsivoglia altro reo colore: le ulceri, i cui contorni sono roversciati, la cui carne è molle, bavosa, o fungosa, livida, verdastrea, nera, ec. le fagedemiche, le fistolose: quelle finalmente, che gettano una sanie oleosa, e nericciosa, sono di pari sommamente difficili a curarsi, anzi per

lo più assolutamente incurabili . L' emoragia delle ulceri è perpetuamente da temersi : la marcia riafforbita , e che infetta gli sputi , le dejezioni , e le orine , è di un reo augurio . Le ulceri di vecchia data precipitano con frequenza nel marasmo , e nella febbre lenta : tuttavia rendono talora salutari ai vecchj ; anzi è per essi uno sfogo , che non si potrebbe seccare , senza esporli a pericoli i più fatali ; e l' apertura dei cadaveri ci ha spesso manifestato i disordini , che ne erano la conseguenza . Tutto il da noi esposto rispetto alle ulceri , si dee applicare eziandio alle fistole , le quali , generalmente parlando , son d' una più difficile guarigione , e richiedono quasi sempre la mano del Chirurgo : quelle , che penetrano fino ai tendini , alle cartilagini , e alle ossa , sono le più ostinate , e sovente incurabili . Si può fare il medesimo giudizio delle fistole , che comunicano colla capacità del ventre , o del petto .

Ognun sa , che in medicando le ulceri , altri si propone di scaricarle per mezzo della suppurazione , di detergerle , e di cicatrizzarle : ma non sono i professori sempre d' accordo rispetto ai mezzi , che posson procurare questi vantaggi ; poichè si dubita meno sopra l' effetto dei topici , di quello si faccia dell' altro , di quello , cioè , dei rimedj interni . Senza entrare in un fatto esame , mi contenterò di proporre i più approvati , e la cui efficacia par confermata da un lunghissimo uso . Tali sono : 1. *I digestivi* , come l' olio d' iperico , di giglio , e di rosso d' uovo , la storace , la trementina , i balsami naturali , quello del Lucattelli , del Commendatore , ec. l' unguento basilico , quello della madre ; l' impiastro *diachylum* , di mucilaggine , ec. topici , che sembrano più atti a eccitare la suppurazione , e a conservarla . 2. *Gli addolcenti* , e gli *anodini* , che posson rimediare ai dolori , ai pruriti , e all' aridezza delle ulceri : tali sono il decotto di brodo bianco , di nenofar , di solano , e delle teste di papaveri , le mucilaggini , il burro , e la crema di latte , l' olio di giglio , e di camomilla , la midolla di pane , e gli altri cataplasmi emollienti , l' unguento d' altea , l' *album rhabdis* , il ponsolice , e il *populeum* , il cerotto di Galeno , e l' impiastro di spermaceti . 3. *I deterfivi* , come il decotto d' orzo , delle piante vulnerarie , dell' aristolochia , delle foglie di noce , ec. Le acque di Balaruc , di Plombières , e di Baresges , di Monte d' oro , de la Motte e al-

e alcune altre termali; il mondificativo d'appio, l'unguento degli Apostoli, il balsamo verde, quello dell'*arceo*, ec. 4. I *disseccanti*, e i *cateretici* atti a liberar l'ulceri dalle umidità soverchie, e a distruggere le carni bavose, e le callosità: tali sono l'acqua di calcina, l'iride di Firenze, la sabina, l'ocrea, la cerusa, il litargirio, la tuzia, l'allume calcinato, i precipitati, l'unguento egiziaco, il pontolice, il balsamo verde, la tintura di mirra, e d'aloë, l'acqua fagedenica, il collirio del Lanfranco, l'olio di canfora, la pietra da cauterio, l'internale, e altri caustici, l'impiastrò di Norimberga, ec. 5. Gli *astringenti*, che posson rimediare alla troppo copiosa suppurazione, e all'emoragia: si ascrive tal proprietà alle rose rosse, ai balausti, alla scorza di mele granate, al sangue di drago, al bolo, all'allume, al vetriolo, all'acqua stittica, al cerotto di pietra calaminare, ec. Si oppone anche all'emoragia l'agarico, la legatura, la compressione, ec. Tali sono i topici posti più familiarmente in uso per le piaghe, ma si deve scivare la loro troppo frequente applicazione; imperciocchè viene ai dì nostri accordato, che bisogna *curar di rado* le piaghe, non solo per non esporle troppo all'impressione dell'aria, ma eziandio per non interrompere l'operazione della natura, sempre più certa di quella dell'arte. Si è talvolta veduto, che un *cauterio* applicato alla parte opposta, allorchè l'ulcera non era conservata dalla carie, era riuscito a maraviglia: veramente è questo un cambiare un'ulcera per un'altra; ma il vantaggio è dalla parte di quella, che si colloca, ove si vuole, ed alla quale si danno dei confini.

Le ulcere callose, le fistolose, come quelle, che trovansi colla carie, o colla cancrena, vogliono la mano Chirurgica: rispetto alle prime bisogna consumare le callosità con li *scarotici*: non si può fare a meno di scuoprire il fondo delle fistolose, per applicarvi l'adequato rimedio: le iniezioni sono indubitatamente utilissime per le ulcere sinuose, e per le fistole: ma rade volte se ne viene a capo per un tal mezzo: si dee ricorrere al taglio, per ingrandire il loro ingresso, e vederne il fondo; bisogna consumare le callosità con i *cateretici*, fare sfogliare le ossa cariate, ec. Parleremo con più precisione di questa medicatura negli Articoli della fistola dell'ano, e della lagrimale. S'investe la

carie col cauterio attuale, colla raschiatura, coll' euforbio, e con altri rimedj, che riporteremo a suo luogo. Si combatte la cancrena con iscarificar fino al vivo, coll' acquavite canforata e con altri liquori spiritosi, de' quali parleremo nel rispettivo Articolo. Finalmentee siamo sovente forzati di venire all' estirpazione, o all' amputazione per le ulcere cancerose, di pari che per quelle, che sono unite alla carie, e alla cancrena.

Per quanto efficaci esser possano gli ajuti divisati, divengono inutili, qualora non ci applichiamo a scoprire il vizio originario, o acquistato, che conserva le ulcere, e se non s' investe con rimedj interni; si può conoscere il vizio scorbutico, il celtico, e lo scrofoloso; ma vi sono altri stati più difficili a scuoprirsì, i quali non vi frappongono minor ostacolo; e questa considerazione non riguarda più le ulcere, di quello riguarda le altre malattie, le cui complicazioni cagionano sempremai grande imbarazzo. Sarabbe dunque inutile il riportare in questo luogo tutti i rimedj interni, che possono aver luogo nella medicatura delle ulcere; noi possiamo cavargli degli altri Articoli, ed in questo ci contenteremo d' additar quelli, che vengon più spesso praticati: tali sono adunque la cavata del sangue (è noto, ch'è atta ad attutare la flogosi, e la resipola, che circondano con assai frequenza le piaghe) i vomitivi, e i purganti, la retta amministrazione dei quali assicura il buon effetto degli altri rimedj. Dopo tale operazione, il latte, le creme d' orzo, di riso, ed altri addolcenti, sono con frequenza messi in opera: si fa anche grand' uso degli allentanti, dei temperanti, e dei deparanti, come del siero, delle acque acidule minerali, della pazienza, della cicoria, del fumosterno, del crescione, dei gamberi, ec. Soprattutto non si dee trascurare l' uso interno dei vulnerarij, e dei deterfivi, come dell' iperico, dell' agrimonia, della buglia, della brionia, della verbena, del piè di leone, e d' altre piante di tal qualità: del miele, dell' acqua di calcina, dei balsami naturali, e artefatti, e di tutte le specie di trementine: si possono mettere in questa classe le acque di Bonnes, quelle di Barege, di Monte d' oro, d' Aix-la Chapelle, e altre termali: si è pure messa in opera con buono evento la cina, la salapariglia, le vipere, l' antimonio diaforetico, ed altri rimedj, che mandano alla cute: non sono stati dimenticati i cordia-

diali, gli assorbenti, gli aperienti, gli squaglianti, ec. I dotti Pratici fanno ben conoscere i casi, che vogliono alcuno dei divisati rimedj; e basta loro soltanto porgli sotto gli occhi. Abbiamo detto, che bisognava guardarsi bene dal voler guarire le antiche ulceri, che i vecchj portano alle gambe, o altrove; per lo contrario fa di mestieri, allorchè mostrano di volersi seccare, aver l'attenzione di rinnovargli colla genziana, l'iride di Firenze, le canterelle, ec.

IL BUBBONE.

E' questo un tumore infiammatorio circoscritto, accompagnato il più delle volte da dolore, da calore, e da pulsazione: ha il medesimo la sua sede nelle glandule, sì dell'anguinaja, che delle ascelle, del collo, ec. Distinguousi tre specie di bubboni, cioè il semplice, il venereo, e il pestilenziale, ai quali possiamo aggiungere lo scorbutico, e lo scrofoloso, molto più rari, d'ordinario scirrofi, e che non son per lo più situati nell'anguinaja. Il bubbone semplice, ch'è a un di presso della grandezza d'un uovo, occupa d'ordinario le glandule dell'anguinaja, e di rado quelle delle ascelle: sovente è accompagnato dalla febbre, e il più delle volte termina senza ajuto, ed assai speditamente per via di risoluzione: in alcuni però indugia molto a risolversi, o a suppurare, e degenera anche in fistola: vi sono molto soggetti i fanciulli, e i giovani. Il bubbone venereo, che varia grandemente, non meno per i suoi progressi, che nella sua durata, fiorisce solamente nell'anguinaja, e dopo un commercio impuro: occupa questo una, o più glandule, ora d'un lato solo, ora di tutt' e due, e la sua grossezza eccede talora quella del pugno: questo bubbone è tanto più facile a guarirsi, quanto più s'avvicina al flemmone; ma se partecipa dell'edema, e dello scirro, è sommamente ostinato, e a motivo d'una rea medicatura può degenerare in fistola, o in cancro; è il medesimo un sintoma certo del malfrancese, se comparisca lungo tempo dopo aver avuto commercio con una donna infetta, vale a dire dopo più mesi, o più anni; ma se si manifesta più presto, cioè, alcuni giorni dopo il commercio sospetto, chechè se ne dicano molti, non ci dà alcuna certezza del celtico. Importa sommamente l'osservare, in occasione del bubbone venereo, che il dolore

lore intenso dell'uretra nella gonorrea, o nella stranguria violenta, può eccitare nelle glandole inguinali una gonfiezza, che non lascia di dileguarsi, allorchè cessa il dolore: è noto, che i dolori del braccio, e della bocca producono alla giornata l'effetto stesso sopra le glandule del collo, e delle ascelle; e quante volte non è stato medicato questo stivamento passeggero delle glandule inguinali pel bubbone stesso, di cui parliamo, del quale gl'ignoranti han preso la guarigione sempre pronta per un raro effetto dei loro rimedj? E' anche stata presa talvolta per un bubbone l'ernia crurale; alcuni sono stati perfino temerarij a segno di farne l'apertura con sommo danno dei pazienti: il primo aspetto è sovente il medesimo; ma il tumore formato dallo slogamento dell'intestino, è sempre più regolarmente sferico, e la sua base è più stretta: cede questo per altro al tatto, poichè si ha la libertà di farlo rientrare, circostanza, che non lascia alcun dubbio sopra il suo carattere. Il bubbone pestilenziale, oltre l'anguinaja, e l'ascelle, cui egli investe con più frequenza, comparisce eziandio sotto le orecchie nel collo, nel petto, e altrove: i segni, che appartengono alla malattia, di cui è sintoma, distinguono quanto basta dall'altre specie: tuttavolta fa d'uopo osservare, che in questo la cute s'infiamma, lo che non accade nè al semplice, nè al venereo: che il suo calore è scottante: che il tumore il più delle volte è disuguale, o gremito di pustole nere, o cancrenose; e che la sua base è circondata da un anello di varj colori: si dee considerar come critico, quando si solleva e suppara prontamente; ma in tutti gli altri casi non produce alcun cambiamento nel male: finalmente il suo tornare indietro è mortale. I bubboni scorbutici, e scrofolosi posson prender l'aspetto dei precedenti; e si stenterebbe molto a conoscergli, se non fussimo guidati dai segni della malattia principale, di cui abbiamo già trattato.

La medicatura generale dei bubboni è poco diversa da quella del flemmone: il semplice cede ai rimedj più comuni, e il più delle volte non ne richiede alcuno: tuttavia se ne incontra alcuna volta di quelli, i quali stentano a piegar la testa a fronte dei più potenti suppuranti, e perfino delle coppette. Il bubbone venereo vuole le cavate del sangue, ed altri rimedj generali indicati nell'

nell' Articolo del flemmone : si fa uso altresì a un tempo stesso dei topici emollienti , risolutivi , e digestivi , secondo i varj stati del tumore : la midolla di pane , che si dee rinnovar con frequenza , è forse per i casi ordinarij la più atta a corrispondere a tutte queste mire : si può sostituire alla medesima nel decorso del giorno l' impiastro di diaquilon con le gomme , quando i pazienti sono obbligati a uscir di camera ; e anche permesso il continuarne l' uso , quando è stato aperto l' abscesso ; ma questi topici non sono sufficienti , se il tumore è indolente : in tal caso si ricorre alle coppette a vento , ai vescicanti , e perfino al caustico : allorchè per siffatti mezzi abbiamo eccitato la suppurazione , importa sommamente il conservarla per lungo tempo , cioè per lo meno per quei trenta , o quaranta giorni : è questo il mezzo più sicuro di difendersi dal malfrancese , massime , se si fa un uso prudente a un tempo stesso del mercurio non meno esternamente con leggiere fregagioni , colla pomata ordinaria sopra la parte stessa , e nelle adiacenze del tumore , o coll' impiastro di vigo , ec. che internamente colla panacea , col mercurio dolce , e colle altre preparazioni di questa specie : i purganti dati con giudizio giovano , e s' addicono principalmente , quando vi è qualche salivazione. Finalmente siamo talora forzati , a medicare il celtico nelle forme , per dileguare i bubboni fistolosi , e scirrofi ; questi secondi fanno resta perfino a tal medicatura , se giungono ad acquistare un carattere carcinomatoso : in tal caso non ammettono che una cura palliativa , non essendo possibile l' estirpargli. La suppurazione non è meno necessaria nella medicatura del bubbone pettilenziale , di quello sialo nei precedenti : bisogna anche , che questa consumi intieramente la glandula : con tal mira si pongono in opera i mezzi più noti : i cataplasmi emollienti , e suppuranti terminano felicemente quelli , che son molto infiammati , che s' aprono colla lancetta nel termine adeguato , ma l' impiastro di diaquilon si conviene più agli altri , che s' investono col caustico , quando lo permette la sua maturezza : si eccita quindi , e si contrasta la suppurazione coll' unguento d' alcea , col basilicon , col balsamo d' Arceo , ec. Non faremo parola de' rimedj interni , avendone ragionato a lungo nell' Articolo della perilsenza . Quanto ai bubboni scorbutici , e scirofiosi ,

son sottoposti al metodo generale, e ai rimedj interni da noi proposti negli Articoli dello scorbutico, e delle scrofole.

IL CARBONCHIO.

Con questo nome si viene a significare un tumore infiammatorio, e cancrenoso d'un color rosso vivo, abbruciante dolorosissimo, più, o meno risaltante, ma con frequenza appianato: è questo d'ordinario preceduto, o accompagnato da una, o da più pustole, che in brev' ora anneriscono, e si sfacelano; la base di questo tumore è circondata da un anello infiammato, e lucido, livido, nericcio, o violaceo, e talvolta gremito di pustollette; lo sfacelo, che fa il carattere di questo tumore, in brev' ora si dilata non meno per largo, che in profondità, se non prendonsi delle adeguate misure per troncarli l'avanzamento. Talvolta il carbonchio offre soltanto delle pustole vescicolari unitesi in una base comune, e che in brev' ora s'infiammano, ma senza molto innalzarsi. Io non so, se non si potessero riferire all' morbo, di cui parliamo, quelli esantemi cancrenosi, che veggionsi talora non meno nel vajuolo, che nella febbre maligna. Il carattere del carbonchio è il non suppurare, e il cancrenarsi, e solo dopo la caduta dell' escara lasciando un' ulcera più, o meno profonda, può alcun poco suppurare: questo tumore è d'ordinario un sintoma della peffidenza, e della febbre maligna; è quasi sempre accompagnato da un' intensissima febbre, e da gravissimi accidenti: in questi casi vien considerato il carbonchio, come la fioritura più orribile: soprattutto si teme quello, che fiorisce nella faccia, nel collo, e nel petto: non ci fa minor paura il carbonchio aderente alle glandule, alle parti tendinose, e alle membrane; è riputato mortale, allorchè occupa la bocca, o la laringe. Ci ha additato l'apertura dei cadaveri, che non ne erano tampoco esenti le viscere: sono state vedute nello stomaco, negl' intestini, nei reni, nella vescica, ec. è facile il giudicare, che in tali casi vi sono poche speranze. Si denomina anche carbonchio una specie di furuncolo, che viene con somma rapidità, e che divien nero verso la sua punta, ove formasi un' escara più, o meno estesa: nelle Provincie meridionali nostre, ove è molto frequente, addimandasi *carbonchio provenzale*: questo d'ordinario non è accompagnato dalla febbre.

bre. Talvolta non è, che una vescica infiammata, la cui flogosi fa però un'ampia base: tuttochè sia incomparabilmente meno da temere del pestilenziale, non lascia però d'esser talvolta pericoloso. Tremendo si è il rientramento dell'uno, e dell'altro, e rispetto al pestilenziale, si giudica mortale.

Ci proponghiamo nella cura del carbonchio di fissar la cancrena, e di fare staccar l'escara delle parti sane: in questa mira appunto, senza perder tempo faustosi delle scarificazioni fino al vivo, e s'applica la midolla di pane, o qualunque altro cataplasma emolliente: talora è necessario piantare un caustico nel mezzo delle incisioni, le quali siamo forzati talora a rinnovare. In progresso si usano dei cataplasmi maturanti, e antiputridi, nei quali si fa entrare il pepe, la triaca, ec. Molti mescolano la polvere della pietra da cauterio coll'unguento basillico, o egiziaco. Il butirro d'antimonio è anche acconcissimo a staccar l'escara, della quale torna bene talvolta impedir la caduta, alzandola collo scalpello: quando la crosta è caduta, si medica l'ulcera secondo il metodo ordinario, cioè coll'unguento egiziaco, col mondificativo d'appio, col balsamo di Metz, ec. I digestivi, e i detergenti debbon esser sovente animati dagli spiritosi, quando l'ulcera è minacciata di cancrena: l'acquavite canforata, la tintura di mirra, e d'aloe, l'acqua fagedenica, il balsamo d'Arceo, l'unguento di storace, ec. sono in questo caso gli antiputridi più usati. Ne' tempi andati si faceva uso comunemente del cauterio attuale: anche ai dì nostri i più pratici lo stimano il mezzo più efficace, e il più atto a fissare la mortificazione, onde io non so perchè sia quasi andato affatto in disuso: non ci fermeremo sopra i rimedj interni, perchè debbonsi ricavare dagli Articoli della pestilenza, e della febbre maligna. Rispetto poi al carbonchio provenzale, questo vuole talora la cavata del sangue, e gli altri rimedj generali: posson giovarvi i cordiali, e gli s'addicono altresì i da noi proposti topici: per altro non abbisogniamo d'ordinario, che della midolla di pane, o di qualunque altro cataplasma emolliente, e maturante; ma quando il tumore non si dispone alla suppurazione, si debbon praticare le scarificazioni, il butirro antimoniale, e altri caustici da noi mentovati.

IL CHIODO, E L'EPINITTIDE.

Conosce ognuno il *chiodo*, o sia furunculo: si sa, che ve ne sono di più grossezze; ma niuna eccede quella d'un uovo di colombo: che ha la sua sede nelle parti grasse, che il calore, e il dolore, che l'accompagnano, tormentano grandemente i pazienti, massime, se ne hanno varj, o se questi vengono l'un dopo l'altro. Il furunculo suppara d'ordinario, e s'apre di per se; ma nella maggior parte la marcia perde la sua fluidità, ed esce in forma di fango fisso, e viscoso. Questo tumore infiammatorio è talvolta d'un reo carattere, e accompagnato dalla febbre: è tale, quando partecipa dello scorbutico, e del sceltico: tuttavia è di rado pericoloso, qualora la violenza del dolore non precipiti talvolta i fanciulli nelle convulsioni. L'*epinitiae* è una pustola rossa, o livida, sommamente dolorosa, della grossezza al più al più d'una fava, la cui base infiammata ha più, o meno d'estensione: suppara come il furunculo, ma non esce se non della sanie: veggionsi molte di queste pustole insieme: allora sono più picciole: io ne ho osservate sul petto di quelle, che assomigliavanfi alle bolle del vajuolo. Sembra, che il carattere essenziale di queste pustole sia il nascere, e cagionare dolori acutissimi in tempo di notte, e suppurare imperfettamente: tuttavia non danno più da temere del furunculo. Vi è un'altra specie di pustola, assomigliantesi molto all'*epinitide*, e che chiamasi *terantino*, perchè si crede, che somigli il frutto del terabinto, non meno rispetto alla sua forma, che a motivo del suo colore nericcio: questa pustola investe il più delle volte le gambe: è infiammata come l'*epinitide*, e non getta parimente se non della sanie. Queste specie di pustole, benchè poco note, non son rare, e non vi è Pratico, che non vi si sia più volte imbattuto.

Pochi rimedj richiede il furunculo: gli unguenti, e gl'impiastri emollienti, e digestivi, son quasi i soli, de' quali abbisogniamo: tali sono l'unguento della madre, l'empiastro di diaquilon colle gomme, quello di spermaceti, dell'Abate di Grazia, ed altri, che s'impiegano fino alla total guarigione. Quando il furunculo è sommamente doloroso, e che eccita la febbre, si ricorre alla cavata del sangue, senza trascurare gli alimentanti, i temperanti, e anche i lassativi: allora si pon-

pongono in opera i cataplasmi rilascianti, e i digestivi, come le midolla di pane, e simili: abbiamo detto, che il furunculo suppara facilmente, e scoppia; e perciò di rado vi abbisogna l'incisione, e il caustico. Si può impedire il suo frequente ritorno, al quale trovansi parecchi esposti, con i rimedj generali, che debbon esser seguiti, dai rinfrescanti, dai depuranti, ed anche dai diaforetici: in tale occasione si è sperimentata l'utilità dei replicati purganti: sonosi ritratti pure grandi vantaggi dal bagno, dall' uso del latte, delle acque minerali, ec. I topici da noi indicati posson essere applicati all'*epinittide*, e al *terminto*; ma se ne fa poco uso, quando queste pustole sono estese, e numerose, e allora ci contentiamo d'addolcirle colla crema di latte, colle più semplici pomate, coll'*Album rhafis*, ec. Quanto ai rimedj interni, che non son diversi da quei del furunculo, si può dire, che in questo caso sono più necessarij, poichè queste pustole nascono per lo più da un vizio del sangue, o degli umori.

EDEMA, ED ENFISEMA.

Vien detto, che l'*Edema* è un tumore molle, e indolente, che riceve le impressioni delle dita; ma i Pratici attenti hanno ben rilevato, che se ne incontrano dei duri, e dei dolorosi, che non conservano il segno, che vi s'imprime. Non vi è parte, che non possa essere investita dall'*edema*: ma principalmente occupa le palpebre, il viso, le mani, le braccia, i piedi, le gambe, donde si sparge talora sopra tutto l'abito del corpo sotto la denominazione di leucostemmazia. E' questo la conseguenza molto ordinaria dei grandi sborfi di sangue, delle febbri intermittenti, e d'altre malattie, sì acute, che croniche: lo producono parimente le legature, e la compressione: si vede talora il volto tumefatto dal gonfiamento delle parotidi; e le gambe stivate nell'ultimo tempo della gravidanza dal volume della matrice: è facile il giudicare, che poco ci danno da temere queste specie d'edemi accidentali; ma non è lo stesso di quello, ch'è la conseguenza dei mali cronici, e ch'è sovente il foriere dell'anasarca, o di qualsivoglia altra idropisia. Si può vivere lungo tempo colle gambe edematose, massime quando il calore del letto, o la situazione orizzontale ne dileguano l'effusione; ma quando lo stivamento, e la tensione sono

estremi , vi si forma una flogosi resipelacea , e vi s'innalzano anche dei fitteni , che minacciano la parte di cancrena . Abbiám detto , che l'edema poteva partecipare del flemmone , della resipola , e dello scirro : è soverchio l'aggiungere , che da queste complicazioni vien renduto più tristo .

L'*enfisema* è un tumore flatulento , o una gonfiagione elastica , che non conserva l'impressione delle dita : vi si rileva una specie di trasparenza , e spesso del rosore , e dell'infiammazione : è talora universale , quando vi è una piaga , che penetri nel petto , di pari che dopo la febbre maligna , ed alcune altre gravi malattie . Il parziale occupa il più delle volte le palpebre , le parti genitali d'ambi i sessi , le ginocchia , ec. per lo più ci dà poco da temere . Non dee prendersi per enfisema quelle vesciche trasparenti , piene di serosità , che ora diconsi idatidi , ora fitteni : tali son quelle , che fioriscono nelle resipole , sopra le parti minacciate di cancrena , dopo le scottature , o l'applicazione delle canterelle , dopo una compressione replicata , e in parecchi altri casi . E' vero , che queste s'incontran sovente coll' enfisema , che investe le palpebre , il prepuzio , e la vulva , ove si dà loro la denominazione di *cristalline* .

L'edema , che nasce da alcuno accidente , non abbisogna di rimedj ; ma quello , che dipende da un vizio interno , sì nei solidi , che nei fluidi , vuole pronti soccorsi . Gli stomachici , e i fortificanti ; gli aperienti , e i diuretici , i purganti idragoghi , e i sudorifici , sono i rimedj più usati : noi gli abbiamo proposti nell'articolo dell'idropisia ; ma non si debbono trascurare i topici risolventi , e fortificanti : tali sono il decotto d'affenzio , di salvia , di rosmarino , e di fiori di sambuco , nel vino : l'acquavite , l'acqua di calcina , lo spirito di sale ammoniaco , la rannata di cenere di fermenti , e finalmente le fomenta , in cui fanno entrare le rose rosse , e i balaustr , l'allume , il bollo di marte , ec. Alcuni stimano molto il cataplasma di foglie d'ebbio , o sambuco minore , e di sambuco pestate , collo spirito di vino : talvolta ha eziandio giovato per l'enfiagione delle gambe il portare delle calze di pelle di cane , oppure di far applicare una fascia , la quale comprima ugualmente tutte le parti , che sono la sede dell'edema . Talvolta si è sciolta la parte , quando l'

enfagione è a un certo punto ; col tagliuzzarla , o con farvi delle leggiere scarificazioni , che poi si fomentano coll'acqua vulneraria , coll'acquavite canforata , quando si teme la canorena , da cui son minacciati gl' infetti di celtico , gli scorbutici , gli scrofolosi : l'edema flemmonoso , il resipelaceo , e lo scirroso , vogliono rimedj combinati . La medicatura dell' enfisema è poco diversa da quella , che abbiamo proposta : vi si mettono in opera i topici aromatici , risolventi , discussivi , e astringenti , come la salvia , il rosmarino , lo spigo , i fiori di camomilla , e di sambuco , le rose rosse , e i ballausti , l'acqua di calcina semplice , o impregnata di sale ammoniaco , lo spirito di vino canforato , l'impiaastro di coccole di lauro , ec. I rimedj interni sono altresì a un di presso gli stessi : si raggirano questi sopra i purganti , i diuretici , i diaforetici , tomici , o incidenti .

SCIRRO, E CANCRO.

Si sa , che lo scirro è un tumore duro , e indolente , che si forma a bell'agio , senza alterazione nella cute : può aver la sua sede in tutte le parti , ma per lo più occupa le glandule : il tempo lo asciuga , lo rende calloso , e perfino gessoso . Oltre le poppe , ove lo scirro è molto usuale , vi sono esposte le palpebre , la bocca , il collo le ascelle , l'Anguinaja , e i testicoli : veggionsene anche sul dorso , sul ventre , nelle cosce , al polso , ec. per non far parola delle parti interne , che non risguardano questo articolo . Abbiamo detto , che il flemmone , il bubbone , l'edema , e molti altri tumori , potevano degenerare in scirro . Questo morbo è fra i più ostinati , e il più delle volte incurabile , massime in un'età avanzata ; ma vi è maggiore speranza per i fanciulli , e per i giovani . Abbiamo già veduto , come lo scirro è sovente il prodotto del malfranzese , delle scrofole , e dello scorbutico ; ma vi dispongono la melancolia , e i disgusti : le contusioni poi vi danno con frequenza motivo . Quando questo tumore è insensibile , e che la pelle , che lo cuopre , conserva il suo color naturale , non vi è altro da temere , salvo che il suo volume , e la sua situazione , che possono incomodare ; ma se vi sopravviene alcuna flogosi , prurito , e dolori , corriamo grandissimo pericolo , che degeneri in cancro . E' noto , che l'applicazione

dei digestivi, degl' irritanti dà talvolta motivo a tal suneffo cambiamento. Si conoscerà, che questo tumore ha acquistato un carattere canceroso, se diviene paonazzetto, o livido; se ingrossa in pochi giorni dopo essersi per lungo tempo conservato nel medesimo stato; se vi si formano delle disuguaglianze; se le vene, che lo circondano, più rilevate, divengono nericie, e varicose; se finalmente i pazienti vi sentono del prurito, dei dolori, e dei lanciamenti. Tuttavia il cancro occulto comincia talora da un tubercolo della grossezza d'un pisello, o d'una fava, e per buon tratto di tempo si rimane in questo stato, senza fare progressi sensibili: il suo accrescimento segue poscia quasi istantaneamente, e divienta tale, quale lo abbiamo descritto.

Quando lo scirro soccombe il divisato formidabile cambiamento, la cute si screpola, e s'apre: queste fissure si dilatano a motivo della serosità virulenta, che ne cola, onde risulta un'ulcera, ch'è il primo grado del cancro manifesto: insensibilmente si fa più doloroso, e finalmente esala un fetor cadaverico: l'umore, che quindi cola, è caustico a segno, che abbrugia perfino i panni lini: gli avanzamenti di quest'ulcera ora son lenti, ora rapidi; il suo fondo produce delle carni fungose: i suoi contorni, che hanno tutti i colori, si gonfiano, e si rovesciano: si stende sopra qualsivoglia parte aderente, rodendo ciò, che incontra, e con frequenza risveglia mortali emorragie: ognuno sa gli orribili sconcerti, che eccita nel volto, e come lo rende schifo. Il cancro esulcerato può durar lungo tempo: i dolori, ch'ei cagiona, allorchè ha gittato profonde radici, sono sì fieri, e sì insopportabili, che i pazienti aspettano smaniosamente la morte: la febbre lenta inseparabile da questo stato, soffre rei esacerbamenti, e non lascia di precipitar nel marasmo, o nella gonfiazza. Non sono però i soli tumori flemmonosi, gli scirrofi, e gli scrofolosi, quelli, che posson divenire carcinomatosi; ma eziandio i pori stessi, i tumori anomali, le semplici ulcere, ec. Ognun sa, che il cancro del volto si chiama: *Nili me tangere*, e che si denomina *Lupo* quello delle gambe.

Da ciò, che abbiám detto, può concludersi, esser talvolta cosa più prudente, il non toccare lo scirro, che imprenderne la guarigione: ciò per altro dee soltanto intendersi di quello, ch'è invecchiato, e che s'incontra

tra in persone cachetiche, o avanzate in età : negli altri casi non bisogna trascurar cosa alcuna, quantunque alcuna volta tendasi infruttuosa la più saggia prescrizione di rimedj . Dopo i generali la cui scelta vien regolata dalle circostanze , si fa uso dei temperanti , degli aperienti , dei diaforetici , e degli squaglianti : tali sono il siero , la lattuga , la cicoria , la borraia , l' agrimonia , il fumosterno , il crescione , la pazienza , il brusco , lo sparagio , l'eringio , la garancia , i centogambe , il nitro , il sale del Glaubero , l' arcano duplicato , il tartaro marziale , l' antimonio diaforetico , il cinabro d' antimonio , il sapone , l' etiope minerale , l' aquila bianca , il rimedio di Rotrou , ec. In questo luogo son necessarij i purganti replicati ; la senna , la manna , il rabarbaro , il sale d' Epsom , la magnesia , la polvere cornacchina , ec. vi sono i più messi in opera : giovano anche talvolta gli assorbenti . Sonosi veduti effetti maravigliosi da tutti i lati ; ma non vi è cosa , ch' abbia potuto uguagliare le acque minerali , non meno fredde , che calde : tali sono quelle di Vals , e di Forgers , quelle di Bourbonne , di Plombieres , di Vichy , di Monte d' oro , di Balaruc , d' Aix la-Chapelle , di Barezges , e altre : le termali sono state anche impiegate esternamente , non meno a doccia , che in bagno : si è eziandio fatto uso dei loro fanghi , e singolarmente di quelli di Sant' Amando , i quali , non so poi per qual ragione , sono più celebrati degli altri : sonosi anche amministrati i bagni domestici , e par , che siasene ricavato del vantaggio . Non parleremo in questo luogo dei rimedj del celtico , delle scrofole , e d' altri morbi , dei quali il cancro , e lo scirro esser possono sintomi .

La medicatura interna dello scirro dee essere secondata dai topici , i quali farebber pure inutili , se non trovassero disposti alla loro azione gli umori già preparati : i risolventi a buona equità debbonsi amministrare in primo luogo ; ma bisogna talvolta unire ai medesimi i rilassanti , che rendono più penetrabile il tumore : gli uni , e gli altri si raggirano sopra la midolla di pane , i cataplasmi fatti coll' erbe emollienti , e le farine , l' empiastro di mucilaggine , quello di sapone , il diaquilon gommato , il diabolano , l' empiastro di cicuta , e quello di vigo , la pomata mercuriale , ec. Se sopravviene alcun dolore , o prurito , si posson calmare col *nutritum* , o col *porfulice* : a tutti questi topici si uni-

unisce talora l'oppio, ma questa pratica è pericolosa. Le fregagioni leggiere sopra la parte posson fare qualche bene: pare, che abbia anche giovato il vapore dell'acqua calda, e dell'aceto abbrugiato, quello dello zolfo, del cinabro, ec. dal quale bisogna difendere assolutamente il respiro. Dannosissimi riescono in questo caso i suppuranti, come quelli, che con somma frequenza hanno fatto degenerare in cancro il tumore. Finalmente quando sonosi sperimentati inutili tutti i rimedj, abbiamo il ripiego dell'estirpazione, qualora non vi si oppongano il sito, e le aderenze del tumore.

I rimedj interni appropriati al cancro, sì occulto, che esulcerato son poco diversi da quelli, che abbiamo proposti: tali sono gli allentanti, i temperanti, gli aperienti, i risolventi, i diaforetici, gli squaglianti, i purganti, e gli assorbenti; ma fa d'uopo aggiugnervi gli addolcenti, e i calmanti, come il latte, il siero, la ptisana di radice di fragola, di ninfea, di malva; i brodi di vitella, e di pollastra; le creme di riso, d'orzo, e di avena; lo spermaceo, il laudano, il diacodio, le goccioline anodine del Sydenham, ec. siffatti soccorsi, convien confessarlo, non hanno efficacia, qualora non s'investa con altre armi il vizio locale; ma pochi fanno servirsene, e non è sempre permesso l'intraprenderlo. Tutti gli Autori, dopo Ippocrate, raccomandano di non por le mani nel cancro; e ci ha con pur troppa frequenza fatto vedere l'esperienza, quanto male si è fatto per non istarsene a un tal consiglio: infatti gli emollienti, i risolventi, e i suppuranti, così vantaggiosi contro gli altri tumori, d'ordinario fanno intristir questo. Ma è egli verisimile, che in Natura non v'abbia alcun rimedio contro questo male? E come si troverà egli mai, se non si cerca, e non se ne fa alcun tentativo? Si correrà rischio d'abbreviare una vita miserabile, e languente; ma questo disordine, seppure è tale, può egli compensar quello di lasciar in balia a una morte, forse meno vicina, ma sempre certissima, tanti infelici, che implorano l'ajuto de' Medici, e perfino dei Ciarlatani, i quali più arditi, o più temerarij, alcuna volta sono più fortunati?

Io non saprei dilungarmi dal sentimento d'Ippocrate, quanto ai cancheri occulti, che da molti si portano per lungo tempo senza incomodo, e che si possono intristire con dei topici; ma credo, che si debban fare dei

tentativi sopra il cancro aperto, non potendosi ignorare, avervi varj esempj di guarigione: io non ne accetto tampoco il cancro della faccia, avendo veduto guarire dal rimedio d' un Ciarlatano, che non era altro che la *fabina*, un'ulcera cancerosa del naso, la quale avevalo già in parte corroso. I topici, che sembrano più atti a produrre tale effetto, secondo le osservazioni dei migliori Pratici, sono, oltre la *fabina*, l'*alliarria*, l'*illecebra*, l'*assenzio*, il *geranio roberziano*, ec. Sonosi veduti dei buoni effetti dall'*erismo*, non meno applicato esteriormente, che preso per bocca. Sono stati adoptrati contro questo morbo anche gli *scarotici*, e, come venghiamo assicurati, con riuscita: l'*infusione della dentellaria*, o sia *piombaggine*, nell'*olio*, è un topico molto vantato: ma quanto a me son di parere, che il cauterio attuale di cui servivansi usualissimamente gli Antichi, sia superiore a tutti gli esposti rimedj: in fatti e qual cosa di questa più atta a troncargli effetti di un'ulcera fagedenica, e a distruggere il germoglio? Ma per mala sorte vi sono poche persone inclinate a adottare un tal rimedio, e anche meno bastantemente capaci a ben dirigerlo. Finalmente l'*estirpazione del tumore*, quando è possibile, o l'*amputazione di tutta la parte*, come della *mammella*, della *verga*, ec. è il più sicuro di tutti i mezzi, se non vi si opponga la soverchio avanzata età del paziente, o la sua rea costituzione: imperciocchè sono perpetuamente infruttose siffatte operazioni, allorchè il sangue è viziato: in tal caso non si è a mala pena distrutto un cancro, che se ne vede fiorire un altro, qualora con uno, o con più cauterj non si prevenga l'accidente: e di fatti l'esperienza ci ha più e più volte fatto conoscere l'efficacia d'un tale ajuto.

Questi sono i mezzi di guarigione i più usati, e i più felici; ma se dalle circostanze ce ne venga vietato l'uso, ci attenghiamo ai palliativi: son questi le fomentate col latte e coll'acqua di uova di rane: l'applicazione delle mele marcite, del solatro, dello zucchero di saturno, del piombo torrefatto nell'olio d'uova, d'una lama di piombo, d'una fetta di vitello, e di qualsivoglia altra carne da macello, d'un colombo, o di qualunque animale aperto vivo, ec. Non si teme neppure di far entrare l'oppio in alcuni topici: abbiamo detto, che amministravasi anche interiormente, quan-

quando ci mancavano altri mezzi per attutare i dolori alcuna fiata più crudeli della stessa morte.

ANEURISMA, E VARICI.

E' noto, l'*aneurisma* essere un tumore formato dalla dilatazione di un'arteria, o dallo stravasamento del sangue, a cui dà motivo l'apertura di quella: che il primo si chiama *vero*, e si denomina *spurio* l'altro. Nel vero il tumore è più, o meno circoscritto, e d'ordinario cede al tatto; ma resiste al medesimo, quando è giunto a una certa grossezza: nei primi tempi la cute, che lo ricuopre, non soffre la menoma alterazione; ma divien rossa, e s'infiamma in progresso, e talvolta si fende coll'arteria; onde risulta un'emorragia mortale. La pulsazione manifesta nell'uno, e nell'altro aneurisma, gli distingue quanto basta dagli altri tumori; ma può accalere, che questi secondi situati sopra le arterie, ne presentino la pulsazione, e infatti vi si sono ingannati con frequenza i più esperti conoscitori. Sembra, che questa dilatazione dell'arteria, talvolta enorme nasca dall'erosione, o dallo sfiancamento d'alcuna delle tuniche: il tubo, ove si è formato il sacco, contiene varj strati di sangue disseccato: poichè questi si sono moltiplicati, e che il tumore, a motivo del suo volume, è divenuto più considerabile, vi si rileva meno pulsazione. Sonosi veduti aneurismi occupanti il collo, e una porzione del petto, i quali contenevano oltre a quattro libbre di sangue, non meno disseccato, che aggrumato, e liquido. L'aorta, le subclavie, le carotidi, le ascellari, le brachiali, e le crurali, ne sono la sede molto usuale; ma più comunemente veggionsi nel collo, e nelle adjacenze dello sterno, e delle clavicole. L'aneurisma talora s'avanza rapidamente; ma il più delle volte dura degli anni.

Non vi è chi non sappia, che la puntura dell'arteria dell'braccio colla lancetta dà motivo all'aneurisma, se non s'impedisce con una buona compressione. Quando l'arteria è soltanto intaccata, senz'esser forata, vi si forma un'aneurisma vero, ma s'è aperta ne risulta un'aneurisma spurio, cioè, un tumore più esteso, e che trovasi fuori dell'arteria: questo secondo è accompagnato da una specie di fluttuazione, o di fremito, e vi sono meno manifeste le pulsazioni: la cute divien livida, a motivo del sangue stravasato, che vi dà moti-

vo; quindi è, che questo tumore è talvolta seguito dall' infiammazione, e dalla cancrena. Si vede bene, senza ch'io lo dica, che lo *spurio* dee formarsi in cortissimo tratto di tempo, dove per lo contrario l'accrescimento del *vero*, segue, come abbiain detto, molto lentamente. L'aneurisma è apparente, quando non ha la sua sede nel tronco dell'aorta inferiore: quello, che trovasi occultato nel petto, e che va perpetuamente cacciando le ossa vicine, è molto comune: eccita palpitazioni, oppRESSIONI, svenimenti, e va a finire, come accenammo, colla morte istantanea. Tutti gli sforzi, che si fanno, sia in saltando, o portando dei pesi; sia toffendo, o stranutando, gridando, vomitando, scaricandosi il ventre, o partorendo, danno motivo ad aneurismi: vengono anche i medesimi dopo le contusioni le piaghe, ec. Quei delle arterie grosse, per quanto sieno visibili, sono incurabili; ma si può rimediare agli altri, quando si trovano in una situazione favorevole.

Le varici, che hanno qualche rapporto coll'aneurisma, sono tubercoli molli, lividi, o nericci, per lo più irregolari, che posson farsi scomparire colla pressione, ma che tornano incontanente, quando questa è rimossa; trovansi piantati lungo le vene, che striscianti sulle gambe, sulle cosce, sul basso ventre, ec. L'emorroidi, delle quali parleremo altrove, sono specie di varici: se ne formano eziandio pel tratto dei vasi spermatici, sotto la denominazione di *varicocele*: trovansi anche delle varici nella vescica, nel polmone, nel cervello, e in altre parti interne. Ognun sa, queste esser formate dal fermarsi che fa il sangue, il quale eccita comunemente queste dilatazioni verso le valvule delle vene. Con frequenza compariscono delle varici sul fine della gravidanza, o dopo i parti laboriosi, ma cessando la cagione, si dileguano. Gli sforzi violenti, le percosse, le cadute, le legature, o qualunque altra compressione, posson darvi motivo: investono anche sovente gl'ipocondriaci, e quei, che hanno le viscere del ventre ostrutte. Le picciole di rado portano incomodo, ma ingrossandosi producono acutissimi dolori: se ne son vedute di quelle, che arrivavano a contenere due libbre di sangue, e che erano grosse come la testa d'un bambino. Apronsi queste talora dipersè, e risvegliano pericolose emorragie, e le piaghe, che lasciano, posson degenerare in ulceri maligne.

La compressione con una fascia adeguata , fornita d'una piastra , è tutto ciò , che può convenientemente applicarsi a un *aneurisma* vero , e recente , piantato nell' braccio , nella gamba , alla testa , o sopra le costole : ma sono queste compressioni impraticabili nel collo , e nel petto , tuttochè ivi gli aneurismi risaltino al di fuori : gli *istnici* , come la chiara d'uovo , l'allume , e altri , sono acconciissimi a favorire la compressione . Sopra l'arteria aperta , o intaccata dalla lancetta , si applica una ben fissa faldella di fila , o di carta masticata : vii è anche sommamente adattato l' agarico : tutto questo dee essere soverchio stretto , affinchè non s' ingenerino edemi , echimosi , e flogosi , che posson produrvi la cancrena : allora si procura di rimediarvi con bagni spiritosi , e col calore . E' nota a chicchessia l' operazione praticata sopra gli aneurismi del braccio , che s' appropria anche a quello della gamba , e d' alcune altre parti : consiste questa nel portar via la parte dell' arteria tumefatta , che sia stata prima posta fra due legature , avendo posto un fermaglio dalla parte , onde sgorga il sangue : ma la riuscita non è sempre felice ; ed è talvolta accaduto , che dopo avere estirpato l' aneurisma , siamo stati forzati a troncargli il braccio , il quale , privato del sangue , si era cancrenato . Quando la grossezza , o la situazione dell' aneurisma non permettono , che si praticino i mezzi divisati , non abbiamo altro ripiego fuori della cura palliativa , la qual consiste unicamente nel cavar sangue , ed in un gran governo .

Rispetto alle *varici* , le cavate di sangue , e l' applicazione delle mignatte ; i lassativi , gli allentanti , i temperanti , e gli aperienti , sono i rimedj di riuscita migliore ; ma è cosa rara , che possiamo far di meno della mano del Chirurgo , che dee operar quasi lo stesso , che nell' aneurisma . La compressione fa d' ordinario sparire le varici , e può anche guarirle , quando si possiede l' arte di renderla continua , e che se ne fiancheggi . L' effetto con applicarvi degl' impiastri astringenti , de' piumaccioli inzuppati nell' acqua con allume , nella chiara d' uovo , nell' aceto forte , o in qualunque altro liquore fortificante : è talora necessario il porre prima in opera i topici rilascianti , e oleosi , quando è impedita la comunicazione fra il sacco , e il canale . Ma le varici grosse , quelle di vecchia data , che non cedono alla pressione , e che eccitano grandi dolori , o
che

che minacciano un vicino sfiancamento, non si possono guarire, se non coll' operazione, che si fa in due maniere: la prima consiste in aprire il tumore per vuotarlo, avendo prima avuto cura di comprimer la vena, che vi conduce il sangue, e a medicarne poscia la piaga, secondo le regole dell' arte: la seconda è l' estirpazione del tumore, che si effettua con più agevolezza, e meno pericolo, che nell' aneurisma. Alcuni si sono serviti del butiro d' antimonio, e d' altri caustici: altri vi hanno applicato il cauterio attuale, e tutti questi metodi sono riusciti.

TUMORI INSACCATI.

Tutte le specie di *lupe*, i tumori *grassi*, i *linfatici*, il *ganglione* (γάγγλιον) che comprendiamo in questo Articolo, non sono i soli tumori insaccati, che abbiamo osservato: è noto, che la *vanula*, il *gozzo*, l' *idrocele*, e altri, che occupano costantemente le parti medesime, che siamo obbligati per l' ordine da noi tenuto, a separare, sono della stessa natura. Il lupo da tutti conosciuto, e che può prodursi in tutte le parti del corpo, contiene varie specie di materie, che si paragonano al miele, al pan bollito, al sago, onde derivano i nomi di *meliceride*, d' *ateroma*, e di *steatoma*, che danno a questi tumori: vene sono anche di quelli, che racchiudono vero grasso, anche nei corpi più magri; chiamansi tumori *grassi*: nascono usualmente sul dorso, e nelle spalle: s' incontrano altresì in alcuni lupi delle masse carnose, o spungose, sostanze cartilaginose, ossee, pietrose, e altri corpi eterogenei. Questi tumori crescono a bell' agio, senza dolore, e sfendono insensibilmente la cute, senza alterarla: se ne sono veduti di quelli, che pesavano cinquanta libbre: tuttavia ve ne sono di quelli, che s' infiammano, e che suppurano, o che a motivo della troppo grande estensione, scoppiano: alcuni divengono cancerosi, o degenerano in ulcera fistolosa, che non si può estinguere, che colla totale distruzione del sacco; ma questi accidenti nelle *lupe* di vecchia data, d' ordinario costano la vita ai pazienti. I tumori insaccati non solo nascono per tutto l' abito del corpo, ma eziandio nel petto, e nel basso ventre, ove abbiamo detto, che se ne rileverebbero con gran frequenza: quei della testa, della fronte, del collo, del dorso, e delle ginocchia,

chia, sono i più comuni. Le *lupe* dipendono quasi sempre da un vizio locale, al quale danno sovente motivo le contusioni; ma possono essere un prodotto del veleno venereo, o di qualsivoglia altro vizio della massa degli umori: si portano lungo tempo senza incomodo: tuttavia quelle, che trovansi piantate sopra la trachea-arteria, comprimendola possono inceppare il respiro: quelle della testa talora s'infiammano: le une, e le altre eccitano la carie alle cartilagini, che toccano. *Talpa, natta, testuao*, son varie denominazioni, che sono state date alle lupe della testa, ma tali distinzioni sono molto trascurate.

Vi ha un'altra spezie di tumore infaccato, che chiamiamo *Infatico* meno comune dei precedenti, ch'è pieno d'un umor limpido, e che anche contiene innumerevoli idatidi, ed anche vasi linfatici, che si rilevano ottimamente ne taglio anatomico; può questo formarsi, come gli altri, sopra tutte le parti; ma s'incontra con più frequenza nelle braccia, e nelle mani: è più pericoloso, e più fastidioso delle lupe ordinarie, ed anche fa più testa ai rimedj. Il *ganglione* è un tumore mobile, e indolente, che non si vede se non nelle mani, nel polso, e nei piedi: è questo una specie di sacco formato dall'allontanamento, o dall'estensione della guaina dei tendini, ed è per lo più della grossezza d'una nocciuola: se ne sono veduti però della grandezza d'un uovo di colombo: la cute, che lo cuopre, non ne soffre la menoma alterazione; contiene una spezie di gelatina, che sembra della natura di quel sugo, che intonaca le guaine per favorire il movimento dei tendini: il ganglione non è pericoloso: gli sforzi, la compressione, le percosse, le cadute, e la puntura, sovente vi danno occasione: si pretende, che i gottosì, gl'infetti di malfrancese, gli scorbutici, e gli scrofolosi, vi sieno più che gli altri soggetti.

Le lupe nascenti possono cedere ai topici risolventi: tali sono il cataplasma d'acetosa, e di radice di bryonia, il diabolano, l'empiaastro di vigo, quello di cicuta, ec. ma tutte queste applicazioni fanno poco effetto sopra le lupe grosse, e invecchiate; e la maggior parte prende il partito di non farvi cosa alcuna, qualora non sia giuoco forza il porvi mano a motivo d'alcuno accidente, o per cagione della deformità. Il solo mezzo di liberarsene si è quello di portar via col-

taglio il *cisto*, o distruggerlo con li corrosivi: tutt'e due questi ripieghi hanno i loro inconvenienti, e i loro pericoli, quando la lupa è aderente alle tute, ai tendini, o ai ligamenti, ec. Il primo ripiego è speditissimo, ma non fa effetto, se non quando si porta via il cisto senza forarlo, lo che richiede una destrezza, che non possiedono molti Cerusici: il secondo è lunghissimo, e sarebbe anche infruttuoso, se si lasciasse di consumar tutto il cisto: senza tal condizione ci dobbiamo aspettare un'ulcera fistolosa: fanno quei dell'arte, che non si dee applicare il caustico senz'aver prima ammolito il tumore coi cataplasmi, o con gl'impiastri rilascianti. La legatura, quando la base stretta della lupa lo permette, è il mezzo più sicuro, e il meno da temere. Le lue numerose suppongono un vizio umorale, che bisogna investire dopo i rimedj generali, con gli allentanti, coi temperanti, coi depuranti, con gli aperienti, ed anche con gli squaglianti. Si possono d'ordinario estirpare senza pericolo i tumori grassi, e questa è tutta la loro medicatura; ma è essenzialissimo il non lasciarvi la menoma cosa, se non si vuol correre rischio d'un nuovo risorgimento. I tumori linfatici posson esser medicati, come gli ordinarj, coll'estirpazione, o col caustico; ma le riuscite sono anche più incerte: la docciatura delle acque termali, quando questi non sono invecchiati, può essere sommamente proficua: gli altri topici pajono superflui. Si possono guarire i ganglioni recenti, stropicciandogli, con infrangerli; col percuoterli, o comprimerli validamente con una piastra di piombo, fissata per mezzo d'una fascia adguata: si fa uso altresì della gomma ammoniaca, ammolita coll'aceto, dell'empiastro di vigo, di quello di sapone, e di cicuta, del diabolano, e d'altri risolvendi; delle fregagioni, e delle fumigazioni mercuriali, ec. ma tutti questi topici sono d'un lieve soccorso, se non vi si unisce la pressione. Finalmente gli ultimi ripieghi sono l'estirpazione, e i caustici; ma è cosa rara, che vi si ricorra, non solo perchè ne conosciamo il pericolo, ma perchè questo tumore non merita una medicatura chirurgica.

SARCOMA, PORRI, E CORNI.

Il *sarcoma*, di cui gli Autori non hanno parlato, che oscuramente, è un tumore carnosio, compatto, e solido,
 Tom. II. C do,

do, che perciò non cade al tatto: è questo d'ordinario immobile, e indolente: non vi si scuopre alcun cisto, e il suo accrescimento si fa con somma lentezza. Il sarcoma può prodursi in tutte le parti esterne; e, siccome più volte abbiamo detto, non ne sono a coperto le interne: ha la sua sede con più frequenza negli occhi, nelle guance, sul dorso, nelle braccia, sulle cosce, ec. Non potremmo determinare nè la sua forma, nè la sua grandezza: sono veduti di quelli, che pendendo dal dorso arrivavano fino ai gartti. A chicchessia note sono quelle *sfresenze di n/ita*, le quali si assomigliano a fravole, come dicono, a more, a granelli d'uva, ec. Il polipo del nato è un sarcoma, di cui parleremo altrove; si chiama *saroccele* l'eterefcenza dei testicoli: diconsi *condiloma*, *fico*, ec. quei, che trovansi piantati nell'ano: dal fondo, e dall' labbra delle piaghe s'innalzano delle eterefcenze carnose, che diconsi *fungbi*: è noto questi esser frequentissimi nelle piaghe della dura madre, delle parti aponevrotiche, ec. Il sarcoma, che viene nell'abito del corpo, è per lo più senza pericolo: tuttavia può accadere, che s'infiammi, che si etolceri, e che si cancerenti, come gli altri tumori. Abbiamo detto, che i tumori infaccati racchiudevano sovente sostanze carnose; ma sarebbe un abusar dei termini il collocargli in questa classe.

I porri sono una specie di sarcoma sì comune, ch'è inutile il descriverlo. Il volto, il collo, e le mani, ne sono d'ordinario la sede. Quando queste eterefcenze aderiscono ad un'ampia base, si dicono *verruca sessiles*: quelle, che hanno un picciuolo, diconsi *verruca pediculates*: gli uni, e gli altri gettano radici più, o meno profonde: non son questi porri più fastidiosi, che pericolosi; e talvolta si dileguano, senza che altri se ne accorga: tuttavia quei del nato, delle palpebre, e delle labbra, possono farsi cancerosi. Si chiamano anche porri certi tubercoli, che crescono sopra le parti genitali, e intorno all'ano, ma sono d'altra natura. I *coni*, come vien preteso, quanto alla forma, e alla loro durezza, sotto somigliantissimi a quelli degli animali: non aderiscono per lo più, che alla pelle; ma se ne sono veduti di quelli, che penetravano fino all'osso: tale deformità è stata osservata nel volto, nel cranio, sul dorso, agli articoli, ec.

Non s'invette il sarcoma, se non quando incomoda,

da, o a motivo di sua situazione, o pel suo volume: la *legatura*, e il *bisturi*, dopo le preparazioni ordinarie, sono i mezzi, che vi s'impiegano: si è molte volte sperimentato, che i corrosivi non giovano; può essere, che sieno incontrati in ree circostanze, come, allorchè il tumore è duro, livido, disuguale, e doloroso; quando è aderente alle parti tendinose, ec. in questi casi, ce ne dobbiamo astenere, come anche degli altri mezzi. Si stropicciano i porri col sugo di celidonia, di titimalo, di fico, dell'erba da porri, et. Si toccano coll'olio di tartaro per deliquio, colla soluzione di sale ammoniaco nell'acqua, con quella di sal marino nell'aceto, coll'olio di vetriolo, coll'acqua forte, coll'olio di canfora, collo spirito di sale, colla pietra infernale, ec. Si espongono alla fiamma dello zolfo: si cuoprono coll'impiaastro di vigo, ec. ma tutti i topici divisati avranno una debbole azione sopra i porri, se non se ne sia prima tolta via la sommità con un rasojo: talvolta altri si è servito del cauterio attuale; ma vi è pericolo d'intaccar le parti vicine, massime le membranose, le tendinose, e le ligamentose, dal che possono nascere tristi accidenti. Si portan via agevolmente i porri, che hanno un picciuolo, non solo colla legatura fatta con un crino, o con un filo di seta incerata; ma anche colle cesoje: non ci possiamo però servire di questi mezzi per quei, che hanno una larga base: s'investono con li tonici additati, purchè non sieno, nè lividi, nè paonazzi, nè dolorosi; segni cancerosi, che hanno talvolta i porri del naso, delle labbra, e delle palpebre: finalmente se questi tubercoli compariscono in gran numero, si dee temere un vizio negli umori, che può richiedere, dopo i rimedj generali, i depuranti, i diaforetici, gli aperienti, gli squaelianti, ec. Quanto ai *corni*, non conosciamo, che l'essirpazione, o il caustico, col quale si circonda la base: questi due ripieghi riescono molto bene, quando questi tumori sono aderenti alla sola cute; ma possono essere pericolosi, quando hanno radici più profonde.

MORSO, E PUNTURA D'ANIMALI.

Se vi è accidente, che richiegga spediro soccorso, questo si è certamente il morso degli animali, sì arrabbiati, che velenosi: il menomo ritardo nell'applicarlo può costar la vita al paziente: tutto quello, che

dobbiamo fare in tali occasioni , riguarda tre oggetti. 1. Quello di far uscire il veleno della piaga , d'involupparvelo , o di distruggervelo , lo che si effettua con iscarificazioni , che scaricano la parte del sangue infetto ; per mezzo di coppette a vento , o succhiando ; colle applicazioni di grassj , di olj atti a fissare il veleno ; e finalmente col cauterizzar la parte , o applicandovi il ferro arroventito , o abbrugiandovi della polvere da schioppo. 2. Quello di chiuder gli l'ingresso nel sangue ; la legatura molto stretta sopra la ferita , quando la parte n'è suscettibile , è la sola cosa , se ne eccettuiamo l'amputazione pronta della parte ferita , che possa produrre questo effetto. 3. Finalmente quello di combattere il veleno , che si è insinuato nel sangue , o d'agevolarne l'evacuazione : i mezzi più noti , e i più approvati , si raggirano intorno ai cordiali , e agli aleffiterj , come la triaca , l'orvietano , il mitridato , gli spiriti , i sali volatili degli animali , quello di vipera , di corno di cervo , e d'orina , l'acqua di lucia ; e finalmente i diuretici , i sudorifici , ed altri evacuanti. Tale è , generalmente parlando , la medicatura , sì esterna , che interna , che conviene alla morsicatura degli animali : si può applicarlo ancora alla pericolosa morsicatura di certi tali insetti ; ma si dee variare a norma delle circostanze : e questo è il soggetto del picciolo piano , in cui ora entriamo .

Si sa , che l'uomo , il cane , il lupo , il gatto , il cavallo , il mulo ec. sono gli animali più esposti alla *rabbiosità* , e che la comunicano col morso . Noi rimettiamo al seguente Articolo ciò , che riguarda l'idrofobia : in questo faremo soltanto parola della medicatura della piaga , ch'è senza dubbio il più certo di tutti i preservativi . Il cauterio attuale può con prontezza distruggere il veleno lasciato dall'animale nella piaga , ma poche persone hanno il coraggio di sottoponervisi : per li più timorosi si avvicina il ferro arroventito più vicino alla morsicatura che si può , colla mira di fare in un tempo più lungo quello , che si potrebbe eseguire in un istante : s'abbrugia anche sopra la piaga della polvere da schioppo ; ma pare , che questo fuoco non penetri tanto addentro , quanto quello del ferro rovente . Alcuni si contentano di fare delle scarificazioni profonde , sopra le quali applicano una coppetta , che ne tiri a se tutto il sangue infetto :
quando

quando non permette ciò la configurazione della parte, si procura d'evacuarla colla replicata compressione; poichè sarebbe cosa imprudente il farla succhiare. Uno dei punti principali si è il conservare questa piaga aperta lungo tempo, e per lo meno 40. giorni: alcuni hanno esteso questo tempo fino a sei mesi: quando si trova la piaga chiusa, lo che segue in brev'ora, se si lascia in balia della natura, si dee riapirla, e farla suppurare: sono utili le fregagioni mercuriali alle parti circonvicine; ma queste riguardano meno la piaga, che il male, che si dee temere.

Il veleno, che la vipera lascia col suo morso, è più, o meno attivo, secondo il grado di collera, che agitava l'animale, e quello del calore del clima, o della stagione: si dee anche contare sopra il maggiore, o minor terrore, ch'è inseparabile da questo stato; vi sono alcuni esempj di persone, che non hanno vissuto, che poche ore dopo questo accidente; ed altre, che non son morte prima del secondo, o del terzo giorno, e talora più tardi. Questa morsicatura, come ben si vede, è seguita da terribilissimi accidenti: oltre il dolore intenso, e la flogosi, che occupano la piaga, e stendonfi alle parti adjacenti, tutto il corpo si gonfia: la bocca s'inaridisce; hannosi vomiti biliosi, oppressioni, languore, ansietà, palpitazioni, il singhiozzo, ec. il polso è intermittente: il paziente si lagna di vertigini, e d'intorpidimento; finalmente precipita in tremori, in convulsioni, in sudori freddi, ec. Questo morso, più da temersi di quello degli animali arrabbiati, deve esser medicato alla foggia istessa: si fa una legatura sopra la piaga, quando la parte l'ammette: si cauterizza, come dicemmo; fannovisi della scarificazioni, sopra le quali si applicano le coppette: si può anche far succhiare la piaga senza pericolo, perchè il veleno della vipera perda la sua azione nelle prime vie, lo che non segue in quello della rabbia. Vien grandemente vantato il grasso di vipera; ma per me non credo, che abbia maggior virtù dell'olio d'oliva, dal quale sonnovi sperimentati in queste occasioni ottimi effetti: vi sono di quelli, che schiacciano la testa della vipera, e l'applicano alla piaga: altri si servono d'un cataplasma fatto coll'aglio, colla triaca, e col sale ammoniaco; e par, che l'esperienza confermi l'efficacia di tutti questi topici; ma la medesima ci fa anche

C a

che conoscere la superiorità dei soccorsi chirurgici : sì gli uni , che gli altri debbon esser prontamente applicati , poichè senza una tal condizione riusciranno infruttuosi . La difficoltà di procurargli sul fatto stesso determina la maggior parte dei contadini , che sono i più esposti a siffatti accidenti , a tagliarsi il dito , ch'è stato ferito , col primo istrumento , che dà loro fra le mani : veramente il rimedio è violento , ma è sicuro . Si dà per bocca la polvere , il sale di vipera , l'acqua di lucia , ed altri *alcali volatili* ; e finalmente i cordiali , e gli aleffiterj più usuali , i cui buoni effetti sono a chicchessia palesi . La morficatura dell'aspide , che uccide in due , o in tre ore , quando il paziente non è aiutato , richiede la stessa medicatura , come altresì quella d'altri serpenti velenosi ; ma è bene il sapere , che quegli , che s'incontrano presso di noi con più frequenza , non son tali .

Il morso del rospo , che sappiamo non aver denti , non è da temersi , come quelli , dei quali abbiamo finora parlato : tuttavia non lascia d'essere pericoloso , per trovarsi nella sua bava , come nella sua orina , un veleno penetrantissimo : gli alimenti , che usiamo , possono essere infetti dell' uno , o dell' altro ; e pare , che l'esperienza ci abbia fatto sapere , ch'è ugualmente pernicioso , o sia , che attraversi la cute , o sia , che passi per le prime vie mescolato con gli alimenti . Il segni di questo veleno sono la gonfiezza , e una species d'itterizia , il vomito , l'annegrirsi della lingua , e delle labbra , la vertigine , le convulsioni , la sincope , ec. Si può difendersi dai rei effetti di questa morficatura , con lavare incontanente la parte infetta dalla bava coll'acqua , coll'orina , col vino , ec. Se questo veleno si è intinuato con gli alimenti , del che altri non s'avvede per lo più che troppo tardi , si eccita il vomito , e le altre evacuazioni , che possano espellerlo : nell'uno , e nell'altro caso si usano i cordiali , gli aleffiterj , i diaforétici , ec.

La puntura dello scorpione nei climi temperati è poco pericolosa ; ma la faccenda passa diversamente nei paesi caldi , ove può eccitare dei dolori per tutto il corpo : allora s'infiamma la parte punta ; talora sopravviene il vomito , il singhiozzo , i tremori ec. Viene molto vantato l'olio di scorpione ; ma siccome non è sempre agevole il poterne avere , si otterrà il vantag-

gio medesimo applicando l'olio d'uliva , che si trova per tutto . Quando si crede la cosa grave , possiamo servirci del cauterio attuale , delle scarificazioni , ec. come nei casi precedenti ; ma è cosa sommamente rara , che altri vi ricorra : si crede , che l'animale infianto , o applicato alla piaga sia un rimedio sovrano : sia com'esser si voglia , altri non arrischia nulla a servirsene , quando non si possano avere altri ajuti : in questo luogo non debbono trascurare nemmeno i cordiali , e gli alestiterj , e sarà sempre bene il servirsene più presto che sia possibile .

La puntura del ragno non si dee temere più di quella dello scorpione : tuttavia ve ne sono dei velenosi , senza intendere della *tarantola* , di cui parleremo nell'appresso Articolo : abbiamo motivo di temere le conseguenze , quando la parte s'infiamma , quando prende un color piombino , o che vi si alzano delle pustule ; allora i pazienti non istanno molto a provare delle nausee , un torpore per tutto il corpo , il sopimento , o il delirio , tremori , convulsioni , ec. Il cataplasma d'aglio , e di triaca , il latticcio di fico , col quale si fomenta la parte , sono topici molto usati ; bisogna aggiungervi quelli da noi proposti per li casi precedenti , di pari che gli antidoti , i sali volatili , e gli altri rimedj interni , dei quali abbiamo pure parlato . Non vi è gran pericolo ad inghiottire un ragno ; tuttavia non si lascia di provarne dell'inquietudine : è sempre cosa prudente l'eccitare il vomito , ed usare gli ordinarij preservativi .

La puntura delle vespe , e delle api eccita , com'è noto , una gran flogosi con in mezzo una pustula bianca ; ma un tale stivamento non è pericoloso ; e si dilegua in capo a tre giorni : tuttavia quando altri è stato punto in più luoghi , può risaltarne la febbre , ed accidenti fastidiosi , che vogliono le *cavate del sangue* , e il governo , ec. L'ollo , l'orina calda , colla quale si fomenta l'ensanguinazione : i cataplasmi emollienti , la triaca stemprata nell'acquavite , ec. sono i topici , per quanto ci ha dimostrato l'esperienza , i più acconci a dileguare l'infiammazione , o a fermarne l'avanzamento ; ma bisogna aver cura di cavarne fuori prima il *pungiglione* , che il più delle volte resta nella piaga . La puntura dei tafani di attuta colla saliva , coll'olio , coll'aceto , col sugo di limone , ec. ma pochi ricorro-

no a questi mezzi , se le punture non son moltiplicatee trasmodatamente .

IDROFOBI'A, E TARANTISMO .

Si rileva quanto basta la *rabbia*, ch'è dichiarata ; ma non è sempre agevole il distinguerne i forieri ; ed è anche più malagevole il ben giudicare dei casi , che debbon farla temere : eppure una tal decisione è d' infinita importanza , avvegnachè si possa facilmente impediree questo morbo , quando se n'è minacciati , dove s'investe senza frutto , quando è ormai manifestato : non si può intorno a ciò pronunziare senza esitanza , se non quando siamo sicuri , che uno è stato morso da un cane , o da qualunque altro animale arrabbiato .

Siccome i cani sono gli animali , alla cui rabbia noi siamo più esposti ; così c' importa molto il poter decidere dello stato loro , alcuna volta assai equivoco . Quei cani , che sono investiti da un tal funesto morbo , non abbajano , o hanno soltanto una voce rauca , che spaventa gli altri cani : si nascondono , oppure camminano malinconici , colle orecchie , e colla coda dimessa : non vogliono nè bere , nè mangiare : si scagliano sopra gli altri cani , ed anche su gli uomini , e non rispettano in questo primo grado di rabbia , che il solo padrone ; ma in brev' ora non lo conoscono più , e divengono furiosi : allora tengono la bocca aperta , e tutta piena di schiuma ; tengon la lingua fuori , e pajono senza fiato : ultimamente mancano loro le forze , e muojono convulsi . Il morso loro in quest' ultimo tempo è più pericoloso ; ma siccome la loro malattia è allora manifestissima , così è cosa rara , che altri si lasci sorprendere . Il veleno della rabbia è a segno sottile , che può insinuarsi nel sangue pel solo contatto della bava , senza che vi sia stata piaga : si pretende ancora , che questa bava disseccata da lungo tempo sopra la biancheria , o sopra gli abiti , possa fare arrabbiare ; e questo fatto , tuttochè sommamente straordinario , par , che venga confermato da moltissime osservazioni .

Il germoglio di questo orrido morbo cova talvolta nell' uomo per mesi , e anche per anni : ma il più delle volte si sviluppa prima del quarantesimo dì della morficatura . L' *Idrofobia* è d' ordinario annunziata da acuti dolori , che sentonsi nella parte , che fu ferita ; da fremiti , e sbadigliamenti frequenti : quindi i dolori

si spargono per tutto il corpo , si perde il sonno , si ha una forte inclinazione alla collera , e uno s' abbandona a sì cupa tristezza , che fa fuggire la società perfino dei parenti , e degli amici più cari . Tali sono i preludj di questa fatale infermità : quindi si manifesta per un orrore , che ha il paziente d' ogni sorta di liquido , benchè sia martirizzato da un'ardentissima sete , e che sentasi abbrugiare da un interno fuoco ; dal vomito , e dal singhiozzo , dai serramenti di petto , dai soffogamenti , ed anche dagli strangolamenti , come nell' angina vera : il polso è debole , e disuguale ; la bocca si empie di schiuma ; la piaga , s' era chiusa , si riapre : gli occhi si smarriscono , lo spirito si altera : i pazienti anzichè gridare , urlano , e fanno degli spaventevoli scontrimenti di viso : hanno degli urti di mordere sì fieri , che non potendovi resistere , divengon furiosi : ultimamente sono afferrati da universal convulsione , dalla quale non vanno al coperto le parti genitali , o precipitano in sincopi , che gli portano via sul terzo , o sul quarto giorno del male dichiarato . La *rabbia* nella maggior parte viene per accessi ; ma non vi si osserva alcuna regolarità , nè nella durata , nè nel riattacco : molti nell'ingresso del parossismo conservano tanta ragione , che s' accorgono d'aver voglia di mordere , e pregano perfino d'esser legati ; si pretende d'averne veduti di quelli , che non avevano orrore per la bevanda : ma eran eglino costoro veramente idrofobi ? Si crede ancora d'aver incontrato delle *rabbie spontanee* ; ma non posson darsi tali morbi , che inducano il paziente a ricusare ogni bevanda senza essere arrabbiato ? E' noto , che osservasi talora questo sintoma nelle febbri maligne , e nell' affezione isterica : può per altro accadere , che uno sia stato toccato , e anche morso da un cane arrabbiato senza saperlo , e senza ricordarsene ; e in questo caso non posson produrre lo sviluppo di questo fermento una febbre acuta , o qualunque altra circostanza ? Questi son dubbj , che può sciogliere la sola osservazione . L'apertura dei cadaveri ci ha fatto vedere , che le viscere erano estenuate , o disseccate ; che gli organi della deglutizione erano pieni di bava , e talora infiammati ; sonosi vedute ancora altre flogosi ; e si è finalmente osservato molto costantemente , che la bile covando , non meno nei suoi proprj ricettacoli , che nelle prime vie , era verde , e nericia .

Non

Non replicheremo in questo luogo il da noi detto della medicatura della piaga, che dee esser rinnovata, quando è chiusa: ci ricorderemo, che questo è uno dei punti più essenziali, tuttochè molto comunemente trascurato. Si debbono anche gittar via gli abiti, che possono essere stati toccati dalla bava, avvegnachè la lunghezza del tempo non basterebbe per assicurarci di questo pericolo; nè ci mancano esempi di persone, che per tal motivo sono state vittime della loro ignoranza, o della loro incredulità. Ognun sa, che l'immersione nell'acqua marina, o di fiume passa per uno de' migliori preservativi: molti hanno tentato di screditar quest'uso, e poi hanno dovuto conformarvisi: se tutti coloro, che si sono immersi nel mare, non hanno schivato la *rabbia*, forse ne possiamo accagionare il modo, con cui vi si sono bagnati: è meno il bagno, che la sorpresa, quello, che guarisce, o il terrore, che si ha l'arte d'inspirare a coloro, che si precipitano tutt' in un subito nel mare: quanto a me, quando è stata eseguita una tal circostanza, non ho mai veduto fallire questo rimedio; e appunto per una tal ragione questo preservativo non può convenire ai cani, ai quali è perpetuamente riuscito inutile; si replica questa operazione più volte ogni giorno, tenendo il paziente per un mezzo minuto in circa nell'acqua; questa faccenda dee continuarfi per dieci, o dodici giorni.

Si propone in seguito la *polvere del Palmario*, quella d'ostrica calcinata, il *lichen cinereus terrestris* di Rai; i cordiali, gli astringenti, e i diaforetici: pare, che sieno bastantemente confirmati i buoni effetti di tali preservativi: ma l'uso, sì interno, che esterno del mercurio, merita il vanto incontrastabilmente sopra tutti: questo rimedio non è tanto moderno, quanto altri pensa: ne vien fatta menzione negli scritti del *Palmario*: veramente era andato affatto in dimenticanza, e n' è stato cavato fuori di nuovo ai dì nostri. Si può assicurare dal numero delle osservazioni, che abbiamo intorno a questa materia, che il mercurio non è meno specifico della rabbia, di quello sia del malfrancese. Si può dar per bocca il turbitto minerale, il mercurio dolce, la panna, e il cinabro alla lor dose ordinaria, la quale si replica cinque, o sei volte, ponendo alcuni giorni di intervallo: molti praticano d'unirci la canfora, e questo metodo mi sembra proficuo: fannosi altresì delle

fre-

fregagioni colla pomata mercuriale ordinaria, della quale vi s'impiegano due, o tre grossi. queste si replicano ogni tre, o quattro giorni, come pel celtico, e fan-
nosene dalle otto alle dodici. Il mercurio preserva,
ed anche guarisce i cani: si fanno loro inghiotture otto,
o dieci grani di turbita per cinque, o sei giorni di segui-
to, e poscia si pongono degli intervalli fra l'ammini-
strazion del rimedio: ma se il male è dichiarato, si
raddoppia la dose, che si replica tre, o quattro volte;
questo rimedio risveglia d'ordinario in essi la salivazio-
ne, che mostra d'esser proficua. Finalmente il mercurio,
si dia in qualsivoglia guisa, non solo è per gli
uomini il preservativo più sicuro, che si possa impiegar-
e contro la rabbia; ma può ancora guarirgli: fa però
di mestieri, come per li cani, raddoppiarne le dosi, e la
rimedia n'è certissima. Fannosi inoltre nel tempo del
parossismo cavate di sangue fino al deliquio: si pongono
i pazienti nel bagno, spruzzando loro la testa, e la
faccia, per più lungo tempo, che sia possibile: per cot-
tal mezzo sonosi dileguati i più orribili accessi; se gli fa
inghiotture la quantità maggior che si può d'una be-
vanda rinfrescante, e acidula: se gli applicano dei cli-
steri della stessa natura: il nitro, e la canfora son molto
proprij per tale stato: talvolta vi è necessario l'emetico,
e per quest'uso il più adattato è il turbita minerale:
finalmente è di questo morbo, come degli altri tutti,
bisogna saperne variare la medicatura, avvegnachè le
circostanze non si somiglino giammai.

Il *tarantismo*, del quale ci resta a ragionare, è una
specie di delirio cagionato dalla puntura d'un *ragno*,
che trovasi non solo a *Taranto*, ma ancora in molti
altri luoghi del Regno di Napoli, d'Italia, e di Cor-
fica; la sua puntura non è da temere, che nel gran
caldo: questa s'infiamma, come quella dell'ape, ed è
ora dolorosa, ora irritata: l'abbandonamento, e l'
ansietà, che l'accompagnano, precipitano i pazienti
nella più profonda tristezza; provano in questo stato
dei ferramenti di cuore, e dell'oppressione: turbausi lo-
ro gli occhi: si guasta la loro immaginazione, e fa lon-
fare mille strane cose: questo tristo, e deplorabile sta-
to non gl'impedisce d'esser sensibili ai suoni, e ai co-
lori allegri, come il verde, il rosso, il giallo. Ve ne
sono di quelli, che cadono come colpiti dal fulmine, e
muojono sul fatto; altri vi soccombono in pochi giorni.

Quei,

Quei, che la scappano, hanno delle ricadute ogni anno nel tempo medesimo.

La puntura della tarantola dee esser medicata, come quella degli altri animali velenosi: si praticano a un di presso gli stessi preservativi, fra i quali i cordiali, e gli alexiterj non son trascurati: ma questi rimedj erano un tempo di lieve ajuto, quando il puro caso fece scuoprir quello, ch' è il solo specifico: è questo il ballo eccitato dal suono d'istrumenti; e l'esperienza ci ha insegnato a farlo durare circa dodici ore per giorno, e continuare al più al più per quattro, o sei giorni: ogni sorta di sinfonia, ed ogni istrumento non ha la stessa efficacia: nè si può indurre a ballare il paziente, se non dopo varie prove, e tentativi diversi, per conoscer l'aria, e l'istrumento, che lo muova, fino che il sudore, e la debolezza lo forzano a riposarsi: è stato osservato, che le dissonanze lo investono disgustosamente, e che sono anche capaci d'interromperlo, e sospendere l'effetto di questo stravagantissimo rimedio, il solo efficace, che finora sia noto.

CONTUSIONI, E PIAGHE.

Si sa, che l'echimosi, e l'enfiagione flemmonosa sono inseparabili da contusioni più o meno ree, secondo il loro grado di violenza, e la struttura della parte, che n'era la sede: poichè e chi non sa, che abbiamo grandemente da temere dalla contusione dei testicoli, e delle mammelle; ch'è sommamente pericolosa quella della testa, che quella delle viscere è quasi sempre mortale, ec.? Le contusioni terminano il più delle volte colla risoluzione; tuttavia deesi talora temere la suppurazione, ed anche la cancrena; per non parlare delle lussazioni, e delle fratture, che formano delle complicazioni perpetuamente di rea conseguenza. Le contusioni della testa son con frequenza accompagnate dalla compressione, o dalla frattura delle ossa: l'emorragia del naso, o delle orecchie, le nausee, la perdita del conoscimento, la febbre, il delirio, e altri accidenti, dei quali parleremo nell'Articolo della commozione, dinotano il pericolo. Quelle del petto, per cui le costole si slogano, e si fratturano, danno occasione alla tosse, all'oppressione, allo sputo di sangue, ec. Quelle del basso ventre possono comunicarsi alle viscere, senza che comparisca rossore, nè lividura al di fuori: ma la tensione

ne dell'addome, la difficoltà del respiro, la lesione delle funzioni, la febbre, e gli altri sintomi dell' infiammazione, ne sono i segni quasi certi. Ci fa vedere ogni giorno l'apertura dei cadaveri, che fanno in tutte queste cavità degl' inondamenti di sangue, che danno motivo alla putrefazione, e alla cancrena.

E' noto, che le contusioni, e le piaghe si trovano spesso insieme; la maggior parte di queste seconde danno copia di sangue, il quale fermandosi forma a poco a poco una crosta, per la caduta della quale scola una ferosità tinta: se la piaga è considerabile, i contorni s' infiammano, e suppurano sul terzo, o sul quarto giorno. Esce poco sangue, e non n' esce gocciola, se non fosse dai vasi grossi nelle piaghe fatte da armi da fuoco, avvegnachè formisi un' escara, che lo trattiene; ma quando questa dopo alcuni giorni cade, ne sgorga sovente in copia grande: queste specie di piaghe suppurano difficilmente, e talvolta degenerano in ostinatissima ulcera. Il dolore, l' infiammazione, e la febbre, accompagnano necessariamente le grandi piaghe, di pari che le gagliarde contusioni: la complicazione di questi due casi è sempre assai trista, e dà talora occasione alla cancrena: è noto, che le piaghe avvelenate di rado sono curabili. Finalmente si fonda il pronostico delle piaghe sopra la cognizione non solo della struttura, e degli usi della parte ferita; ma ancora sopra la forma dell' istrumento tagliente, pungente, o comprimente: un' arteria tagliata a traverso produce un' emorragia, che si ferma a grandissimo stento: ella è, come ben si vede, meno considerabile, se il vaso sia semplicemente intaccato; ma allora dee temersi l' aneurisma; i nervi tagliati, se sono considerabili, cagionano l' assideramento, la paralisi, e l' estenuazione della parte, per dove si distribuiscono: quando sono semplicemente feriti, o punti, eccitano orribili accidenti, come un dolore intensissimo, che si spande sopra le parti vicine, uno stivamento infiammatorio con molto calore, la febbre, il delirio, le convulsioni, ec. Queste specie di piaghe suppurano con grandissima difficoltà; quelle delle articolazioni formano una sinovia, che si attraversa alla loro riunione; e lo stesso avviene di quelle dei tendini, e delle aponeurosi: le une, e le altre vanno con facilità a putrefarsi: parleremo altrove della puntura del tendine nel cavar sangue.

gue . Non abbisogna il dire , che le piaghe penetranti , sì nella testa , che del petto , e del basso ventre sono perpetuamente pericolose : così distinguonsi dalle altre per l' attenzione , che si usa d' esaminarle colla tenta , per iscuoprirne dalla loro profondità e direzione , quale sia la parte ferita : quelle della testa , di pari che le percosse , e le cadute , possono affondare , o frangere le ossa del cranio , e cagionare delle ree commozioni : il grondar sangue dal naso , e dalle orecchie , il sopimento , e altri sintomi , dei quali già parlammo , manifestano il pericolo . Abbiamo detto riguardo al petto , che quelle del cuore erano mortali : uccidono per lo più sul fatto stesso : tuttavia sonosi veduti vivere alcuni in questo stato fino a dodici giorni : meno pericolose son quelle del polmone : eccitano queste la tosse , lo sputo di sangue , e l' oppressione : le parti intorno alla piaga si gonfiano ; n' esce dell' aria , e del sangue spumoso . Le piaghe del diaframma cagionano dolori violenti , e delle soffogazioni , la febbre acuta , e il delirio , il singhiozzo , deliquj , convulsioni , il riso sardonico , ec. Non vi è da temere gran fatto meno delle piaghe del basso ventre ; non si guarisce quasi mai di quelle dello stomaco , e dei piccioli intestini : il pericolo poi , ch' è unito a quelle delle altre viscere , è relativo agli usi loro . Le grandi emorragie non meno delle piaghe penetranti del petto , che di quelle del basso ventre , manifestano l' apertura d' alcun vaso grosso , e annunziano una morte non lontana : importa molto nell' une , e nell' altre il sapere , in qual situazione trovavasi il paziente , quando ha ricevuto il colpo , ed il rilevare per mezzo della tenta , come additammo , la profondità , e la direzione della piaga : può anche cavarli qualche lume dalla lesione delle funzioni .

Le contusioni considerabili , come le grandi piaghe , richieggiono varie cavate di sangue : giova nell' uno , e nell' altro caso l' evacuar le prime vie per porci al coperto dei rei sughi , che possono introdursi nel sangue , e rendere il male assai più grave . La chiara d' uovo , l' aceto , lo rose rosse , il sangue di drago , e altri *repercussivi* applicati sul fatto stesso , si convengono alla maggior parte delle contusioni , e possono impedire la *flussione* ; ma se questa è formata , si praticano i *risolventi* , e i *fortificanti* , come il vin generoso , l' acquavite

te semplice, o canforata, l'acqua vulneraria, o quella della Regina; l'acqua di bolo di Marte, la trementina, il balsamo del Perù, quello del Fioravanti, e del Commendatore; il sale rinchiuso fra due pezze, e stemprato nell'orina, o nell'acqua calda; il prezzemolo pestato coll'acqua vulneraria, colla triaca; i cataplasmi risolvendi, nei quali si fa entrare la radice di brionia, quella della consolida maggiore, ec. Quando i dolori sono acuti; si attutano colla midolla di pane; se vi si genera della marcia, si medica il tumore, come il flemmone: seguono talora degli stravasamenti di sangue, che obbligano a fare un'apertura, colla mira di disimpegnar la parte, e di poter in seguito riparare all'emorragia con li mezzi noti: la medicatura delle fratture riguarda i mali delle ossa. Quando la contusione è considerabile, fanno si prendere internamente i *vulnerarij*, gli *assorbenti*, e i *diaforetici*: tali sono le infusioni a foglia di thè dell'erbe vulnerarie, dell'issopo, dell'ellera terrestre, ec. i sughi di cardo benedetto, di cerfoglio, di prezzemolo, ec. i *terebentinati*, e i *balsami*; il corno di cervo, il corallo, gli occhi di granchio, ec. lo spermaceo, il sangue d'irco, il succino preparato, il sal volatile di corno di cervo, ed altri di questa natura; l'antimonio diaforetico, il balsamo del Lucatelli, la triaca, ec. Finalmente non si è finora trovato cosa migliore per le contusioni generali, prodotte o da percosse, o da cadute, dell'inviluppare il paziente in una pelle di castrato calda calda, che si rinnova quando si crede a proposito.

La cura delle piaghe è opera della natura, che può veramente esser fiancheggiata dall'arte, coll'allontanar tutto quello, che si oppone alla guarigione, o avvicinandone i contorni: la medicatura delle piaghe semplici, senza perdita di sostanza, è delle più agevoli; si lasciano evacuare a dovere, e si avvicinano le labbra: si conservano in questo stato con una fascia, la quale non si leva, se non alquanti giorni dopo, e la quale si bagna tratto tratto coll'acquavite, o coll'acqua vulneraria: non bisogna troppo toccare le piaghe recenti, e l'esperienza ha fatto pur troppo conoscere, che le frequenti medicature, di pari che le tatte, e le caldelle, delle quali tuttora si servono alcuni Ceruici, non possono se non ritardare la loro guarigione: le *piante vulnerarie*, gli *spiritosi*, i *balsamici*, i *bals-*

*balsamo sammaritano, l'acqua di palla di Marte, la polvere simpatica, e infiniti altri topici, dei quali parlano tutte le Farmacopee, possono praticare con vantaggio. La suppurazione, come dicemmo, si stabilisce verso il quarto giorno nella maggior parte delle piaghe: ella è assolutamente necessaria in tutte quelle, nelle quali vi è contusione, e intrappamento di parte; sicchè deesi favorire con topici atti a produrre questo effetto: i più messi in opera hanno per base la trementina, i tuorli d'uovo, l'olio d'iperico, l'unguento della madre, ec. ai quali uniscono secondo le circostanze i detergenti, e gli antiputridi, come il miele, la gomma elemi, il balsamo del Perù, la mirra, e l'aloe, l'*elixir proprietatis*, ed altri da noi proposti nell'Articolo delle ulcere. Si ferma l'emorragia colla legatura, quando può farsi; e con gli *istitici*, come coll'acqua di palla di Marte, l'allume abbrugiato, la polvere simpatica, ec. Ci serviamo anche con vantaggio per lo stesso accidente di quella specie d'agarico, del quale si fa l'amido; materia, di cui tutto il merito consiste nel poter a motivo di sua flessibilità servir di turacciolo ai vasi aperti. Gli *astringenti*, e i *dissecanti* giovano per le piaghe delle articolazioni: l'olio di trementina, e della perforata, il balsamo del Perù, l'*elixir proprietatis*, ec. sono adattatissimi a quelle dei nervi, e dei tendini; se questi secondi sono intieramente troncati, e che si possano riunire i pezzi, e tenergli fermi, si salderanno facilmente, di pari che le ossa; ma la cucitura sembra il mezzo più sicuro per fissargli, qualora la ammetta la loro grossezza. Per le piaghe d'arma da fuoco, prima di tutto bisogna estrarne ogni corpo eterogeneo, e riparare all'emorragia, quando vi è: la prima medicatura dee essere a secco: in progresso pongonsi in opera i digestivi, gli emollienti, ec. Quantunque il primo oggetto della medicatura di tutte le piaghe sia la lor cicatrice, non è però sempre permesso il favorirla; che anzi bisogna opporvisi ogni volta che non si vede il fondo della piaga, o che le carni sono di rea qualità. Nelle piaghe siamo talvolta necessitati a mettere in opera la cucitura: ella è singolarmente necessaria in quelle del basso ventre, che lasciano scappare fuori d'epiploon, le budella, ec. Quando queste seconde sono tagliate, siamo forzati a formare un ano artificiale con incollare i contorni del budello a quei dell*

la piaga . Quanto a ciò , che riguarda la medicatura interna delle piaghe , abbiamo detto , che non si dovevano risparmiare le cavate del sangue ; in questo luogo aggiungeremo , che il governo in simil caso è un punto dei più rilevanti : la febbre e gli altri accidenti richieggono dei *purganti* : si fa grand' uso degli *allentanti* , degli *umettanti* , ed anche dei *calmanti* , quando lo esigono i dolori , e le vigilie . Somministrano ancora ajuti da non dispregiarsi i *diaforetici* , e i *vulnerarij* . Ultimamente il *latte* , e le *acque minerali* danno l' ultima mano alla guarigione .

Dobbiamo in questo luogo fare eziandio parola di quella piaga superficiale , che si chiama *grattatura* , *excoriatio* . Questa vien comunemente cagionata da stropicciamento , da compressione , e simiglianti . Si fa , che nelle malattie di lunga durata , quando quei , che ne sono attaccati si stanno molto tempo corcati sulla medesima parte , vi si formano delle scorzature , le quali son precedute da macchie rosse , le quali si dee aver cura di lavare frequentemente con del vino caldo , o coll' acquavite canforata , allorchè vi si vede qualche negrezza : se non si può schivare la scorzatura , si asciugua con della polvere di cerusa , o di pietra calaminare , col ponsolice , coll' impiastro di Norimberga , con quello di cerusa , ec. ma il punto principale consiste nel difender la parte intaccata dalla compressione , e dalla sporcizia .

LA SCOTTATURA .

Dalla cognizione della parte offesa , come dall' estensione , e profondità della *scottatura* , si può giudicare delle sue conseguenze : fa inoltre di mestieri essere instrutti della natura , e della violenza del fuoco , o del corpo abbrugiante , di pari che del tempo più , o meno lungo , ch' è stato esso fuoco applicato alla parte : è noto , che la scottatura degli occhi , del volto , e del collo è sempre più rea di quella delle altre parti : sembra , che i carboni ardenti , i metalli roventi , o liquefatti , la polvere da schioppo infiammata , ec. producano a un di presso gli effetti medesimi ; ma il fuoco del cielo è senza dubbio il più violento . La *scottatura ordinaria* è seguita da un dolore acutissimo , dall' infiammazione , da pustole , e da varj accidenti relativi alle circostanze , di cui abbiamo parlato : ognun fa , che le piaghe , che ne sono le conseguenze , stanno molto tempo

a guarire, e che son più fastidiose, se il paziente è di rea costituzione: ci somministrano grandi esempj di questo fatto i cachetici, e gli scorbutici. Le scottature, a motivo dei loro gradi differenti, possono distribuirsi in tre classi, le quali corrisponderanno alle superficiali, alle mezzane, e alle profonde. Nella prima la scottatura è leggiera, e limitata alla pelle, che non ne è meno penetrata, il dolore è più o meno vivo; la parte s'infiamma, come se fosse stata punta dall'ortica; si alzano delle vesciche, e l'epidermi si separa. Nella seconda l'enfiagione, e il dolore son più considerabili, le pustole s'alzano sul fatto stesso, e la cute è ristretta, o raccorciata dal fuoco, che l'ha penetrata: la conseguenza ne è la suppurazione. Le scottature della terza classe penetrano talora fino all'osso, la pelle prende immediatamente un color livido, o nero, e perde il senso: è questa una specie d'escara, la quale cadendo lascia un'ulcera profonda, e putrida: questo stato dee riferirsi a quello della cancrena; è accompagnato dalla febbre, e dai più terribili accidenti; massime quando le parti liggamentose, tendinose, e nervose, sono intaccate. La scottatura del tuono è la più tremenda di tutte: ella degenera comunemente in cancrena, si fa, che quei, che son colpiti dal fulmine, cadono quasi sempre in sincope, o ne restano sul fatto soffogati.

I *repercussivi*, gli *addolcenti*, i *risolventi*, e i *digestivi* sono i topici più odoperati per la scottatura; ma non s'addicono nè a tutti i gradi, nè in tutti i tempi: il solo vino tepido, e l'acquavite semplice, o canforata sono state sempre adoperate per ogni sorta di scottatura: la scelta degli altri rimedj dee esser regolata dal grado della malattia. Si possono troncargli avanzamenti di quelle della prima classe, o sieno le leggieri, infondendo immediatamente la parte nell'acqua fredda, applicandovi del fango, della chiara d'uovo. L'aceto, l'inchioostro, ec. Ho veduto con molta costanza dei buoni effetti da questi metodi; ma sono di pari riusciti i contrarj: consistono questi nell'esporre la parte scottata al fuoco il più intenso, che altri possa comportare: nell'immerger la parte nell'olio, o nell'acqua calda; nell'applicarvi dell'acquavite canforata, dell'acqua della Regina, ed altri liquori spiritosi, della cipolla pesta, o sola, o mescolata col sale, e col sapone, ec. Gli addolcenti, come il ponfolice, il nu-

nitum, il *populeum*, il *cerotto di Galeno*, ec. sono pure topici usati molto. Per le scottature della seconda classe, o le mezzane, non si fa uso, nè di reperiussivi, nè di risolventi; ma di rilascianti, d'addolcenti, e di digestivi, come dell'emulsione comune, della midolla di pane, e d'altri cataplasmi emollienti; dell'unguento basilico, del *nutritum* del *cerotto di Galeno*, dell'olio rosato, di quello di gigli, d'uova, ec. Quando i dolori sono estremi, non si ha riguardo d'aggiunger l'oppio, non solo ai cataplasmi, ma anche agli unguenti: le cavate di sangue nelle scottature di questa classe, come in quelle della seguente, sono indispensabili, di pari che gli allentanti, gli addolcenti, e altri rimedj interni, che convengono all'inflamrazione, e alla febbre. Le scottature profonde, che collochiamo nella terza classe, richieggono spesso delle scarificazioni: vi si applicano eziandio i rilascianti, i calmanti, e i digestivi, quali appunto gli abbiamo proposti: si può aggiungervi la storace, lo spirito di vino canforato, ed altri *antiputridi*: in tutti questi casi si medica l'ulcera col metodo ordinario; ma quando la scottatura arriva fino all'osso, e che la mortificazione è troppo estesa, la sola amputazione può salvar la vita al paziente.

La scottatura degli occhi vuole replicate cavate di sangue, e i topici addolcenti, come il latte di donna, il sangue di colombo, l'acqua d'uova di granocchio, quella di rose, di piantaggine, ec. la mucilaggine di semi di lino, e di psillio; il cataplasma di mele cotta, ec. Se è rimasta scottata la faccia dalla polvere da schioppo, bisogna estrarne i granelli con un ago, poichè lascerebbero delle macchie nere indelebili: si è per fino forzati a riaprir la piaga con un vescicante, quando è stata trascurata tal precauzione sul principio. Quanto alla scottatura del tuono, oltre i topici, che fanno testa alla putrefazione, e alla cancrena, vi s'impiegano i cordiali più attivi, per far tornare in se il paziente; ma quando ha ricovrati i sentimenti, e che si lagna d'un fuoco nelle viscere, allora se gli fa prendere la limonata, ed altri rinfrescanti.

LA CANCRENA.

Quella, che viene accompagnata, o preceduta da dolore, e ardore, minaccia la parte di privazione di vi-

ta : si chiama *sfacelo* la mortificazione perfetta , cioè quello stato delle parti , che perdono il calore , e il senso , e ch' esalano altresì un odore cadaverico . E' la *cancrena secca* , e *umida* : nella prima la parte s' indurisce , e si raccorcia , senza pustole , e per lo più senza tristo odore : lo stivamento , le pustole , ed il fetore distinguono la seconda , ch' è la meno da temersi : tuttavia queste due specie di *cancrena* non differiscono essenzialmente , vedendosene con assai frequenza di quelle , che partecipano dell' una , e dell' altra , o che passano successivamente per questi due stati : si è anche osservato , come la *cancrena* delle gambe era talvolta secca da un lato , e umida dall' altro , lo che prova bastantemente , ch' è la stessa malattia , fatta variare da alcune circostanze da noi non rilevate . Aggiungerò in questo luogo , che la *cancrena di cagione interna* ora è secca , ora umida : è questa prodotta dalla mancanza di calore in un' età avanzata , nella paralisi , nell' atrofia , ec. Ella si è altresì la conseguenza d' alcuni veleni , dello scorbutico , del celtico , delle febbri maligne , pestilenziali , del vajuolo , dell' infiammazione , della resipola ec. La *cancrena di cagione esterna* è l' ordinario effetto della morsicatura , o puntura d' animali velenosi , delle contusioni , delle piaghe , della scottatura , dell' eccessiva sete , delle infiltrazioni edematose , e d' altri tumori : delle legature , degli strangolamenti , delle compressioni , delle lussazioni , delle fratture , ec. La parte investita dalla *cancrena* divien livida , o nericcia ; ora è raccorciata , ora infloscita , e vi s' alzano comunemente delle pustole : nella maggior parte precedono il dolore , e l' ardore : la perdita del sentimento è il principio dello sfacelo , o del total cessamento del calore , e della vita : allora la pelle si stacca di per sè , e sgorga dalla parte una sanie limpida , e fetente . La *cancrena* cagionata dal freddo fa dei progressi rapidissimi : la parte impallidisce , e divien rossa successivamente con un fiero pizzicore ; quindi si fa porporina , e nera : in questo stato non tarda a distaccarsi : le mani , i piedi , la punta del naso , e il lobo delle orecchie , sono le parti più esposte a questa specie di *cancrena* : quando giunge a un certo grado , penetra fino ai ligamenti degli articoli , e gli distrugge : veggionsi con molta frequenza dei piedi pel proprio loro peso staccarsi dalle ossa della gamba : sonosi trovati

vati corpi gelati nello stesso atteggiamento , in cui si trovavano prima della lor morte ; soldati con in mano le armi , persone a cavallo , che non avevano abbandonate le redini , ec.

La *cancrena di cagione interna* è la più pericolosa , essendo minacciate tutte le parti ; nè l'amputazione d'un membro ci assicura per gli altri : viene spesso annunziata dalla febbre violenta , e da dolori acutissimi ; le dita dei piedi son le prime a esserne investite ; quindi ella ascende , e si comunica alle altre parti ; il polso d'ordinario è concentrato , e intermittente : provansi cardialgie , sincopi , ec. La cancrena della bocca , quelle delle parti genitali , quelle , che investono gl'idropici , ec. sono le più ostinate . Si vede , senza ch'io lo dica , che la cancrena tanto più è terribile , quanto più addentro ella penetra ; vale a dire , oltre la pinguedine , nei muscoli , nei ligamenti , e nel periostio , e fino all'ossa : accade anche talvolta nel malfrancesco , nella spina ventosa , e in altri casi , che l'osso è la prima parte offesa ; ma siffatti effetti debbonfi piuttosto riferire allo sfacelo , che alla cancrena .

Fa d'uopo con prontezza opporsi agli avanzamenti della cancrena , ed estirpare le parti sfacelate : l'*alliarria* , lo *scordio* , il *decotto d'abrotano* nell'acqua salata , lo *spirito di vino canforato* , che talora si mescola coll'acqua di calcina ; la tintura di mirra , e d'aloë , alla quale si può unire lo spirito di sale ammoniacco , lo storace , l'unguento egiziaco , la triaca , ec. sono i topici più adoptrati , e i più atti a far testa alla putrefazione : ognuno conosce la necessità delle scarificazioni per fare staccare la parte sfacelata , ed eccitare per la sua caduta una buona suppurazione . La cancrena cagionata dall'eccessivo freddo si medica in altra guisa : bisogna da principio coprire , o stropicciare colla neve la parte gelata ; oppure applicarvi delle pezze di tela inzuppate nell'acqua fredda : poscia si stropiccia con pezze più ruvide per dare il calore gradatamente ; dopo di che si può immergerla nell'acqua tepida , o lavarla colla medesima . Non debbonfi trascurare i rimedj interni : in tutti i casi , se sono necessari , amministransi dopo i rimedj generali , i *cordiali* , e i *sudorifici* : tali sono i sali volatili , il giglio , l'*elixir proprietatis* , la triaca , ec. Tuttavia , quando il polso è elevato , e che sentesi interiormente molto calore , si

possono usare le limonate, ed altri rinfrescanti acidi, i quali, come ci fa veder l'esperienza, non son contrarj a questo stato. Non vi è ai dì nostri chi non conosca i buoni effetti della china-china per le cancrene della *cagione interna*: se ne dà una dramma di quattro in quattr'ore, oppure una maggior dose in clistere, come si pratica per la febbre intermittente: alcuni l'hanno amministrata anche nel vajuolo accompagnato da tacche cancrenose; ma lo stato della febbre, e quello del petto non permettono sempre d'usarla in tal circostanza: si pretende altresì, che questa corteccia giovi anche per la cancrena di *cagione esterna*; ma non per anche ci ha deciso cosa alcuna positiva intorno a ciò l'esperienza. Per altro coloro, che bramassero istruzioni più estese, troveranno fra le Opere di M. *Quesnai* il più compiuto Trattato, che siasi veduto sopra siffatta materia.

SEZIONE SECONDA.

Malattie esterne della testa.

C E F A L A L G I A.

SE diamo un'occhiata alle osservazioni anatomiche che entrano nel presente Articolo, non ci maraviglieremo delle grandissime varietà, che si sperimentano nei dolori della testa. Ve ne sono dei pungenti, dei lancinanti, dei contudenti, dei comprimenti dei gravativi degli ardenti, e perfino dei freddi. Siccome è talora di sì facilissimo nella pratica il distinguere il *dolore interno*, quello, che stanziava nel cervello, o ne' suoi involucri dall'*esterno*, che investe il pericranio, o gli altri integumenti, i seni frontali, e sfenoidali; così io ho stimato bene d'unire in questo luogo sì l'uno, che l'altro. Oltre questa differenza dedotta dalla sede del male sonovi eziandio dei mali di testa *simpatichi*, come quelli, che dipendono dallo stomaco; e dei *sintomatici*, che sono il prodotto della febbre, delle affezioni ipocordriaca, e isterica, del malfrancesco, dello scorbutico, della gotta, ec. ch'è ugualmente importante, che non si agevole il non confondergli con quelli, che hanno la sede

fede loro nel capo. E' noto, che il dolore occupante il cranio, addimandasi *cefalalgia*; che si chiama micrania quello, che investe una sola parte: s'intende anche per *chiodo isterico*, quello ch'è rinchiuto in un picciolo spazio; ma i dotti Pratici fanno benissimo, esserirvi dei dolori di testa, che non s'estendono di vantaggio, senza aver la menoma relazione coll' affezione isterica. Abbiamo altrove parlato di quella gravezza di testa detta *gravedine* (*gravedo*) sintoma della corizza, e di varj altri morbi. Dannosi anche dei mali di testa *periodici*, gli accessi de' quali son regolari, o irregolari; ed altri, che sono *continui*, con maggiore, o minor remissione.

L' evacuazioni sopprese, l' eruzioni tornate indietro, l' eccessive fatiche di corpo, e di spirito, le passioni violente, la sferza del Sole, le contusioni, e le cadute, il vapore del mosto, del carbone; l' abuso delle donne, del vino, e dei liquori, ec. sono le più ordinarie cagioni del male, di cui parliamo: è questo accompagnato da sintomi i più orribili, come si vede dopo la sferza ricevuta del Sole, dopo le cadute, e le contusioni, dopo il vapor del carbone, ec. che eccitano sfordimenti, la febbre, le affezioni comatose, l' apoplessia, la sincope, il delirio, le convulsioni, ec. Si sa, che la micrania è seguita dal vomito, da battimenti del cranio, ec. Il dolor di testa è sovente il foriere delle febbri maligne, e intermittenti; della vertigine, e dell' apoplessia; dei tremori, e dell' epilessia; della mania, e del delirio, della sordità, e dell' acciecamiento, ec. Precede questa talora la prima fioritura de' menstrui, e delle emorragie. L' uscita dei vermi dal naso, lo sgorro del sangue, e della marcia per la parte medesima, dalla bocca, e dalle orecchie, terminano con frequenza i mali di testa i più ostinati: quello, che dipende da un vizio locale, di rado è guaribile: il sintomatico segue l' evento della malattia principale: il periodico, tuttochè sovente ostinatissimo, è quello, che dà meno da temere: si è finalmente osservato, che le donne, e i vecchj sfentano più a liberarsene.

Veggiamo nei cadaveri le suture soverchio ferrate, o totalmente cancellate: le tavole ossee d' una grossezza straordinaria; affondamenti, e fratture; esostosi, e carie; squille, oppure ossa slogate; il dilungamento dei pezzi maggiori a motivo d' essersi allentata la loro con-

neffione , ec. fivamenti nelle vene del cervello , nei fenî della dura madre , e nel plefto corioide d' ordinario varicofo : la groffezza ftraordinaria della dura madre , la fua fortiffima adefione col cranio , e colla pia madre ; flatuofità follevanti queft' ultimo inviluppo ; offifcazioni alla falce , alla tenda del cerebello , ed altre parti della dura madre ec. Sonofi trovate delle flogofi , e delle fuppurazioni , non meno negl' inviluppi , e nelle altre parti del cervello , che nei fenî frontali , e sfenoidali ; tubercoli , e tumori , che hanno differenti fedî ; arterie offifcate , concrezioni pietrofe , idatidi , sì nelle cavità del cervello , che nella fua fuperficie , inondamenti di fiero , di fangue , e di marcia , non meno entro i ventricoli , che fra le due meningi , fra il cranio , e la dura madre , o negli anfratti del cervello ; vermi in tutte le parti di quefta vifcera , come altresì nei fenî frontali , e sfenoidali ; la cancrena , e la putrefazione , sì negl' inviluppi , che nelle parti del cervello , e del cerebello : quefte vifcere fonofi vedute in alcuni inondate di ferofità , e in altri inaridite , e perfino ftrittolabili ; e fi è anche veduta , febben di radiffimo , la loro totale diftruzione . Si è finalmente trovato nei ventricoli , e nella bafe del cervello , del mercurio , non folo in quei tali , ch' erano ftati medicati pell' malfrancefe , ma eziandio negli artefici efposti al vapore di quefto minerale : in quefti fecondi fonofene trovate più once , e fi pretende d' averne veduto una volta fino una libbra .

E' foverchio il dire , che la medicatura di quefto male , come dell' altre tutte , dev' effer diretta verfo la cagione , che l' ha prodotta ; ma quefta cagione è fpeffiffimo occulta : e tutto quello , che fi pensa , non è talora fondato , che fopra femplici congetture . Si può giudicarne dagl' innumerabili fconcerti da noi efposti ; fconcerti , che veramente fi poffono fofpettare , ma che fi manifefrano foltanto dopo la morte . Laonde noi proporremo folo una cura generale , la quale con alcune modificazioni , ch' efigono le circonftanze , fi potrà applicare a tutti i cafî , che danno fra mano : fi raggiira quefta principalmente fopra le cavate di fangue , dalla giugulare non meno , che dal braccio , o dal piede : voglion quefte effer fatte con prontezza , quando il mal di tefta nafce da una *folana* , da una caduta , dalla contufione , o da alcun altro accidente : l' arteriotomia per
i ma-

i mali di testa più ostinati ha talvolta fatto maraviglie : sono anche state proficue le mignatte applicate alla fronte , dietro all' orecchie , e ai vasi emorroidali : dirò finalmente , che il cavar sangue dalla giugulare mi è sembrato il più efficace per li mali di testa febbrili . Non si fa minor uso in questo morbo degli emetici , dei purganti , e dei lavativi , di quello facciasì in tutti gli altri : gli allentanti , gli adolcenti , i temperanti , convengono a quasi tutti i casi : l'acqua , o qualunque altra bevanda più semplice , come il brodo lungo di vitella , o di pollastra , il siero , ec. che si usa per total nutrimento , è il più efficace rimedio , che si possa applicare alla micrania , e agli altri mali di testa periodici ; si fa uso anche del thè , dell' emulsioni , ec. I centogambe , i marziali , e gli altri aperienti sono spessissimo adoprati per li mali di testa ostinati , e cronici , di pari che i diaforetici , gli antivenerei , gli antiscorbutici , ec. Si ricorre con frequenza ai calmanti , ed anche ai narcotici , come al nitro , alla canfora , al diacodio , allo sciroppo di Karabè , ec. Sonosi spesso sperimentati buoni effetti dai cefalici , e dagli antispasmodici : tali sono i fiori di tiglio , la melissa , la bettonica , la valeriana , la peonia , il succino , il castore , la polvere di guttera , i sali volatili , il cinabro , ec. Ad alcuni giova l' uso del caffè : la china ha sovente guarito mali di testa periodici : finalmente il latte , e le acque minerali , sì acidule , che ferrate , ci offrono ajuti noti a chiccheffia .

I rimedj esterni non la cedono ai proposti finora : i più efficaci sono i vescicanti , sì al dorso , che alle gambe , e sulla testa ; i sinapismi , il setone , e il cauterio : si fa , che la scottatura accidentale ha guarito da mali di testa abituali : se ne possono imitare gli effetti col *Moxa* , del quale altri si è servito talora con riuscita . Si ritrae anche gran vantaggio dal bagno , dal pediluvio , dalle fregagioni alle gambe , dalle docciarure alla testa , dagli sternutatorj , dall' odor della canfora sciolta in un liquore cefalico , dal profumo di Karabè , dall' applicazione della verbena , e della giubarba ; da un fazzoletto bagnato posto intorno al collo , che si muta tosto che si è riscaldato ; da una fascia doppia piena di midolla di pane , e di sale , dal cotone imbevuto d' etere , ec. Non si fa uso del trapano , se non per le fratture ; tuttavia dannosi parecchi casi , siccome si può rile-

levare dalle esposte anatomiche osservazioni, nei quali altri lo potrebbe felicemente praticare.

INSOLAZIONE.

Così addimandasi quel gravissimo male di testa, che si contrae per essere stati esposti ad un intenso calore de' raggi del Sole. Questa cagione, tuttochè patentissima, vien tuttavia ignorata con frequenza dai Medici, i quali non si curano d'interrogar gran fatto i pazienti negli Spedali. Le persone investite dall'*insolazione*, o *solana*, si lagnano con frequenza d'un fierissimo dolor di capo, o pulsativo, o aggravativo, accompagnato il più delle volte da intensa febbre, e da una fetor inestinguibile; e sembra loro di sentirsi scuotere, e strappare il cervello. Gli occhi infiammati, e asciutti dolgono ai pazienti, e temono la luce, oltre l'essere talora affatto chiusi a motivo dell'enfiagione delle palpebre, e dell'infiammazione. In alcuni seguono dei sussulti di testa involontarij. La maggior parte cade in affezioni comatose, nè si svegliano, s'è non vengano grandemente spaventati: altri poi passano le intere notti, senza velar l'occhio, e son molestati da perpetue visioni: questi suol afferrare il delirio con febbre, con accessi di furore, e di terrore; altri non attaccati dalla febbre, perdono la memoria di tutto, e cianciano da mentecatti. Alcuni finalmente vengono assaliti da convulsioni, o da tremori delle membra. La pelle poi del cranio, e della faccia, non altramente che fosse arsa da cuocentissimo Sole, si rileva inaridita, e come scottata; e non di rado s'innalzano dei tumori intorno all'orecchie, e nella cervice. Le forze inoltre si abbattano, massime a motivo de' copiosi sudori: le orine sono infiammate, e d'un color rosso carico: si provano ansietà, nausea al cibo, oppure s'eccita il vomito: alcuni finalmente, come i morsi da cane arrabbiato, hanno in orrore la bevanda.

Queste cose tutte però, come ognun vede, risguardano il grado estremo della *solana*: imperciocchè da un grado più mite ne nascono la corizza, la gravezza di testa, o il dolore, senza pericolo, l'angina, o altre affezioni catarrali, di cui altrove parleremo. Ma più crudele, e compassionevole si è la malattia, di cui ora trattiamo: conciossiachè la maggior parte degli assaliti dalla medesima muojono alla campagna sul fatto stesso;

so; singolarmente gli ubbriachi, i quali dormono esposti alla sferza del sole col capo scoperto; e un tale attacco poco, o nulla è diverso da una fortissima apoplezia: in altri poi la malattia suol prolungarsi fino ai dieci giorni, ed anche di vantaggio. In quei, che non sono stati uccisi dalla *solana*, dominano ostinatissimi dolori di testa appena curabili: in alcuni si turba la vista, o si dilegua totalmente: altri poi impazziscono, e tali proseguono ad esser per tutta la loro vita. Sottoposti all' *Insolazione* sono i viaggiatori, i contadini, i muratori, che fanno i tetti, ed altri operaj, che lavorano allo scoperto, mentre arde il sole cuocente. La stessa disgrazia incontrar sogliono coloro, che s' addormentano vicino ad un gran fuoco, un esempio del qual fenomeno fu riferito dal chiarissimo M. Tiffot, a cui dee molto la Medicina.

Nelle sezioni anatomiche sopra i cadaveri di coloro, che son morti per *Insolazione*, si rilevano delle flogosi, non solamente negl' involucri del cervello, ma anche nella sostanza di questa viscera. I vasi innaffianti l' altra meninge, turgidi di sangue negro, e terrefatto, e talvolta laceri a segno di profundarsi la linfa d' un color rosso, la quale in tal caso sgorga in copia maggiore per essere a tondo spaccato il cranio nella sutura: abbassati gl' involucri del cervello, si rilevano tumori flemmonosi, esulceramenti, e putrefazioni in diversi luoghi; talora la marcia si trova rinchiusa nel proprio follicolo; altre volte inondata fuori del suo ricettacolo infetta le parti adjacenti, e le corrompe. Si trovano orride putrefazioni, e mortificazioni più frequenti intorno all' orbita del cervello. I ventricoli stivati d' un siero sanguigno, o di puro sangue; in altri si trovan pieni d' una fetida materia. Ultimamente si osservano nella base del cranio le ossa cariate dalla marcia corrosiva, la quale, come si rileva più, e più fiate nella Pratica, si preparava un' uscita pel naso, e per le orecchie.

Il punto principale consiste nell' estinguere, o ammorzare il bollore del sangue, a questo riducendosi questa cura, che per altro si effettua con cose le più semplici. E' di vero adempiono tutte le mediche intenzioni in questo caso le cavate del sangue, e i refrigeranti presi per bocca, ed applicati esternamente. Adunque senza il menomo ritardo s' apra la vena, e tale evacuazione si re-

pli.

plichi secondo la veemenza dei sintomi : coll' ajuto di questa venghiamo a provvedere al sensorio comune , ed a placare i sintomi più pressanti . Vuotati i vasi quanto basti , si passerà incontanente a pediluvj , ai mezzi bagni , oppure ai bagni a mala pena tepidi . Fanno anche del bene i cataplasmi emollienti , e rinfrescanti . A un tempo stesso si fanno prendere ai pazienti copiose bevande d' acqua impregnata d' aceto , o di sugo di limone , di siero , d' emulsioni , e somiglianti . A taluni giova il decotto di tamarindi , particolarmente ove si teme la savorra prodotta da rimasugli di ree digestioni . Gran bene fanno similmente le fomentate fatte alla testa , alla fronte , e alle tempie , con acqua fredda , in cui vi sia stata mescolata una porzioncella d' aceto . Servono parimente per l' uso stesso il sugo di porcellana , di lattuga , e di verbena , che hanno il loro gran merito . Finalmente giovarono a molti , che si davano per disperati , i bagni freddi ; e per avventura nei casi urgentissimi non vi ha rimedio , che gli agguagli : è però vero , che non si può giammai farne uso , se prima non siano stati i vasi a dovere evacuati .

LA COMMOZIONE.

Le cadute , e le percosse alla testa possono cagionare nel cervello uno scuotimento ; o un urto , che si chiama *commozione* ; male seguito da orribili accidenti , senza che abbiavi frattura , nè abbassamento nel cranio ; ma accade con più frequenza , che le ossa si rompano , ora nello stesso luogo , ove ricevono il colpo , ora nella parte opposta : è noto altresì , che se il cranio conserva alcuna flessibilità , lo che non è raro nei giovani , il medesimo s' abbassa senza sfiancarsi . I segni ordinarj , sì della frattura , che della commozione del cervello , sono il vomito , lo sgorgo del sangue dal naso , dalla bocca , e dall' orecchie , la perdita della parola , la sincope , il sopimento , l' apoplessia , il tintinnio d' orecchie , l' oscuramento della vista , l' oftalmia , i rigori freddi , la febbre , il delirio , le convulsioni , la paralisi , l' involontario sbocco delle orine , e delle fecce , la stupidità , ec. siffatti accidenti non si producono talora in iscena prima del quarto , o del settimo giorno , e spesso anche più tardi : nella maggior parte annunziano stravasamenti , infiammazioni , suppurazioni , e la putrefazione ; oppure schegge d' osso , che pun-

pungono la dura madre. La gagliarda contrazione dei muscoli massilari, quando la frattura ha rapporto al crotafito, può eccitare un dolore, che la manifesti; ma non iscuopre quelle, che hanno altra sede: bisogna ricorrere alle ricerche chirurgiche notissime: l'abbassamento d'ordinario si rileva toccando. L'echimosi, l'enfisema, l'infiammazione, la resipola, e la piaga, sono segni sommamente equivoci della commozione, e della frattura; imperciocchè vi è talora l'una, e l'altra, senza che siane intaccata la cute; e veggionsi enormi strazj negl'integumenti, senza che ne sieno offese l'ossa, nè il cervello. Gli abscessi interni sono la più ordinaria conseguenza della commozione, e della frattura: formansi questi ora più presto, ora più tardi; in tali circostanze io ho veduto una suppurazione stabilita perfettamente sul terzo giorno d'una caduta: e importa l'efferne avvertiti.

L'apertura dei cadaveri fa con frequenza vedere fratture, fisure, allontanamenti nelle suture, ed abbassamenti, che non erano stati rilevati. Non sempre si trova, come abbiain detto, la frattura nella parte, che ha ricevuto il colpo, ma il più delle volte nella parte opposta: tutte le ossa del cranio fino alla rupe dell'orecchio, e la sella turchesca vi possono soccombere: si è in alcuni osservato, ch'era rotta solamente la seconda tavola, senza che la prima comparisse danneggiata. Non vi è cosa più comune del sangue stravasato, non meno fra il cranio, e la dura madre, che sotto questo involuppo, alla base del cervello, nei suoi ventricoli, ec. Si trovano altresì inondazioni serose in tutte queste parti: il cervello accasciato non riempie la sua cassa; i suoi vasi sfivati; l'infiammazione della sua sostanza, e de' suoi involuppi, suppurazioni, putrefazioni, cancrene in tutte le parti, carie nelle ossa, ec. Con frequenza sonosi veduti tutti questi sconcerti senza frattura, e senza la menoma contusione negl'integumenti. Finalmente sonosi scoperti degli abscessi nel fegato con grandissima frequenza.

Dal detto fin qui ne segue, che i colpi della testa sono in estremo pericolosi: gli accidenti indicati si producono talora troppo tardi; nè il paziente può esser sicuro nemmeno dopo i quaranta, o cinquanta giorni, essendosi vedute perir persone dopo tre mesi, e anche più tardi. Nei colpi violenti si dee più temere, quan-

do

do il cranio vi ha resistito, che quando si è fracassato, e n'è patente la ragione. Veggionsi ancora commozioni cagionate dalla caduta di corpi soffici, come materassi, fasci di fieno, ed altri, che cadano da una certa data altezza: ne sono state perfino prodotte da schiaffi, da semplici urti, ec.

Le *cavate del sangue* sono la base di questa cura: si fanno nel braccio, nel piede, nella giuncolare; avvegna- chè in tali occasioni il sangue non debba risparmiarsi. Bisogna anche colla maggior sollecitudine evacuare le prime vie, qualora gli accidenti lo permettano. Per bevanda si amministrano infusioni diaforetiche, e vulnerarie: è grandemente stimato in questi casi il sugo di cerfoglio, e di pimpinella nel vino bianco. Sopra la contusione si applica del prezzemolo pestato nell'acqua vulneraria. Fannosi fomento sulla testa col vino bianco, in cui siasi fatto bollire la salvia, lo stechos, lo spigo, e le rose rosse: si applicano cataplasmi, e facchetti preparati colle piante medesime, o con altri aromatici, e cefalici. I vescicanti, il setone, il cauterio, ed altri rimedj contro l'apoplessia, e la paralisi, si possono in questo luogo praticare con riuscita, quando i pazienti si trovano assopiti. S'è scoperto l'osso, ce ne dobbiamo aspettare lo sfogliamento: questo si può impedire, o affrettare con applicare in più luoghi il trapano forante; ma se vi è frattura non si può fare a meno di scuoprire la dura madre col trapano ordinario; non meno per impedire lo stravasamento del sangue, e la suppurazione, che per procurare l'evacuazione dei liquidi stravasati, e toglierne le scheggie, le quali pungendo la dura madre possono conservare gli accidenti. Il mastice sciolto nello spirito di vino vien riputato atto a favorire la riproduzione del periostio. C' insegnano i Pratici, che le piaghe della testa vanno medicate di rado, qualora non vi ci obblighi la presenza della marcia, o della sanie; e che son dannosi alle medesime gli oleosi, e l'azione dell'aria. Sarebbe inutile l'esporre in questo luogo piani più estesi intorno a un soggetto, che appartiene alla sola Chirurgia.

LA PAROTIDE.

Così addimandasi il tumore, o lo stivamento delle glandule dello stesso nome. Possiamo riconoscere tre sorte di *parotidi* 1. Quella, ch'è un sintoma delle ma-
lat-

tattie acute , e singolarmente delle febbri maligne , e pestilenziali . 2. Quella , ch' è il prodotto d' un mal cronico , come sono le scrofolose , le galliche , le cancerose , ec. 3. Quelle , che non appartengono nè all' une , nè a gli altri , e che dipendono da una cagione più leggiera , e passeggera , come i *gattoni* , male così familiare nei fanciulli , e nei giovani , e che non solo investe le glandule parotidi , ma eziandio le massillari . Le parotidi della prima specie sono d' ordinario flemmonose , e tendenti alla suppurazione : spesso le medesime son critiche , e annunziate dal viso rosso , e infiammato , dalla gravezza di testa , e dalla sordità : esse son da temersi , quando non suppurano , o che tornano indietro . Quelle della seconda specie , o le croniche , il più delle volte partecipano dell' edema , e dello scirro : tutto che non sieno gran fatto pericolose , sono ostinatissime , per esser in estremo difficile il farle suppurare . Quelle della terza specie , per lo più passeggerie , sono semplici stivamenti , o flussioni , che non portan pericolo , e terminano per la maggior parte collo scioglimento , ed i rado colla suppurazione ; non sono accompagnate da altro reo sintoma : si chiamano talvolta angine sparie , perchè il tumore , benchè tutto al di fuori , non lascia d' inceppare la deglutizione : i *gattoni* son meno comuni a Parigi , che nelle Provincie meridionali .

Si medicano in generale le parotidi , come i bubboni , ma suppurano più difficilmente . Non si dee tentare la risoluzione delle maligne , ma per lo contrario si dee favorirne l' eruzione , e praticare i mezzi più spediti per farle suppurare ; vi si applica il *bisturi* , o il caustico , quando la suppurazione è troppo lenta , e si ha tutta la cura di conservarla fino a che sieno affatto sciolte tutte le durezza della glandula . I risolventi per lo contrario convengono alle parotidi croniche ; e dobbiamo procurar d' ammolire il tumore , e farlo suppurare , o coll' applicazione d' adeguati topici , o con quella dei caustici , dopo che son riusciti inutili i risolventi ; ma la principal cura di questa sorta di parotidi dee consistere nei rimedj interni , che convengono al mal francese , alle scrofole , e ad ogn' altro morbo principale , da cui dipende : quanto alle cancerose , si medicano queste come gli altri tumori di tal carattere . La dieta , e talvolta la cavata di sangue , bastano d' ordinario a di-

le-

leguar le parotidi della terza specie , o sieno i *gattoni* : se questi tendono alla suppurazione , ella si agevolerà con li mezzi noti , e s'evacuerà la marcia senza il menomo indugio ; avvegnachè sia sempre pericoloso il lasciarvela covare . /

IL GOZZO .

Se gli dà anche l'impropria denominazione di *broncocale* : è questo un tumore infaccato , mobile , e indolente , situato nella parte anteriore del collo : rinchiuso , come gli altri di questa natura , ora carni fungose , ora una materia , che s'affomiglia al miele , al feggo , e al pan bollito : vi si trovano eziandio dei corpi cartilagineosi , ossei , pietrosi , ec. La sua forma è d'ordinario regolare : si distende ugualmente da ambi i lati ; il suo volume s'accosta alla grossezza d'un popone ; ma se ne danno de' più grossi , e anche dei mostruosi , che arrivano fino al bellico . Gli abitanti delle Alpi vi sono sommamente soggetti ; è anche endemico in alcuni altri paesi , ove la gente è talmente avvezza a questo incomodo , che non pensa tampoco a liberarsene : si pretende , che nel Tirolo passi per bellezza . Un tal tumore d'ordinario non è pericoloso ; poichè è cosa rarissima , ch'egli venga a suppurazione , e che divenga canceroso , quando si lascia stare ; nulladimeno il suo peso comprime talvolta la trachea-arteria , e l'esofago , e per conseguenza inceppa il respiro , e la deglutizione . I tumori scrofolosi , o d'altra natura , che hanno la loro sede nella glandula tiroide , che per lo più caricano le cartilagini della trachea-arteria , somigliano talora il gozzo ; ma non è difficile il distinguergli . Si formano anche sotto il mento , e nelle vicinanze della laringe dei tumori scirrofi , che si possono parimente prendere pel *broconcele* ; tuttavia la loro durezza , e la loro disuguaglianza ne costituiscono bastantemente la differenza . Si vedono inoltre dei tumori infaccati , talora d'un grandissimo volume aderenti alla nuca : sono essi dell'indole di quella specie di lupa , che cresce sulla testa , e che addimandasi *talpa* : osserveremo rispetto a quest'ultima , che produce quasi sempre la carie del cranio . Importa anche assaissimo l'osservare , che sonosi veduti nella testa tumori affomigliantisi a capelli alle lupe , e che tuttavia erano d'una natura differente ; poichè eran pieni della sostanza del cervello col

col quale comunicano: sonofene incontrati negli adulti, ma son più familiari ai fanciulli.

La cura del broncocele non è diversa da quella delle altre lupe: sonof amministrati internamente, dopo i rimedj generali, i diuretici, i diaforetici, gli aperienti, e gli squaglianti; ma non hanno per lo più avuto riuscita: la spugna marina, e quella di rovo calcinate, passano per specificj; ma ci vuol molto, perchè ciò venga confermato dall'esperienza. I topici risolventi da noi proposti altrove, posson far qualche bene nel gozzo nascente; ma non producono il menomo effetto, quando questo ha fatto qualche progresso: allora si può investire con dei corrosivi atti a distruggere il cisto; ma questo mezzo non è gran fatto praticabile, quando il tumore s'estende affai: l'esperienza ci ha altronde insegnato esser difficilissimo l'impedire, che la piaga, che ne risulta, non divenga fistolosa. L'estirpazione, quando la base è stretta, sarebbe il ripiego più sicuro, e più spedito di tutti gli altri; ma vi è anche molto pericolo nell'appigliarsi a questo partito, a motivo della vicinanza dei nervi, e dei vasi. In somma risulta dal detto finora, che è cosa più prudente il non porvi mano.

ROSSOR DI VISO.

S'intende quel rossore abituale del viso accompagnato da boll., e da pustole infiammate, o esulcerate, e talora da scaglie, con molto calore, ed anche con dolori lancinativi; e di coloro, che sono in questo stato, si dice, che hanno il *viso vitriolico*. Le divise pustole son talora in sì gran numero, e sì risaltanti, che il volto divien deformato, e orribile: allora vi si vegliono dei vasi stivati, e varicosi, dai quali trapela perfino il sangue: il naso ne è il più intaccato, e bernoccolato, e talvolta d'una mostruosa grossezza. Questo morbo investe di rado coloro, che non fanno uso del vino, e dei liquori; ma vi sono estremamente soggetti i grandi bevitori: quando è recente, se ne possono troncargli avanzamenti, e guarirlo: ma se ciò non riesce, è segno che dipende da un principio celtico, o scorbutico, che si trascura d'investire: tuttavia per qualunque cagione, che riconosca, se è invecchiato, o se incontrasi con un'età avanzata, fa testa a tutti i rimedj: allora ci dobbiamo stare alla cura palliativa, e se la cosa fosse possibile, si correrebbe an-

che qualche pericolo a guarirlo , avendoci fatto conoscere l'esperienza, e l'osservazione anatomica, che dopo una tal guarigione ne seguiva la febbre, e lo stivamento d'alcuna viscera, massime se quella non era stata disposta da una lunga cura.

Questa si raggiunge non meno sopra le cavate del sangue, e sopra i purganti miti replicati, che sopra gli allentanti, e i temperanti, i depuranti, e gli aperienti: tali sono i cicoracei, l'acetosa, la borraia, la pimpinella, la scolopendra, le capiliari, il somosterno, la pazienza, gli iparagi, e la garancia; il nitro, i marziali, e il cremor di tartaro; i centogambe, e i granchj: il latte, il siero, le emulsioni, ec. I rimedj cavati dalla vipera sono in questo luogo efficacissimi depuranti: si può credere lo stesso degli antimoniali, come del cinabro d'antimonio, dell'antiettico del Poterrio, ec. ma non debbonsi adoprare questi ultimi, che posson farsi incendiarj, se non dopo d'aver fatto lungo uso dei temperanti. Le istesse precauzioni debbonsi praticare per le preparazioni mercuriali: tali sono l'*aquila alba*, l'etiope minerale, che sono stati talora amministrati con riuscita: anche gli assorbenti in alcuni casi sono acconcissimi: finalmente per questo morbo, come per tutti i cronici si è avuto ricorso alle acque minerali sì fredde, che calde, la cui scelta dee essere regolata dalle circostanze, e una tal pratica viene giustificata dai felici eventi.

Quantunque non ci dobbiamo prometter molto dai topici, tuttavia non si lascia di praticargli: gli addolcenti, e i rinfrescanti; i risolventi, e i disseccanti sono messi più in opera, come l'acqua di uova di granocchio, di nenutar, e di fiori di sambuco; le mucilagini, la crema di latte, gli olj di mandorla dolce, di semi freddi, e di semi di papavero; il cerotto di spermaceti, il sugo di cedro; il litargirio, la cerussa, l'allume, la canfora, lo zolfo: il mercurio, il sale, e l'olio di tartaro, lo zucchero di Saturno, il latte virginale, ec. dei quali preparansi delle lavande, dei linimenti, o delle pomate. Non si può per altro por mano ai topici, se non dopo un lungo uso delle medicine interne; ma non è lo stesso dei bagni, dei vescicanti, dei setoni, dei cauterj, e delle mignatte applicate dietro le orecchie, alle narici, ec. che son proprij in ogni tempo, senza escludere gli altri soccorsi: sonosi veduti soprattutto, e con molta costanza ottimi effetti
dai

dai cauterj aperti nelle gambe. Finalmente importa sapere, che questo morbo apparentemente domato, non manca di ricomparire in iscena in un'altra stagione, e che per conseguenza bisogna impedirne il ritorno, non solo coll'uso prudente dei rimedj da noi proposti, ma eziandio col più esatto governo.

Il viso è anche soggetto a tubercoli duri, e solitari, che divengon bianchi nella loro punta: son noti sotto il termine *vari*: i più focosi giovani d'ambi i sessi vi vanno soggetti più degli altri: si guariscono a stento per esser conservati per lo più da un vizio interno, il più delle volte celtico, e degenerante anche talvolta in una specie di lebbra. Si usa esternamente il latte verginale, lo zucchero di Saturno, la canfora ec. I rimedj interni adattati al rossore ec. si posson praticar contro i *vari*, trovandosi fra questi morbi grande affinità.

MALATTIE DEGLI OCCHI.

La loro istoria non è scritta con quella chiarezza, che dovremmo prometterci da quei tali, che non si sono occupati in altro per tutta la vita loro: ma quando non s'ignora la struttura di questi organi, e che si ha un'idea generale degli sconcerti, che scompongono l'economia animale, si può rilevare il vero carattere di questi mali, senza molto esser solleciti delle arbitrarie denominazioni, che sono state ai medesimi assegnate. Non parlerò di quelle, che più usualmente s'incontrano, e mi servirò meno che mi sarà possibile di quella strava, e sciocca nomenclatura, della quale hanno voluto adornare gli autori gli scritti loro.

L'*incollamento delle palpebre*, che prova si la mattina nella lippitudine, l'*oftalmia* leggiera, ec. è un picciolo incomodo, al quale ognuno sa rimediare; ma quello, che è la conseguenza del vajuolo, delle gravi *oftalmie*, della scottatura, delle ulceri della congiuntiva, ec. è perpetuamente pericoloso, poichè le palpebre s'attacano sovente al globo dell'occhio, lo che, dopo i rimedj generali, richiede l'applicazione dei migliori rilascianti, e la mano d'un saggio, e sperimentato Chirurgo.

Si rimedia alla paralisi della palpebra superiore, o al suo rilasciamento con topici fortificanti, come coll'essenza di garofani, e di cannella, collo spirito di vino canforato, coll'acqua della Regina, coll'acqua di calcina, ec. Il vapore del vino aromatico, e della

doccia delle acque termali son pure assai proficui rimedj : si è anche talvolta fatta una piaga nella pelle colla mira d'accorciarla con la cicatrice. Quanto ai rimedj interni , ce ne stiamo ai replicati purganti , ai diuretici , e ai sudorifici : innanzi a tutti questi debbonsi riputare i brodi di vipera , ed il decotto dei legni , dei quali si è fatto più frequente uso , e dai quali pare , che sienosene ritratti effetti migliori.

Il *rovesciamento delle palpebre* è una deformità , che si dee riferire allo stivamento della congiuntiva , che si ripiega sotto le palpebre , oppure a qualche cicatrice , che abbia accorciato la pelle , come appunto accade talora dopo la scottatura , il carbonchio , o le ferite di queste parti. Non si può rimediare , se non allo stivamento : questo s'investe con disseccanti , e con corrosivi , come , colla tuzia , colla pietra ematite , coll'alume calcinato , e col vetriolo bianco , colla pietra da cauterio , e coll'infernale. Questi ultimi si debbono applicar con prudenza , per non ingenerare l'infiammazione : ci possiamo anche servire delle cesoje per tagliare ciò , ch'è superfluo : ma questa è operazione da sperimentatissimo Cerusico.

Le palpebre son soggette a *tubercoli indolenti* , o a piccioli tumori i *saccati* , che sono più fastidiosi , che pericolosi : i lividi , e i violacei addimandansi *more* : gli *orzajoli* hanno la forma d'un granello d'orzo : la *gragnuola* è così detto dalla sua figura , e dal suo colore bianco : la *renella* dicesi così dalla sua durezza : l'*Idazide* si distingue bastantemente dagli altri per la sua trasparenza ; ma non si dee confondere con la vescica , e con i flitteni , che frequentemente si alzano sopra le medesime parti. I *discussivi* , e i *risolventi* , sono i topici più atti a dileguar queste pustole ; ma d'ordinario è infruttuosa la loro applicazione : si bagnano colla saliva a digiuno ; si fomentano coll'acquavite , coll'acqua vulneraria , col balsamo dei *Fioruvanti* , ec. Vi si applica un granello d'uva secca , della polpa di mela cotta , un picciolo impiastro di gomma ammoniac , sciolta nell'aceto , il diabolano , l'impiaastro di meliloto , quello dell'Abate di Grazia , ec. Si possono distruggere col caustico ; ma non è facile il difenderne le parti vicine : ci dà meno da temere la pietra infernale , colla quale si tocca soltanto la parte. Non è senza pericolo l'estirpazione col ferro , e si eseguisce di rado : si

investono più sicuramente colla legatura , quando ce lo permette la sua base stretta . Questi tubercoli , tuttochè senza dolore , talvolta s' infiammano , e suppurano ; ma se il cisto non è consummato , si riempiono di bel nuovo . Nascono altresì dalle palpebre porri niente differenti da quelli delle altre parti , e che si medicano nella stessa guisa .

Il *sarcoma* non solamente nasce dalla congiuntiva , che veste le palpebre , ma eziandio da quello , che cuopre il globo : occupa l'angolo maggiore sotto nome d' *unguis* , uigna , e talora si stende fino sulla cornea : questa escrescenza ha d'ordinario poco rilievo : ella è con frequenza varicosa , e talvolta diviene anche cancerosa , e perciò di malagevolissima guarigione . Le cavate di sangue , e i purganti ; i temperanti , e i rinfrescanti , che non si lascia di porre in opera , vi danno poco ajuto : sul principio si può ritrarre del vantaggio dai risolventi , come dall'orina calda , dall'acqua di fior di sambuco , dal siele di manzo , e d'altri animali ; ma quando l'escrescenza si è avanzata alquanto , non abbiamo alcuna speranza , salvochè nei disseccanti , e negli scarotici : tali sono lo zucchero eandito , la polvere d'iride , l'allume calcinato , il verderame , la pietra divina del *Crollio* , l'infernale , ec. L'estirpazione finalmente è il più sicuro mezzo di tutti gli altri , e il più praticato : così appunto se ne liberano i cani , che sono soggetti a questo male .

La lippitudine è un' oftalmia spuria , che ha la sua sede nelle palpebre , dall'orlo delle quali trasuda un umor glutinoso , che le attacca : questa materia d'ordinario è purulenta , e perciò dinota l'esculcerazione della congiuntiva . La lippitudine può trovarsi con tutti i mali degli occhi ; ma s'unisce principalmente coll' oftalmia , colla quale ella ha per altro molta relazione : ella è , come questa seconda , secca , o umida : la prima non produce che una farina scagliosa , la quale , spandendosi sopra il globo , si rende fastidiosissima : questa affezione , che s'avvicina molto alla rogna , o alle volatiche , è accompagnata da pizzicore , ed anche da bruciore : in questo stato il contorno delle palpebre col tempo diviene scirroso , e anche calloso : la seconda , o sia l'umida , è tale a motivo della materia purulenta più o meno copiosa , della quale trovansi inzuppate le palpebre . L'una e l'altra lippitudine , ma

angolarmente l'umida, alterano sovente la superficie del globo, e possono anche dar motivo alla fistola lagrimale: formano queste colla lunghezza del tempo uno sfivamento, o una specie di cercine nel contorno della palpebra, che la rovescia, e produce lo sciarpellamento, di cui parlammo. Il tempo sana per lo più la lipitudine dei fanciulli; ma è ostinata in un'età più provetta, e sovente incurabile, massime se dipende da un principio scrofoloso. La cura di questo male è poco diversa da quella dell'oftalmia, poichè sì nell'una, che nell'altra abbiamo a un dipresso le mire stesse; peraltro non vi è sempre necessaria la cavata del sangue; ma si fa grand'uso degli addolcenti, e dei temperanti: non è mai infruttuoso quello dei Purganti, e soprattutto delle acque minerali dotate di tale proprietà. Si veggiono anche dei buoni effetti dai sudorifici. I topici, che vi s'impiegano, si raggirano intorno agli emollienti, e i risolventi: tali sono i vapori dell'acqua calda, le lozioni colla malva, l'acqua di finocchio, e d'eufasia, il vino, il butiro, le pomate, e i cerotti; i garofani, la canfora, e lo zolfo. I disseccanti, e i detergenti, come le rose rosse, lo zucchero candito, la tuzia, e il vetriolo bianco, spesso vi sono estremamente necessari: finalmente sonosi talvolta serviti della pietra infernale per distruggere il cercine scirroso, che orla con frequenza le palpebre, e lo rovescia. Si sa, che i vescicanti, il setone, e il cauterio non sono meno proficui in questo luogo, che nell'oftalmia, e negli altri mali degli occhi.

Il lagrimento (*epiphora*) è prodotto, o dalle lagrime troppo copiose, o da tutto ciò, che ne tronca il corso verso i punti lagrimali, ed il sacco nasale: questa materia è talvolta sì acre, che scortica la cute delle guance, sopra la quale si spande. Bisogna conoscere bene la struttura di quelle parti, per giudicare con qualche fondamento delle varietà offerteci da questo male: quando la materia delle lagrime s'unisce nel sacco lagrimale, ove forma una specie d'idropista, e che scorre per rigorgo, ovvero dalla compressione dei punti lagrimali, non si stenta a giudicare che l'ostacolo trovassi sotto una parte del sacco lagrimale; ma se la pressione non ispreme cosa alcuna, e non comparisce alcuna tumefazione, non vi è dubbio, che il vizio, talvolta apparente, non si trovi nei punti lagrimali; se si-

nal-

nalmente si fanno molti mocchi, malgrado il lagrimationo, dobbiamo porci a riflettere sopra l'organo della secrezione. L'oftalmia, la lippitudine, e tutti gli irritamenti esterni, possono produrre il lagrimationo: difficile a curarsi è l'abituale, e talvolta degenera in fistola lagrimale. Allorchè vi è un vizio nella strada, che conduce la materia delle lagrime verso le narici, non vi si rimedia, se non coll'operazione della mano, che si fa succedere ai rimedj generali nell'idropisia del sacco nasale, la sola pressione spesso replicata, o una compressione continua per mezzo d'una fascia adattata, possono tener lontana la fistola, e far dileguare il tumore; ma non liberano dal lagrimationo: negli altri casi i purganti, i diuretici, e i sudorifici sono i rimedj più usati: le acque minerali, la scelta delle quali viene indicata dalle circostanze, sono di pari utilissime. Si usano anche esternamente gli astringenti, e i disseccanti, come la pietra calaminare, il vetriolo, ec. ma poco fondamento possiamo fare sopra tali rimedj: non è lo stesso dei vescicanti, del setone, e del cauterio, dai quali possiamo prometterci ottimi effetti: le tente del Signor Anel, e le iniezioni per i punti lagrimali, in alcuni casi sono utilissime; ma pochi sono i Cerusici, che se ne sappiano servire. Alcuni osservatori hanno parlato delle lagrime sanguigne, e delle lagrime impietrite; ma questi casi sono così rari, che non rileva il fermarvi sopra.

La fistola lagrimale, che pure appartiene alle malattie esterne dell'occhio, è annunziata da un tumore flemmonoso dell'angolo maggiore, che formando abscesso, dà luogo alla fistola: questa il più delle volte non si manifesta, che per lo scolo della marcia per i punti lagrimali, senza che la pelle sia esulcerata, e questa circostanza gli fa dar la denominazione di fistola *orba*. Molti confondono male a proposito l'idropisia del sacco lagrimale formante un tumore verso l'angolo maggiore, colla fistola lagrimale, o coll'abscesso, che la precede: è vero, che l'acrimonia delle lagrime ritenute può produrla; ma ciò non fa, che questi due morbi non sieno distinti: altri, anche con minor fondamento hanno preso per fistola lagrimale un tumore flemmonoso, situato fra il sacco lagrimale, che non ne è intaccato, e la cute, che n'è sempre infiammata: è altresì vero, che la marcia, che vi si lascia covare,

può alterare il sacco , e far prendere al tumore il carattere del morbo , di cui parliamo : la pressione può aiutarci a distinguere questi due casi : questa caccia la marcia , e la materia delle lagrime per i punti lagrimali , quando il sacco è la sede dell' abscesso : ma i punti lagrimali restano a secco , malgrado la pressione , quando la marcia ha un' altra fucina . Lo scolo della marcia , e della materia delle lagrime per i punti lagrimali , non lascia alcun dubbio intorno alla natura della malattia : se la materia , che n' esce , è saniosa , e fetente , verdastra , o nericcia , è una prova , che le ossa son cariate , lo che accade coll' andar del tempo ; ma la sanie , che scola talvolta per le narici , e che rende la fistola meno fastidiosa , ne somministra una prova più completa . La fistola lagrimale riconosce con frequenza un vizio celtico , scrofoloso , scorbutico , ec. Ella si è anche il prodotto del vajuolo , dello stivamento degli occhi , dell' oftalmia , ec. finalmente in tutti i casi può la medesima farsi cancerosa . Dopo aver tentato la *risoluzione* della pustula infiammata , si dee favorire la suppurazione , applicandovi gli emollienti , e i digestivi : essendo formato l' abscesso , bisogna aprirlo prontamente colla lancetta , o col caustico , e fare delle iniezioni per questa apertura , che poi si cura col metodo ordinario ; ma quando vi è carie , come segue per lo più , bisogna ricorrere all' *operazione* , di cui è stato ampiissimamente trattato , non meno nelle Memorie dell' Accademia delle Scienze , e di quella Chirurgia , che nei Libri ordinarij . Comunemente , prima di ricorrere a questo mezzo , si tenta la compressione , e le iniezioni , le quali possono sbarazzare , e sturare il condotto nasale ; ma è cosa rarissima il potervi riuscire . Le cavate del sangue , i purganti , i temperanti , e gli addolcenti , sono gli ordinarij preparativi . E' inutile il ripetere in questo luogo , che si dee investire la malattia principale , qualora ne esista alcuna , che abbia dato motivo alla fistola , o che la conservi .

La più comune di tutte le malattie degli occhi si è l' oftalmia . Non si debbono denominar così quei rossori , e brugiori passeggeri , che nascono dal fumo , dalla polvere , ec. ma bensì dall' infiammazione della congiuntiva , accompagnata da un dolore più , o meno intenso , da ardore , e da timore di veder la luce : questa si comunica con frequenza all' interno dell' organo ,

lo che si conosce dai dolori più vivi, e più profondi: allora i pazienti patiscono più a soffrir la luce; veggono ronzare delle mosche, ed altre ombre: provano lancinamenti nel fondo del globo, vigiliie, ec. E' noto, che l'oftalmia è *secca*, o *umida*: nella prima non vi è nè lagrimazione, nè scolo purulento: i dolori son molto leggieri, e le palpebre non vengono gran fatto investite dall' infiammazione: nella seconda l'occhio è sempre bagnato dalla materia delle lagrime, il più delle volte acre, e purulenta, e talora così scottante, che scortica la cute delle guance, che riceve ciò, che esce dall'occhio: l' infiammazione si comunica alle palpebre: s' alzano delle pustule sopra le parti infiammate; vi si formano degli abscessi, delle ulcerette, perfino sopra la cornea, e i dolori sono spesso profondi con lancinamento: i più soggetti a questo morbo sono i fanciulli, e i vecchi. L' oftalmia è talvolta *epidemica*; ma si è preteso con poco fondamento, che sia contagiosa. Le flussioni, le resipole alla faccia, il vajuolo, la febbre maligna, le contusioni, la scottatura, le sozzure, ch' entrano nell'occhio, vi danno occasione; ed è con frequenza il sintoma delle scrofole, della gotta, ec. Dobbiamo farci molta paura dell' oftalmia, quando la congiuntiva è renduta così grossa dallo stivamento, e sì elevata sopra la superficie del globo, che sembra, che la cornea trovisi affondata; quando provansi dolori intensi, e profondi, che corrispondono a tutta la testa; finalmente, quando la febbre, la vigilia, ed altri gravi sintomi vi si producono. L' oftalmia *scrofolosa*, la *celtica*, e la *gottosa*, fanno testa a tutti i rimedj, qualora si trascuri d' investire l' infermità principale: la resipelacea è lunga, e ostinata: quella, che nasce dalle contusioni, o dalla scottatura, è sommamente rea; ma la più da temere si è quella, ch' è una impressione lasciata dal vajuolo. Tutte queste gravi oftalmie danno sovente motivo a delle ulcere nella congiuntiva ostinatissime, alla fistola lagrimale, ad abscessi, non meno dietro alla cornea, che nella sua grossezza, che tolgono la vista: fatti con frequenza un' inondazione purulenta fra l'iride, e la cornea, che addimandasi *hypopion*: è stato osservato, sebben di rado, come la *marcia*, la quale occupava ciò, che si chiama la *camera anteriore*, si precipitava nel fondo del globo, e che allora vedevasi a poco a poco diminuire. Le ulcere della

La cornea vi lasciano per lo più una *macchia*, o una *cicatrice*, che non si dilegua per quanto venga tentato: risulta talora anche dagli sconcerti divisati, che la cornea non essendo più atta a contenere le varie sostanze, che riempiono il globo, ne vien forzata e spinta al di fuori: questa specie d'ernia dell'occhio è nota sotto il termine di *Stafiloma*, e la sua cura appartiene totalmente alla Chirurgia. La gran profluenza delle lagrime, e lo scioglimento del ventre, con frequenza hanno giovato all'oftalmia: si è anche osservato, che quella, la quale sopravveniva a una caduta, o a una percossa di testa, tuttochè gli occhj ne fossero andati essenti, era d'ordinario un segno mortale.

La cura dell'oftalmia è poco diversa da quella delle altre infiammazioni: vi vogliono di necessità mera le cavate di sangue; e pajono più convenienti dal piede, e dalla gola: il numero di queste dee essere regolato dal grado della flogosi, e dalla violenza dei dolori: nelle oftalmie gravi, si aprono talvolta i vasi apparenti del globo, o colla lancetta, o con un ago tagliente; e si promuove lo scolo del sangue con fomite coll'acqua calda: si possono ricavare gli stessi vantaggi dalle *scarificazioni* sopra la parte infiammata, sì del globo, che delle palpebre: ma tutti i Cerusici non son atti ad intraprendere siffatte operazioni, e pochi sono i pazienti, che vi si vogliano sottomettere: si applicano eziandio le mignatte alle palpebre, e ai luoghi vicini per evacuar potentemente tutte queste parti: è stata anche in alcuni casi praticata l'*arteriotomia*, e se ne sono veduti ottimi effetti. Importa molto in questa infermità il tenere il ventre obbedientissimo, servendosi dei mezzi usati: con tale idea ci siamo serviti utilmente bene spess delle *acque minerali catartiche*. In questo caso si dee fare un grand' uso dei *temperanti*, e degli *addolcenti*, come dei cicoracei, della borrana, e della pazienza, i brodi di pollastra, di granchj, e di tartaruga; il latte, ed il siero; le emulsioni, le acque minerali acidule ec. I *depuranti*, non meno *antiscorbutici*, che *suaorifici*, come il crescione, e la coclearia; la cina, il guajaco; il minerale diaforetico, ed altre preparazioni antimoniali; i brodi di vipera, odi serpe ec. sono rimedj, da' quali se ne sono sperimentati buoni effetti: si è anche fatto buon uso degli *aperienti*, e degli *squaglianti*, come dei centogambe, dei marziali, del-

delle preparazioni mercuriali ec. Finalmente i *calmanti* sono alcuna volta indispensabili; ma bisogna perpetuamente servirsene con riserva.

E' nota a ognuno l'efficacia dei *bagni* contro l'oftalmia; ma non vi è cosa meno chiara dell'effetto dei *topici*, che si applicano agli occhi: fanno benissimo i Pratici istrutti, come intorno a ciò si attribuisce molto più al pregiudizio, che all'osservazione: siccome questo non è il luogo da ventilare questa faccenda, mi basterà il proporre quelli, che sono adottati dalla maggior parte, e le proprietà dei quali sembrano più comprovate.

La *chiara d'uovo coll'allume*, e gli altri *repercussivi*, s'adattano agli stivamenti recenti, massime quando la contusione gli ha cagionati; ma negli altri casi posson fare grandissimo male, e ce ne dobbiamo assolutamente astenere: si fa grand'uso degli *emollienti*, e degli *addolcenti*, non meno per temperare il calore di queste parti, e per calmare i loro irritamenti, che per iscolare le palpebre: tali sono l'acqua tepida, alla quale s'aggiungono alquante gocciolate d'acquavite, l'acqua di malva, di rose, e di piantaggine; il sangue di piccione, o di pollastro, il latte di donna, o qualsivoglia altro; l'emulsione, la mucilaggine di grani di pùllio, di cotogno, e di lino: il cataplasma di melle cotte, o la midolla di pane; una fetta di carne di bue, o di vitello, ec. Si servono ancora assai dei *risolventi*, come dell'acquavite temperata; dell'acqua di finocchio, e d'eufrasia, di quella di fiori di sambuco; del vino caldo rattivato con alcuna gocciolata di balsamo del Commendatore, e d'altri colliri fatti collo zafferano, colla ruta, colla salvia, coll'issopo, e col rosmarino; delle acque di Balaruc, di Baresges, ec. Si praticano finalmente i *detergenti*, e di *disseccanti*, singolarmente per le ulceri; tali sono lo zucchero candido, l'iride di Firenze, l'osso di seppia, la tuzia, il vetriolo bianco, la pietra divina, i troisci bianchi di rhasis, il vino emetico, ec. Si posson toccare le ulceri delle palpebre colla *pietra infernale*, il cui ardore si diminuisce col bagnar l'occhio più volte: dopo questa operazione, i flitteni, o le pustole vefsicolari della congiuntiva, e della cornea richieggono dei *risolventi*, come i fiori di sambuco, e di camomilla, il seme di sien greco, ed altri di questa natura; ma è talora ne-
cess-

cessario l'aprire queste vesciche, e poi far uso dei *collyrij detergenti*. E' molto più pressante l'apertura degli ascessi, o trovisi la marcia racchiusa nella sua fucina, o trovisi sparsa nella camera anteriore; poichè sì nell'uno, che nell'altro caso è sommamente pericoloso per la vista il lasciarla stanziare colla mal fondata speranza, di risolverla: si evacuerà altresì il sangue, che vi è talvolta stravasato dopo le contusioni e tuttavia, quando questo è in picciola quantità, si può dileguare col semplice uso dei risolventi: ognun sa finalmente, che nelle più ostinate oftalmie si posson ritrarre vantaggi grandissimi dalle coppette a taglio, dai vescicanti, dai setoni, e dai cauterj. Rispetto all'immondezze, che s'insinuano negli occhi, e che possono eccitarvi l'infiammazione, e degli acutissimi dolori, se la materia delle lagrime, che allora grondano in copia, non le porta via, forz'è tuffar l'occhio nell'acqua, e muover molto le palpebre: l'ambra gialla, o la cera lacca, riscaldate con istropicciarle, possono portarle via: se fosse qualche particella di ferro, la calamità la porterà subito fuori: finalmente se questi ripieghi vanno falliti, bisogna ricorrere alle mollette, e ad altri espedienti Chirurgici.

Il bianco dell'occhio divien talvolta rossissimo, senza che il paziente provi alcun dolore, e senza che abbia la menoma repugnanza a veder la luce chiarissima. Questa *echimosi* sommamente apparente, e comunissima, nasce sovente da una leggiera contusione, che si fa, anche malgrado dei pazienti, quando essi dormono, o in qualunque altro tempo, ma talora ha origine da cagione interna: si è anche osservata alcuna volta dopo gli sforzi del vomito. Questa non è gran fatto da temere, e si dilegua d'ordinario in pochissimi giorni, anche senza alcun rimedio: nulladimeno è talvolta necessario il far cavar sangue al paziente, e servirsi d'alcuni topici della classe dei *risolventi*, e dei *fortificanti*: tali sono il sangue di piccione, l'acqua rosa, l'acqua di finocchio, e di fior di sambuco, l'acqua vulneraria, il decotto di radice di consolida maggiore, del sigillo di Salomone, lo spirito di vino canforato l'acquavite, ec.

Le *tacche*, che oscurano la cornea (*nubecule*) sono la conseguenza delle flussioni, o delle oftalmie, e delle ulceri di questa parte. Nel primo caso, ell'è una spe-

specie di deposizione d'una materia bianchiccia, la cui natura è ignota: nel secondo ell' è una *cicatrice*, che ha indurito, e disseccato questa parte. Le più bianche sono per lo più superficiali, e per conseguente meno ostinate. Si può sperare di dileguare quelle dei bambini; ma è cosa sommamente rara, che vi si riesca in una età avanzata: le vere cicatrici sono assolutamente incurabili.

Le *cavate del sangue*, i *purganti*, i *temperanti*, e i *bagni*, sono adattatissimi a divertire le flussioni, che talvolta accompagnano queste macchie; ma non ne cangiano la disposizione: non vi si può rimediare, se non per mezzo di topici emollienti, risolventi, disseccanti, e detergenti, le cui circostanze regolano la scelta: tali sono il vapore del caffè, quello della ruta, e del finocchio masticati a digiuno; l'acqua di finocchio, e d'eufrasia, il sugo della calcitrapa, ec. il fiele d'anguilla, di carpione, di luccio, e di pernice; lo zucchero candito, l'osso di seppia, la tuzia, la polvere d'antimonio, ed altri tali: si fa anche uso in questo caso dei vescicanti, del setone, e del cauterio; ma non se ne ritrae altro vantaggio, salvo quello di tener lontane le flussioni, alle quali danno sovente motivo le tacche, e le cicatrici.

La *cataratta* non essendo altro, che l'opacità del cristallino, quei, che hanno la più leggiera tintura dell'anatomia dell'occhio, non istenteranno, quando è formata, a conoscerla; ma il suo principio è più facile a rilevarsi: ella è sovente la conseguenza delle flussioni abituali, delle oftalmie gravi, del lagrimamento, della cefalgia di vecchia data, delle contusioni, ec. Si dee temerla, allorchè la vista è intorbidata, e disturbata da ombre fisse, o muoventisi, che si assomigliano a fiocchi di neve, a mosche, ec. quando gli oggetti compariscono coperti d'un vapore, e d'una tela di ragno: alcuni mesi dopo, che i pazienti si lagnano, che comincia a mancar loro la vista, si può distinguere qualche albugine nel cristallino. Una buona cura può allora troncargli il corso alla cataratta, che sta d'ordinario più anni a formarsi: l'uso degli *allentanti*, o dei *temperanti*, e quello dei bagni, dopo i rimedj generali, sono il fondamento principale d'essa cura: fannovisi anche entrare gli *aperienti*, e singolarmente i centogambe nel vino bianco: il decotto dei
le.

legni, ed alcuni altri *sudorifici* hanno mostrato di produrre talvolta dei buoni effetti, di pari che i *salivanti*, come il tabacco in fumo, e simiglianti. Si vanta molto l'uso sì interno, che esterno dell' *eufrasia*: egli è malagevolissimo il decidere, se ciò sia a ragione; ma non vi è rimedio migliore dei vescicanti, dei setoni, e del cauterio. Si può anche trovar qualche ajuto nell' acqua di malva, nel sangue di piccione, nel vapore del caffè, nei decotti aromatici, e in altri topici, tanto *emollienti*, che *risolventi*; ma accade il più delle volte, che non si ricavi alcun frutto da tutta questa medicatura, e che la cataratta malgrado i rimedj faccia perpetuamente degli avanzamenti: allora non rimane altro partito da prendersi, salvo l'aspettare, che sia matura per procedere all' *operazione*: questa riesce benissimo nelle cataratte bianche, o cenerine; ma fanno paura le paonazze, o verdi. Se stroppiciando l'occhio colla sua palpebra, la pupilla resta immobile, si può giudicare, che la cataratta trovisi nella sua maturità: questa è l'impropriissima espressione, della quale sonosi serviti gli Scrittori per dinotare il suo disseccamento, e la sua perfetta opacità. L' *operazione*, quando la cataratta è in questo stato, è il solo mezzo per ricovrar la vista ai pazienti: si pratica in due maniere: 1. coll'abbassare per mezzo d' un ago adattato a tal effetto il cristallino opaco, e col fissarlo, per quanto è possibile, dietro all' iride: 2. col farne l'estrazione per mezzo d' un' apertura fatta nella base della cornea: questa seconda maniera perfezionata da M. *Daviel*, era stata proposta all' Accademia delle Scienze degli anni 1707. e 1708. sembra, che sia la più sicura, e la meno difficile. Tutti gli Autori parlano d' un' altra specie di cataratta, che chiamasi *membranosa*. Le mie osservazioni Anatomiche intorno a questo punto, tuttochè in grandissimo numero, non me l'hanno mai posta sotto gli occhi; nè trovo la menoma cosa, che possa appagare, in tutto quello, ch' è stato scritto sopra di ciò: mi sembra pure, che coloro, che hanno avuto parte alla disputa sollevata intorno a tal soggetto, abbiano più cercato di far pompa delle loro opinioni, che di investigare la verità.

Si dà la barbara denominazione di *gota serena* (*amarosia*) a quella privazione della vista, che comparisce senza vizio apparente nell'organo, a riserva d' esser la

pupilla più dilatata : questo accieciamento segue talora in un subito ; ma per lo più se ne viene in guisa quasi insensibile , e d' ordinario ne sono attaccati tutt' e due gli occhi . Si giudica con molto fondamento , che questa malattia , la quale ha più gradi , dipenda dalla paralisi del nervo ottico : le *osservazioni anatomiche* ci fanno vedere nel cervello vasi stivati , inondazioni serose , e sanguigne ; il disseccamento , e la putrefazione dei nervi ottici , abscessi , che comprimono questi cordoni , tumori linfatici , ed altri infaccati , escrescenze carnose , ec. I forieri di questa infermità sono l' indebolimento della vista , senza manifesta cagione , mosche , fiocchi , filamenti , che par che svolazzino intorno , e talora dolori profondi nel capo , ec. L' evacuazioni sanguigne soppresse , le fioriture cutanee tornate indietro ; la febbre maligna , l' apoplessia , le cadute , e le percosse alla testa ; la luce diretta dal Sole , il freddo , il sereno , e le altre intemperie dell' aria , e talvolta la gravidanza , possono darvi motivo : ella ha l' origine nella contensione degli occhi , o sia fissamento , quale bisogna avere per l' uso dei telescopj , e dei microscopj non solo , ma eziandio per la lettura troppo continuata troppo a lungo , per i lavori sommamente minuti , ec. La *gotta serena* imperfetta , quella che si manifesta in un subito , o che dipende da una cagione passeggera , si possono guarire ; ma abbiamo pochissima speranza , quando si forma insensibilmente , singolarmente in un' età avanzata . Le cavate di sangue , e gli emetici , nel principio , possono avere grande efficacia , di pari che i purganti replicati : l' uso interno dell' eufrasia , pare , che si addica meglio alla gotta serena , che agli altri mali degli occhi : gli aperienti , e gl' incisivi , come i centogambe , i marziali , e le preparazioni mercuriali , sono in questo caso praticate familiarissimamente : le acque minerali , e fredde , e termali , talvolta hanno fatto del bene : si è fatto anche usu degli antiscorbutici , e dei diaforetici , come del crescione , e della coclearia , del guajaco , e della cina , delle vipere , ec. Ma i cefalici , e gli antispasmodici sono sempre sembrati i più atti a questo morbo : tali sono la melissa , la betonica , la valeriana , e la peonia ; la cascariglia , il muschio ; l' acqua di fiori d' arancio , gli spiriti volatili , la polvere di gutteta , ec. I salivanti , i vescicanti , il seto-

ne,

ne, e il cauterio, in questo caso posson far pure molto bene: bisogna aggiungere la docciatura alla testa coll' acqua di Balaruc, e con altre termali, dalle quali sonosi sperimentati sovente de' buoni effetti. Quanto ai topici oftalmici tanto vantati, ardisco di dire, essere presso che inutili: si può per altro eccettuarne il vapore dello spirito di vino, e del balsamo del Fioravanti, il vapor del caffè, ec. che in alcune occasioni, non mi sono sembrati inefficaci.

MALATTIE DEL NASO.

L' infreddatura detta *coryza* è d' ordinario un male: così leggiero, che altri non si cura tampoco di chieder soccorso medico; tuttavia non è inutile, quando la fluxione è considerabile, e che lo scolo pel naso è scarso, il paziente si lagna d' un peso alla testa (*gravedo*) del quale abbiamo fatto menzione, vi si prova talora un vivissimo dolore, si hanno frequenti sternuti, de' tintinni alle orecchie, vertigini, e perfino il soporimento: si perde l' odorato, e l' appetito; si provano dei brevidori, delle stanchezze, ec. La febbre, inseparabile da questo stato, è più o meno gagliarda; ma tutti i sintomi s' indeboliscono grandemente, quando si è fissato lo scolo del naso. Questa fluxione sarebbe poco da temere, se non ci avesse insegnato l' esperienza quotidiana, che cade per lo più sulla gola, nell' esofago, e nel petto: ella è terribile per se stessa nei vecchi, perchè può precipitargli in un' affezione comatossa, ed anche nell' apoplessia. L' infreddatura abituale non è pure senza pericolo, come quella, che può esulcerare il naso. Quando è recente, e leggiera, esige poco più del buon governo; e del caldo, i quali per altro sono i preservativi più sicuri contro le fluxioni della gola, e del petto, dalle quali altresì è minacciato: i profumi di succino, d' incenso, e di zucchero, di salvia, ec. posson dar del sollievo, e render anche più cortese il male: gli sternutatorj più miti, come il tabacco, la bettonica, lo spigo, e la maggiorana, sono talvolta utili, come quelli, che facilitano lo scolo: ma se la natura, che si dee perpetuamente consultare, non vi è disposta, questi medesimi colle loro scosse possono accrescere l' imbarazzo della testa. Contro l' infreddatura abituale si usano non solo i rimedj generali, ma eziandio i temperanti, i diuretici, i sudorifici, i salin-

vanti , ed altri , che s'addicono a tutte le flussioni ; ma quando non si ritrae alcun frutto da questi rimedj , si può ricorrere agli sfoghi artificiali da noi tante volte proposti .

Lo sternutamento moderato annunzia talora l'infredatura : nelle febbri anzichè esser dannoso , passa per un buon segno , tuttochè possa risvegliare l'emorragia : questo è altresì vantaggioso alle donne in atto di partorire ; ma può nuocere al petto , se è infiammato . Lo sternutamento eccessivo dee considerarsi e curarsi , come un male convulsivo : può cagionare delle commozioni , che danno occasione ai più gravi mali di testa : si è perfino osservato , essere stato seguito dall'accieciamento : in tal caso bisogna procurar di calmare l'irritamento , tirando su pel naso degli addolcenti , e dei mucilaginosi : l'acqua tiepida , il latte , l'olio di mandorle dolci , ec. sono i più adattati per questo effetto , e i più praticati : è rarissimo , che si debba ricorrere ad altri rimedj .

L'emorragia dal naso , ch'è effetto del temperamento , del violento esercizio , dell'abuso d'alimenti , o di rimedj calorosi , ec. di rado è pericolosa . Quella , che sopravviene alle febbri , può esser critica , o sintomatica : è per lo più proficua sul quarto , sul settimo , sul nono , e sul decimoquarto giorno del male : può esserlo anche prima , quando , senz'esser trasmodante , è molto copiosa . Si temono nelle febbri l'emorragie non compiute , nelle quali non gocciolano dal naso . che poche stille di sangue ; tuttavia tanta è la varietà , che scorgesi sopra di ciò , che non si può giudicare con qualche sicurezza delle une , e dell'altre , se non se dal bene , o dal male , che ne risulta . Dobbiamo , a cagion d'esempio , temer tutto , quando lo sgorgo del sangue dal naso è seguito da debolezza , da variazioni nel polso , da sudori freddi , da convulsioni , ec. : giudicheremo per lo contrario , ch'è salutare , se si calma il dolor di capo , e il delirio , se la febbre si modera , ec. Il calore , e il rossore degli occhi , e della faccia , la violenta pulsazione delle arterie , la vigilia , i fantasmi rossi , il dolore del capo , e del collo , il tintinno d'orecchie , le lagrime involontarie , il pizzicore del naso , ec. possono nelle febbri annunziare l'emorragia del naso . Nei fanciulli , e nei giovani non è gran fatto da temere . Nulladimeno , quando torna con frequenza , può risaltarne una costituzione debole , af-

sezioni ipocondriache , e spasmodiche , e si crede altresì , che possa dare occasione in progresso alla gotta , e alla pietra . L'emorragia del naso è più pericolosa , e anche talvolta mortale in un'età avanzata , massime per li cachetici , che precipita sovente nell'idropisia . Se questa emorragia è pericolosa per li vecchi , il suo cessamento , quando è itata abituale , dee sì anche temer di vantaggio , perchè dà sovente motivo all'apoplessia . Fa sbigottire la quantità di sangue , che possono somministrare i vasi del naso , senza che ne seguano accidenti : se n'è veduto perdere più di quaranta libbre nello spazio di cinque giorni ; in dieci giorni oltre ottanta libbre : finalmente si parla d'una donna gravida , che gittò per questa strada ventidue libbre di sangue , e che tuttavia partorì poi felicemente .

Questa emorragia dee esser curata a un di presso , come le altre : nulla dobbiamo fare per quella , ch'è recente , moderata , e senza febbre : richieggono soltanto ajuto l'abituale , e la trasmodante ; ed è anche talvolta pericoloso il fermare l'abituale . L'emorragia dal naso critica è un lavoro della natura , che dee rispettarli ; ma la sintomatica , massime se è eccessiva , vuole tutte le maggiori cure del Medico . Le cavate del sangue , e singolarmente dal piede , in questo caso sono necessarie : in progresso i temperanti , e i rinfrescanti sono i rimedj messi più in opera , e i più efficaci : tali sono l'acqua comune bevuta in copia , la bevanda acidulata , e la nitrata , il brodo di riso , l'emulsioni , il siero , ec. Il liquore anodino minerale è un calmante , che s'addice molto all'emorragie ; ma il laudano , il diacodio , lo sciroppo di Karabè , ed altri narcotici debbon esser amministrati con molta riserva : si debbon far prendere leggermente gli assorbenti , e gli astringenti , come il corallo , la piantaggine , l'echiseto , il sangue di drago , i marziali , la pietraematite ec. Bisogna essere anche più circospetto rispetto all'uso dell'allume , dello spirito di vetriolo , o dell'essenza di Rabel , ec. che debbon essere riserbati per li casi estremi : si è osservato , come la China poteva moderare il calor febbrile , che vien dopo le grandi emorragie ; ma quanto a me ho gran paura , che non si sieno esaminate poi quanto basti le conseguenze . Si fa talvolta uno strano abuso dei rimedj esterni , i quali debbon metter unicamente in opera nell'emorragie del naso

trasmo-

trasmodate, e sintomatiche, e quando si dubita, che i pazienti vadano a soccombere: si possono in questi casi praticare dei piomaccioli inzuppati nell'acqua fredda, e nitrosa, o nell'aceto, applicati al collo, alla nuca, alle tempie, alla fronte, allo scroto, ec. di pari che del bolo disfatto, e indurato coll'aceto, e colla chiara d'uovo; e applicato alla fronte: l'odore dell'aceto, e il suo fumo, quando si abbrugia, posson far qualche bene: ma le faldelle inzuppate in questo liquore, nell'acqua alluminata, nella stittica, ec. che s'introducono nelle narici, operano molto più speditamente: vi sono di quelli, che si servono semplicemente del cotone inzuppato nell'inchiostro da scrivere, che introducono nelle narici colla maggior riuscita del mondo: vi si soffia anche della polvere di bolo, di gesso, di sangue di drago, di mastice, ec. Finalmente si può ritrarre alcun vantaggio dai lavativi rinfrescanti, dal bagno, e dalle fregagioni alle gambe; dalle legature alle braccia, e alle cosce, dalle coppette sì a vento, che a taglio, ec. E' inutile il dire, che l'emorragia dal naso, la quale supplisce all'emorroidi, e ai menstrui, non dee fermarsi, se prima non si sono richiamate queste evacuazioni. Farò osservare in terminando ciò che riguarda l'emorragie del naso, che quando si è fermato il sangue con dei turtacioli, continua talora a scorrere di dietro alla bocca, d'onde può inondare lo stomaco, e il polmone, siccome ho io stesso veduto accadere a un uomo, che morì nel suo letto poche ore dopo essergli stata fatta simile operazione: questo avvertimento sta troppo bene in questo luogo.

L'ulcera delle narici semplici, e senza dolore, cagionata con frequenza dalle flussioni, non è pericolosa: vi si formano delle croste, che si portan via soffiandosi il naso, e talvolta ne cola un poco di sangue. Ma vi è un'altra ulcera sordida, maligna, e talora cancerosa, che si chiama *ozena*: questa è dolorosa, ed esala odore sì fetente, che ne vengono ad essere infastiditi gli stessi pazienti: è noto, ch'è sovente accompagnata da una carie, che fora il palato, e produce altri malori, che cangiano la conformazione del naso. L'*ozena* non si limita alle narici: si stende talora nelle cavità vicine; accompagna sovente il polipo, o gli succede: d'ordinario è un sintoma dello scorbutico, del malfrancese, o delle scrofole, e talvolta uno strascico del vajuolo.

in tutti questi casi è di difficilissima guarigione, e spesso anche incurabile.

L'ulcera semplice, e indolente del naso appena richiede alcun rimedio: un poco di cerusa, o qualunque altro dissecante, ripara sovente il male; ma l'*ozena* impegna in una cura ben lunga; poich'è indubitato, che bisogna investirlo con rimedj appropriati alla cagione interna, che vi dà motivo, e lo conserva. Dopo i rimedj generali, i temperanti, i vulnerarij, e i diaforetici sono i più praticati: tali sono il latte, il siero, i brodi di gamberi, e di vipera, le acque minerali fredde, i bagni domestici ec. La sua cura esteriore è poco diversa da quella delle altre ulcere: s'ammollisce la crosta con acqua tepida, con acqua di malva, coll'olio d'uova, e di mandorla dolce, col latte, col burro, ec.: la sua caduta produce talvolta dell'emorragie, che si stagnano, quando trasvolano, con li mezzi poc'anzi indicati: quindi fanno delle iniezioni vulnerarie, e detergenti, come con l'acqua di Balaruc, con l'acqua melata, con li decotti d'orzo, d'agrimonia, d'assenzio, di rose rosse, di perforata, di scordio, e di sabina; coll'acqua di calcina, alla quale s'aggiunge il mercurio dolce, ec. si stima ancora il sugo di geranio roberziano, l'esilir proprietatis, la tintura di mirra, e d'aloë, l'unguento egiziaco, ec. Alcuni fanno ricevere il profumo del cinabro; ma questo rimedio può esser pericoloso per rapporto al petto: non vi è niente da temere di quello di labdano, di mirra, di mastice, di storace, ec. Per lo più un intoppo alla sua guarigione si è la carie, ed è cosa rara, che vi si possa applicare il rimedio, che possa fissarla: i vescicanti, il setone, e il cauterio, danno in questo caso grande ajuto.

Il polipo, il cui colore, e la cui consistenza variano grandemente, occupano più, o meno spazio nelle narici, stendendosi talora al di fuori, e dietro la bocca: inceppa perpetuamente il respiro, ma di rado la deglutizione: egli è bianchiccio, rosso, livido, o nero: la sua carne, ora è floscia, ora consistente, e perfino cartilaginosa: il medesimo è indolente, o doloroso, e questo secondo prende spesso l'indole del cancro. Quando è unito all'*ozena*, si considera come un sarcoma ordinario; ma quanto a me son d'avviso, che una tal circostanza muti la sua natura: il floscio, il bian-

co, e l'indolente, si curano più agevolmente: il rosso è più ostinato: il livido, il nero, il duro sono incurabili, singolarmente se riconoscono un vizio scorbutico, o celtico. La cura del polipo è chirurgica; ma ad essa debbon andare innanzi i rimedj generali, con li temperanti, gli aperienti, ed altri adattati al morbo principale, di cui è questo il prodotto: quando è piccolo, e in una situazione vantaggiosa, possiamo investirlo coi disseccanti, e con li corrosivi: la polvere di noce di galla, di scorza di mela granata, d'aristolochia, di sabina, l'allume brugiato, il vetriolo calcinato, il verderame, il precipitato rosso, l'unguento egiziaco, l'acqua divina del *Fernel*, il butiro d'antimonio, e la pietra infernale, sono i più praticati; ma bisogna diligentemente difenderne le parti vicine. Da questi rimedj prudentemente amministrati sonosi perpetuamente veduti, e si veggono alla giornata ottimi effetti. Tuttavia l'estirpazione, quando il polipo è molle, e indolente, è il mezzo più spedito, e il più sicuro: questa è talvolta seguita da un'emorragia, che si ferma nella maniera consueta; ma questa operazione non è sempre praticabile, essendo talvolta il tumore inaccessibile, non meno dalla parte del naso, che da quella della bocca: sovente è ancora infruttuosa, perchè questa escrescenza si riproduce; lo che accade sicuramente, quando le ossa sono cariate: finalmente è cosa indubitata, che il setone, e il cauterio, non sono meno utili in questo, di quello sienolo nei precedenti casi.

MALATTIE DELLE ORECCHIE.

Il dolore d'orecchia (*otalgia*) talvolta è un male orribile: dipende comunemente dall'infiammazione delle parti interne, e vi si può non solo unire la febbre, ma eziandio il delirio, le convulsioni, i deliquj, ec. Termina il più delle volte colla suppurazione, e coll'ulcera, che si sventa sommamente a seccare. Si generano nelle orecchie dei vermi di varie forme, che risvegliano dolori meno continui dei precedenti, ma ugualmente orribili, e che fanno talvolta divenir furiosi i pazienti. S'insinuano eziandio entro le cavità di quest'organo varie sorte d'insetti; vi s'introducono varj corpi eterogenei, che possono risvegliare dolori intensissimi, e l'infiammazione. La sferza del Sole, ed altri accidenti esterni, la soppressione d'abituati evacuazioni,

le fioriture cutanee rientrate , ec. posson cagionare il dolore d'orecchia : le persone soggette alle flussioni vi sono più d'ogni altro esposte ; e questo morbo può , come additammo , eccitare accidenti mortali : quanto più interno è il dolore , tanto più è da temere ; tuttavia nel settimo giorno il paziente è sicuro di non morire . Talora l'infiammazione termina in tre , o in quattro giorni colla risoluzione : se in questo tempo sentonsi dei lancinamenti , deesi tener per sicura la suppurazione : l'ulcera , che ne risulta , produce sovente uno scolo , di cui si stenta a seccar la sorgente : sarebbe anche pericoloso il tentar di asciugare questo sfogo , quando è antico , poichè il frutto , che se ne potrebbe produrre , sarebbe l'apoplessia , l'epilessia , o le affezioni comatose . Segue talvolta , che la marcia venga dal cervello , somministrandole il passaggio la carie della rupe dell'orecchio : posson far sospettare di questo sconcerto le più atroci cefalalgie , che hanno preceduto questo scolo . Quando l'otaglia dipende dalla flogosi , non si può fare a meno di cavar sangue : si può anche ritrarre del vantaggio grande dall'applicazione delle mignatte , e delle coppette a taglio dietro all'orecchie : siamo spesso forzati , servendoci degli *allentanti* , e degli *addolcenti* interni , a ricorrere ai *narcotici* ; ma bisogna schivarne l'abuso , nel quale il più delle volte si pecca . I rimedj eterni sono gli *addolcenti* , i *rilascenti* , e i *maturanti* . Tali sono il latte di donna , l'olio d'uova , di mandorle dolci , di semi di lino , e di semi di giusquiamo : la midolla di pane , e gli altri cataplasmi emollienti , e digettivi : un grano di canfora introdotto nell'orecchio sul principio del male ha prodotto con frequenza buono effetto : la violenza dei dolori ci forza talora a ricorrere all'oppio , alla tintura anodina , e ad altri comprimenti : le fregagioni , e il bagno dell'estremità inferiori , possono di pari dar qualche sollievo . Quando è stabilita la suppurazione , si dà di mano alle iniezioni vulnerarie , e detergenti : l'orina , l'acqua di Balaruc , di Bagnères , e di Baresges : il decotto d'agrimonia , e d'aristolochia , l'infusione di rose rosse , e di fiori d'iperico , l'acqua d'orzo melata , quella di frassino colla tintura di mirra , d'aloe , ec. solo le materie più praticate per un tal uso ; si fanno anche colare entro l'orecchio alcune goccioline di balsamo del Copahù , di quello del Commendatore , ec.

Quan-

Quanto ai vermi generati nell' orecchio , e gl' insetti , che vi si sono introdotti , si ricorre al latte , all' olio di mandorle amare , all' olio petrolino , al decotto d' argento vivo , a quello della coloquintida , ec. per non parlare dei mezzi somministrati dalla chirurgia per farne l' estrazione , di pari che di tutti gli altri corpi eterogenei .

Non vi ha cosa più difficoltosa dello scuoprir la cagione della *sordità* : oltre gli sconcerti , i quali eccitano nell' organo la suppurazione , e la carie , l' ispezione anatomica ci scuopre anche la mancanza degli officini , e del timpano : questa membrana d' una grossezza straordinaria , o coperta d' una crosta , che la rende inaccessibile alle vibrazioni della materia del suono ; le cavità delle orecchie d' un mucco colloso , d' acqua , di sangue , o di marcia ; l' ostruzione delle trombe d' Eustachio ; tumori nel cervello , che comprimono l' origine dei nervi uditorj ; inondazioni , che producono l' effetto stesso ; il disseccamento di questi cordoni ; e finalmente l' ostruzione del condotto dell' orecchio , cagionata da escrescenze , che lo chiudono affatto , o dal cerume , che vi si secca , e s' indurisce : si può benissimo rilevare nei pazienti ciò , che segue nel condotto uditorio fino alla membrana del timpano , che in più soggetti si scuopre : non si può se non tirare ad indovinare , quando si vuol giudicare degli altri vizj ; tuttavia questi non tolgono totalmente l' udito , ma spesso lo rendono difficilissimo . Si veggiono molte persone , le quali sentono molto bene , tuttochè sia stato distrutto il loro timpano , lo che , come ho detto , in alcuni soggetti può distintamente rilevarsi ; oltre l' esserne certi , allorchè è seguita qualche suppurazione interna .

La sordità portata dal ventre della madre , perpetuamente incurabile , dipende da una rea conformazione dell' organo : quella dei vecchi , la quale nasce verisimilmente dal disseccamento , o dalla paralisi dei nervi , non è curabile : si spera poco della sordità , che viene dopo le lunghe cefalalgie , dal malfrancesco invecchiato ; dopo il vajuolo , la suppurazione , e lo scolo del sangue dall' orecchia interna ; dalle cadute , dagli spari dei cannoni , o dal suono delle campane , ec. ma se dipende dall' ostruzione del condotto uditorio , formata dal cerume accumulatosi , e seccatosi ; da escrescenze , dall' introduzione d' alcuno insetto , o d' altro corpo etero-

geneo; da acqua, da sangue, o da marcia, che inondino la cavità dell'orecchia; dall'intorpidimento del nervo uditorio, ec. vi si può rimediare. E' noto quanto basta, che la sordità, che sopravviene nella febbre maligna, non dura più del tempo della convalescenza. Non è difficilissimo il dileguare il rumoreggiamento d'orecchie, che assomiglia allo strepito d'un torrente, o che imita il soffio dei venti, lo scampano, e simili, avvegnachè dipenda, come si giudica con fondamento, da una cagione spasmodica: si sa, che i melancolici, e le isteriche, vi vanno più soggetti, e che precede le vertigini, l'epilessia, e le altre malattie convulsive; nulladimeno turba grandemente l'udito, e talora lo fa perdere affatto: si può riparare altresì alla sordità, che dipende dal disseccamento, o dalla soverchia tensione delle parti molli dell'organo, o dal loro rilasciamento; si può conoscere dai differenti effetti, che produce la mutazione del tempo, se l'orecchio è troppo arido, o troppo inondato: nel primo caso si sente meglio correndo tempo umido; ed il tempo asciutto è favorevole nel secondo caso: inoltre il grande strepito rende coloro, che hanno l'organo disseccato, molto più sordi; ed è per lo contrario favorevole a quelli, che si trovano nell'altra disposizione: questa osservazione può essere utilissima nella pratica.

E' superfluo il dire, dopo ciò, che abbiamo esposto, che la cura dee essere sommamente variata: quando il cerume si è accumulato nel condotto uditorio, non vi abbisogna altro salvo il nettarsi l'orecchia coll'istumento a tutti noto: il vapore dell'acqua calda può ammolire, e fare staccare ciò, che talvolta non può essere afferrato dall'istumento: questa ostruzione è più comune di quello altri s'immagini; e io ho avuto per le mani molte persone, le quali avevano quasi deposto il pensiero di riacquistar l'udito, esser rimase stupefatte della facilità, colla quale io l'aveva fatto loro ricuperare. L'escrescenze, che chiudono questo canale, vogliono la mano del Chirurgo: quanto ai corpi eterogenei, si rendono lubriche le strade per mezzo d'iniezioni oleose, e si procura di farne l'estrazione. I salivanti, e gli sternutatorij sono gli evacuanti più adattati per dilungare l'umidità, che inzuppa le orecchie: lo sternutamento può altresì colle sue scosse sturargli, non solo espellendone la serosità, il sangue, o la marcia,

cia, che vi si trovavano rinchiusi ; ma eziandio facendo scaturir gli animali , ed altri corpi eterogenei , che vi sieno introdotti . Si procura di rimediare al rilasciamento di questo organo , e all' intorpidimento dei nervi , che vi sono distribuiti , col vapore dello zolfo fattovi entrare con un imbuto, o con quello d' un decotto di salvia, d' assenzio , ed' altre piante fortificanti , con un grano di muschio , o d' ambragrigia introdotto con del cotone nell' orecchio : quest' ultimo è riuscito nei vecchi : le uova di formica infrante nel sugo di cipolla ; ovvero questo sugo mescolato coll' acquavite , introdotto nel medesimo canale , sono stati utili , anche contro le sordità invecchiate : l' acqua di frassino , di cui si fanno gocciolare alcune stille entro l' orecchio , è anche tenuto per un buon rimedio ; ma quanto a me non vi so vedere gran fondamento : si possono ritrarre molti vantaggi dalla docciatura alla testa coll' acque termali sulfuree : sonosi risanati ancora dei sordi , tirando più volte a se l' aria dell' orecchio : sono a tutti finalmente note le cornette acustiche , che possono in qualche modo giovare , quando tutti gli altri sono andati a vuoto . Il rumore degli orecchi può dileguarsi con rimedj interni appropriati all' affezione spasmodica , come anche con licefalici , i purganti , gli aperienti , ed altri , che possono richiedere alcune circostanze : si fa anche uso d' alcuni topici , come del latte , e dell' olio di mandorle dolci , del decotto d' anaci , dell' acquavite temperata , dello spirito di sale ammoniaco , del vapore dell' acqua calda , e d' alcun decotto aromatico , del fumo del succino , ec.

MALATTIE DELLA BOCCA.

Le labbra , di pari che le altre parti muscolose , son soggette alla convulsione , e alla paralisi : ognun sa , che queste due malattie , tuttochè sommamente opposte , producono l' effetto medesimo , o sia l' irregolarità della bocca (*torrura oris*) ; vale a dire , che uno de' suoi angoli è strascinato verso l' orecchio dalla convulsione de' suoi propri muscoli ; oppure dalla sua molla naturale , quando gli antagonisti son caduti in paralisi : se la convulsione è d' ambi i lati , ella eccita ciò , che addimandasi *riso sardonico* (*spasmus cynicus*). La paralisi d' uno degli angoli della bocca è il foriere , o la conseguenza dell' apoplessia ; la sua convulsione annun-

zia l'epilessia, o qualsivoglia altra malattia convulsiva: nel primo caso, i pazienti non hanno azione sopra l'angolo della bocca, che s'allontana dall'orecchio; nel secondo può approssimarvisi, ma s'allontanerà ben subito, quando cesserà d'operare la volontà. Questi due stati, che con grandissima frequenza vengon confusi, richieggon rimedj appropriati alle paralisi della bocca; ma non convengono alla convulsione: la canfora, l'olio di macis, e di ginepro, lo spirito di sale ammoniaco, e l'acqua della Regina, sono i topici praticati in tutt' e due i casi; ed è molto malagevole il giudicare dalle osservazioni, che abbiamo intorno al soggetto, se ci dobbiamo prometter molto dalla loro applicazione.

Le creature delle labbra (*fissurae*) vogliono semplicemente gli adolcenti: tali sono il sego ben lavato, l'olio di mandorla dolce, quello d'uovo, l'unguento rosato, e varie pomate: quantunque questa malattia sia d'ordinario leggerissima, non lascia di dar talvolta motivo ad ulcere assai ostinate. Si veggiono sovente ancora sopra le labbra ulcere colla crosta, che annunziano la fine delle febbri intermittenti, e talvolta delle continue: non vi si dee far cosa alcuna; ma ve ne sono altre assai simili alle prime, che sono il prodotto dell'ectico, o della cachessia: queste vogliono i rimedj appropriati al mal principale, oltre le applicazioni dissecanti col *nivutum*, coll'unguento di cerasa, e con altri. Il cancro delle labbra dee medicarsi, come quello delle altre parti. Al grugno leprino non vi è, che la mano Chirurgica, la quale possa rimediare; tuttochè la voce, ancorchè l'operazione riesca, rimansi perpetuamente nel naso, s'è spaccato il velo del palato; il vizio, a cui è quasi impossibile il rimediare.

E' la bocca sottoposta a molte specie di tumori: s'alzano sopra le gengive escrescenze carnose, ora con dolore, ora senza, le quali riescono bene spesso un vizio scrofoloso: i dolorosi debbonsi perpetuamente temere, perchè posson farsi cancerosi: tutti i varj topici, che si propongono, in questo caso sono inutili. non vi riescono nemmeno i caustici: il solo mezzo, che possa liberarsene, si è l'estirpazione: ella si pratica alla giornata felicemente con un istrumento tagliente possiamo anche servirci della legatura, permettendole la forma del tumore. Non vi ha cosa più comune del-

dello stivamento flemmonoso delle gengive: egli è quasi sempre cagionato dai denti, e accompagnato dall'infiammazione delle labbra, e della guancia: vi si forma d'ordinario della marcia, e la rottura, o l'apertura dell'abscesso termina in brev' ora questo leggerissimo male: le mollettature, che si praticano talora sopra le gengive gonfie, possono evacuarle; ma non se ne ritrae alcun vantaggio, quando son disposte alla suppurazione: allora s'applicano sopra il tumore fichi polputi tagliati pel mezzo: si tiene in bocca del latte, o qualche decotto emolliente: gli abscessi superficiali scoppiano per lo più di per sè, oppure con la sola compressione; ma quando son profondi, e che ascendono verso l'orbita, bisogna farne l'incisione, affinchè la marcia non investa il periostio, onde risultano fistole di malagevolissima guarigione: lavasi poscia la bocca col vino caldo, coll'idromele, col decotto d'agrimonia, o con qualunque altro detergente: finalmente è sommamente commendata la gomma lacca contro la putrefazione delle gengive: quando queste sono semplicemente tumefatte senza flogosi, vi si può rimediare col farle alcuna volta gittar sangue.

La *ranula* è un tumor salivale, molle, e bianchiccio, ch'è piantato sotto la lingua, e ne inceppa il moto non meno per inghiottire, che per parlare: acquista alcuna volta la grossezza d'un uovo di gallina: la materia, che contiene, è quella della saliva, divenuta muccosa dal suo rimanersi imprigionata: questo sacco può anche racchiudere della marcia, delle concrezioni gessose, ec. Sono più degli altri soggetti i fanciulli a questo tumore, che riconosce talora un vizio scrofoloso, e può anche, essendo malamente medicato, divenire carcinomatoso. Tutte le applicazioni astringenti, stitiche, e altre, delle quali servono comunemente, o sono inutili, o dannose: bisogna aprire il tumore colla lancetta, o col ferro infuocato, e poscia usare i gargarismi fatti col decotto d'orzo, col miel rosato, colla tintura di mirra, ec. Il sugo della celidonia maggiore è nato fatto per distruggere il sacco contenente il liquore: se non si prende una tale precauzione, riempirà di bel nuovo; oppure, lo che rade volte si schiva, rimarrarvi una fistola.

Le mandorle, oltre la loro infiammazione ordinaria, che non dee esser disgiunta dall'angina, di cui faremo un

un Articolo a parte, si stivano talora a bell' agio, e si fanno scirrofe, e si esulcerano, come si vede accadere alla giornata a motivo del celtico, o delle scrofole: questi tumori non esculcerati per lo più non danno dolore, e incomodano soltanto a motivo del loro volume; ma non è lo stesso degli altri, che inceppano grandemente l'inghiottire. Dopo i rimedj generali, e gli specifici della malattia principale, da cui questi dipendono, non vi ha cosa più atta a fargli appassire, dei vescicanti, delle coppette, del setone, e del cauterio, tuttochè non sempre si praticino questi mezzi con riuscita: si possono estirpare gli scrofolosi, e distruggergli col cauterio attuale, o potenziale; ma pochi s'appigliano a questo partito. Le mandorle non sono le sole parti esposte agli scirri, e ai cancri: ne vengono alle labbra, alla lingua, e nelle altre parti della bocca: questi danno la fumata per mezzo d'un picciol tumore indolente, che ingrossa insensibilmente, si fa doloroso, s'apre, e s'esulcera; nulladimeno questi tubercoli indolenti possono sussistere lungo tempo senza prendere il carattere di cancro, quando non vi sia cosa alcuna: e in fatti questo è l'unico partito da prendersi in tal caso; ma ciò non impedisce, che non s'abbiano a praticare i rimedj interni da noi proposti altrove: il solo, che possa agevolmente estirparsi, è quello, che occupa le labbra, e che comincia da una pustola livida, o da un porro; ma gli altri di rado si adattano a tale operazione.

Le ulcere della bocca son molto più comuni, che i tumori: è noto, che si chiamano *afte* quelli, che sono superficiali, e poco estesi, situati sotto la lingua, le labbra, le gengive, e il palato: è un male leggierissimo, quando si limita alla bocca; ma segue talora, che si dilati lungo l'esofago, lo stomaco, e gl'intestini, e che risvegli la febbre, la diarrea, e la dissenteria. Sono talvolta le afte il sintoma delle febbri infiammatorie, e delle intermittenti, e remittenti autunnali, ec. Le altre ulcere della bocca, che si distinguono dalle afte, al loro rispetto, alla loro estensione, e alla loro profondità, son celtiche, scorbutiche, o scrofolose: attaccano l'uvola, e le mandorle, le gengive, la lingua, e il palato, e mediante il loro carattere fagedenico fanno una orribile strage: quelle del palato comunemente celtiche, cariano ben presto l'os-

so,

so, e s' aprono una comunicazione col naso ; apertura, che dà del fastidio in tutte le operazioni della bocca, e che non si chiude più, per quanto si tenti : non è la sola carie ciò, che si dee temere : formansi nelle altre ossa vicine delle ulcere, e non ne rimane a coperto nemmeno quello della mascella inferiore. Tutte queste ulcere differenti divengono talvolta cancerose, e per conseguente incurabili : le punte dei denti rotte con frequenza cagionano delle ulcere, che in brev' ora si risanano, quando se n' è dilungata la cagione ; nulladimeno si è talora veduto, che una rea disposizione le ha fatte divenir cancerose : quanto alle altre, che contraggono questo carattere, è cosa rara, che non sieno precedute da tubercoli, e da altri tumori di varia indole. I fanciulli, massime se hanno vermi ; le donne gravide ; quei, che abitano in luoghi umidi, e i vecchi, sono più degli altri sottoposti alle afte, che sovente danno motivo a una fastidiosissima salivazione : possono essere anche il prodotto delle ree digestioni, ovvero succedono, come abbiamo accennato, alle febbri, e le accompagnano : finalmente il loro aspetto ha molta influenza sul pronostico : le bianche, e le pallide non sono di reo augurio ; ma si temono le livide, e le nere : sì l' une, che le altre nella tifichezza confermata annunziano la fine del paziente.

Non si debbon seccare le afte febbrili, se non è terminata la malattia principale, avvegnachè si debbano considerare, come una specie di crisi, che sarebbe sommamente pericoloso il troncare, come ci ha fatto pur troppo conoscere l'esperienza : le semplici facilmente cedono allo spirito di vetriolo, o di zolfo, che si può addolcire col miel rosato : pel medesimo uso è anche propriissima l'essenza di Rabel : spesso volte basta semplicemente toccarle una sola volta per farle dileguare. Rispetto alle altre ulcere non vi è dubbio, che debbasi cominciare da investire la malattia principale, quando siamo tanto fortunati, che giungiamo a conoscerla : non si lascia di praticare in siffatte occasioni varj gargarismi emollienti, detergenti, e disseccanti : si amministrano per bocca gli umettanti, gli allentanti, e i lassativi ; il latte, e il siero in questo caso sono stati di grande uso : si può talvolta ricorrere ai narcotici : sonosi anche prescritti con buono evento i brodi di vipera, e di tartaruga ; il decotto dei legni, ec. per non

non far parola degli altri rimedj appropriati al mal-francese, allo scorbutico, e alle scrofole. Oltre i gargarismi accennati, se ne preparano eziandio colle piante antiscorbutiche, col miele, colla tintura di lacca, coll balsamo del Commendatore; coll'acque di Balaruc, di Bareges, ec. Finalmente si toccano le ulcere coll' olio di mirra per deliquio, coll'elisir *proprietas*, ec. Quanto all'ulcere cancerose, si lava la bocca con una gagliarda soluzione di nitro, o di sale ammoniaco, aggiuntovi un poco d'acetò, o di sugo di cedro: si usa anche il miel rosato collo spirito di sale alla dose di quelle quaranta in cinquanta goccioline sopra un' oncia di miele. Allorchè il palato è forato, si fissa la carric, e l'ulcera con li mezzi consueti: quindi si procura di rimediare a tal difetto con una lamella d'oro, o d'argento, la quale si raccomanda a un pezzetto di spugna, che riempiendo esattamente il foro, vi si mantiene attaccata. Per quel, che spetta all'ulcere cancerose, si possono dileguare quelle delle labbra, ed anche delle gengive; ma per le altre forz'è contentarsi d'una cura palliativa.

La *salivazione* (*ptialismus*) viene ai fanciulli, quando mettono i denti; ma si ferma, quando è passato il dolore: gl'ipocondriaci, gli scorbutici, e alcuni cachettici, son sottoposti al frequente sputo, che non solo è fastidioso, ma che può precipitargli nel marasma; poichè ne ho veduti di quelli, che facevano due libbre di saliva il giorno. Le asse, e le ulcere della bocca, danno con frequenza motivo alla salivazione, di pari che le flussioni: si sa, che viene spesso prodotta dal mercurio, ch'è eccitata dalle materie stimolanti, che tengonsi in bocca, dalle piaghe dei condotti salivali, ec. Non si dee investire il *ptialismo*, come si fa talvolta, con dei gargarismi astringenti, mentre ne posson nascere non lievi sconcerti; ma con purganti, e con lassativi, con diuretici, sudorifici, ed altri evacuanti, atti a produrre una revulsione.

Fra le malattie dei denti, quella, ch'è la più comune, e che richiede soccorsi più spediti, è il loro dolore (*odontalgia*). Sovente dipende questo da una flussione; ma con più frequenza dalla loro carie: si osservano dei mali di denti, che dipendono dal reumatismo, e dalla gotta; ed è anche talvolta un sintoma della gravidanza. L'impressione del caldo, o del freddo

do sopra il dente, d'ordinario accresce il dolore: per lo più l'enfiagione delle guancie ne annunzia il termine: quei, che tengono ben coperta la testa, ne sono esenti, o meno sottoposti. Spesso siamo forzati a ricorrere alla cavata del sangue; e vi sono perfino dei casi, che possono esigere l'arteriotomia: molti si contentano di far uscir del sangue dalle gengive, e sperimentano in questa operazione un sollievo, che non vien loro dai maggiori rimedj. Quanto alle gengive infiammate, si tiene in bocca del latte caldo, il decotto di fichi, o qualunque altro liquore addolcente: l'acquavite, l'aceto col pepe, col garofano, o colla cannella, e nel quale siasi fatta bollire la salvia, e il pilatro, che si tiene per qualche spazio di tempo in bocca, sono i rimedj più usati, e i più atti a calmare il mal dei denti: si tocca la carie coll'olio di timo, di garofano, o di bosso: vi s'introduce dell'oppio: vi si applicano spiriti acidi per distruggere il dente: si scotta il nervo col cauterio attuale; sebbene questi ultimi ripieghi non praticati gran fatto posson produrre dei rei effetti. Si prova alcun sollievo masticando del tabacco, del pilatro, del seme di stasisagria, ed altri salivanti. Quando il dente è guasto, ognun sa, che bisogna impiombarlo, o (lo ch'è molto più sicuro) farlo cavare: la sua estrazione eccita alcuna volta l'emorragia, che si ferma con della tela di ragno inzuppata nello spirito di vetriolo, o nell'acqua stittica, colla quale si chiude l'alveolo: si può anche riempirlo senza ombra di pericolo colla cera, o coll'agarico. I vescicanti dietro all'orecchie, l'impiaastro di *tacamahaca* coll'oppio, o coll'olio di giusquiamo sopra la tempia, le lumache infrante applicate nella stessa parte a foggia di cataplasma, il cauterio attuale all'anti-trago, ec. sono finalmente gli ajuti, dai quali si sperimentano buoni effetti. Diremo rispetto ai denti guasti, che sopravvengono dei tubercoli alle gomme, e al mento, che si tenta indarno di guarire, qualora non si faccia cavare il dente, che gli conserva. Si dilegua il legamento dei denti (*flapoor dentium*) col masticare dell'erba porcellana, del crescione, della rucola, delle mandorle, delle nocciole, del formaggio, ec. Sotto la crosta dei denti s'ingenerano dei vermicciuoli, che non si rilevano se non col microscopio, i quali cariano i denti, e cagionano del fetore: si pre-

ten-

tende, che a ciò si rimedj col tenere in bocca il decotto di sabina. Si nettano i denti col pane abbrustolato, lavandogli poscia col vino: si fortificano nel loro alveolo col decotto di lentischio, del qual legno si fanno anche i curadenti; colla gomma lacca, col casciù nel vino, ec.

La sete eccessiva è un sintoma della febbre, e dei mali infiammatorj, dell' idropisia, ec. Quella, che si prova pel caldo, o per l' esercizio, non si dee porre fra le malattie: si sa, rispetto a questa, che l' acqua pura l' estingue meno, che quando è mescolata col vino. L' estrema sete, e la grande aridezza della bocca, siasene quale esser si voglia la cagione, spesso arroschiscono la voce. Lo stato contrario di rado è da temersi, e si veggiono molte persone, le quali a mala pena bevono, che godono una perfetta sanità; ma l' aversione per la bevanda, o l' orrore del liquido, è, come dicemmo altrove, il segno caratteristico della rabbia, e un sintoma d' alcune febbri maligne: ho veduto pure la stessa aversione in alcune donne isteriche, le quali per lo più leggiero sospetto del liquido cadevano convulse. Si sperimenta alla giornata, come la bevanda nitrata, quella, alla quale si comunica un acido grato collo spirito di vetriolo, o con qualunque altro acido minerale; la limonata, e gli altri acidi vegetabili, scemano grandemente la sete, che tormenta i febbricitanti: che il decotto di cicoria calma quella degli scorbutici, e degl' idropici: che l' acqua d' orzo, di riso, e il brodo lungo di pollastra, ed altre bevande adolcenti, attutano quella, che nasce dalla saliva salata.

L' uvola rilasciata (*uvula prolapsus*) è un picciol male, ma spesso in estremo fastidioso: sembra, che abbiai perpetuamente in gola un boccone da inghiottire, e talora si teme anche di rimanerne soffogati. Gl' idragoghi, i diuretici, e altri, che s' addicono alle flussioni e ai catarri, possono in questo caso giovare; ma si ricava maggior vantaggio dai topici: tali sono il decotto di lentischio, di piantaggine, di vitalba, e altri gargarismi ripercussivi, e astringenti: s' immerge l' uvola nella polvere d' allume di biftorta, di pepe, di pilatro, e di gengiovo; nell' acqua della Regina, nello spirito di vino canforato, nello spirito di sale ammoniac, e in altri liquori stimolanti. Quando tutti i divisi rimedj fallano, e che il prolapsus è di vecchia

da-

data, si può tentarne la guarigione con un cauterio alla nuca; se poi va a vuoto anche questo ripiego, non vi è altro partito da prendere, salvochè l'amputazione, chechè se ne dica *Ippocrate*, e tutti coloro, che l'hanno copiato: quanto a me più volte l'ho tentata, e sempre felicemente. Nulla dirò dell'inflammazione dell'uvola, perchè appartiene all'angina.

La difficoltà d'inghiottire è un male sommamente variato, e che talora è gravissimo. Le cagioni, che la producono, senza comprendervi la flogosi, possono riferirsi alla contrazione spasmodica della faringe, e dell'esofago, alla loro paralisi, o alla loro ostruzione. Le isteriche, gl'ipocondriaci, e gli scorbutici son sottoposti a strangolamenti convulsivi dell'esofago, che rendono l'inghiottire difficoltoso, e doloroso, massime per gli alimenti solidi, e per i liquori freddi: questo spasmo si comunica alle parti circonvicine, la cui tensione è rilevabile: molti di coloro, che si trovano in tale stato, si lagnano di dolori di schiena, provano dei ramoreggiamenti, che indicano le flatulenze, che rigurgitano quivi, e che talvolta trovansi imprigionate nello stesso esofago: hanno delle nausee; rendono orine limpide, per non parlare dei tremori, delle abbreviature irregolari, o degli altri sintomi, dei quali abbiamo altrove fatto parola. La difficoltà d'inghiottire dipendente di spasmodia, cessa di tratto in tratto, dove quella, che nasce da paralisi, è continua; oltredichè in questa con minor difficoltà si fanno passare gli alimenti solidi. Si distingue l'una, e l'altra dall'angina, per la febbre, per la sete, e per l'inflammazione da quest'ultima inseparabili.

La collera, singolarmente nel tempo del pasto, o dopo la ripugnanza invincibile, che altri ha per certi alimenti, o rimedj: gl'insetti, ed altre cose disgustose, che s'inghiottono senza abbadarvi; i veleni, ec. danno talora motivo alla difficoltà d'inghiottire *spasmodica*: può questa anche essere il sintoma della febbre maligna; dei vermi, o d'alcuna infermità delle prime vie; essendo noto, che lo spasmo dello stomaco nelle nausee si comunica all'esofago, alla faringe, e fino alle glandule salivari; ma in un grado inferiore. Colla cognizione sola di queste cagioni tutte si può giudicare dell'evento, e regular la cura, che dee sempre mai riferirsi a quella delle malattie convulsive. La ca-

vata del sangue radè volte è necessaria; ma si può ritrarre grandissimo bene dagli emetici, e dai purganti: gli addolcenti, come l'olio di mandorla dolce, e lo spermaceti, sono utilissimi, di pari che i calmanti, cavati dal nitro, dalla canfora, dal liquore anodino minerale, ec. Non bisogna altresì perder d'occhio gli antistherici, i vermifughi, i contravveleni, e altri appropriati al male, del quale può esser sintoma lo stringimento spasmodico dell'esofago; i clisteri acri, e carminativi, i bagni caldi, ai piedi; le vesciche piene d'acqua calda, o di latte; i cataplasmi, e le fomentemollienti, che si applicano intorno al collo, posson parimente giovare. La paralisi degli organi della deglutizione è l'ordinaria conseguenza dell'apoplezia, e d'altri mali del cervello: di rado è sanabile: abbiamo parlato di questi segni distintivi, abbiamo anche proposto la sua cura, che non differisce da quella della paralisi generale, e principalmente della lingua, di cui ragionammo.

La deglutizione è parimente difficoltosa, o abolita dai tumori propri dell'esofago, o da quei delle parti adjacenti, che comprimono il canale: l'apertura dei cadaveri ci ha fatto vedere dei tubercoli, o tumori per tutta la lunghezza dell'esofago: questo canale seccato, e divenuto cartilaginoso: sonosi veduti all'imboccatura della faringe, e nell'orifizio dello stomaco anelli scirroso, e callosi somigliantissimi a quelli, che si osservano molto comunemente nel piloro: ulcere nelle varie parti del canale: una gran quantità di grasso indurito, circondante l'esofago, e la trachea arteria: tumori provenienti da questo ultimo condotto: lo strivamento del timo: la grossezza straordinaria della tiroide, e delle altre glandule del collo: adesioni, ed altri vizj del polmone: l'aneurisma dell'aorta, ec. Finalmente abbiamo osservato l'orifizio superiore dello stomaco compresso, e il corpo di questa viscera spinto verso il bellico dall'enorme volume del fegato; per non parlare di molti sconcerti, che sono le conseguenze ordinarie delle lunghe attinenze. Poco ajuto somministra la Medicina contro somiglianti mali, per la maggior parte occultissimi: in questi casi non ci serviamo che di paliativi: il latte, il decotto di seme di lino, e di fiori di malva, i calmanti, ec. sono i rimedj, che si tenta di far passare, quando la difficoltà d'inghiottire è do-
loro-

lorosa. Finalmente in tutti i casi, nei quali la deglutizione è assolutamente abolita, si può somministrare alcun nutrimento ai pazienti schizzettando per l'ano del latte, dei brodi, e dei consumati: del rimanente si può viver lungamente, senza prendere alcun nutrimento. I nostri Istoricî parlano d'affinenze, non solo d'alcuni mesi, ma eziandio di più anni: la maggior parte però di queste relazioni è sospetta; e si è sovente scoperto, che vi era minor maraviglia di quella avessero interesse certuni d'insinuarvi.

Ci rimane il far parola dell'ostruzione dell'esofago più orvia, ed a cui siamo ogni dì esposti: dipende questa da bocconi d'alimento non masticati, che s'impegnano in questo condotto, e che possono soffogare sul fatto stesso, siccome ve ne ha molti esempj. Vien questa pur cagionata da ossi, e d'altre materie incrociantisi, che vi si fermano; da noccioli, e da un'infinità di corpi eterogenei; che il caso, e il capriccio fanno inghiottire: si fanno uscire, o passare i pezzi di carne con iscuotere i pazienti, o con percuoter loro la schiena: i vomitivi, l'olio, il butiro, i brodi grassi, e altre bevande lubrificanti, s'addicono agli altri casi. Quando sono inutili tutti questi tentativi, si procura di farne l'*estrazione*; o si ricorre a una candela, o a un osso di balena, colle quali si spinge verso lo stomaco il boccone, o qualunque altro corpo, che impedisce il passaggio: così appunto mi riuscì di liberare un uomo da uno scudo di sei lire, che si era fissato nella parte inferiore dell'esofago: ciò nonostante quest'ultimo mezzo per lo più non riesce, quando il corpo aguzzo si è impegnato, e incrociato nella sostanza dell'esofago: in tal caso non abbiamo ripiego, che nella suppurazione, e putrefazione, che vi risveglia: per tal lavoro della natura io ho veduto terminare l'ostruzione imperfetta, ma in estremo dolorosa dell'esofago, una volta per un boccone impegnatosi, ed un'altra per un seme di caucali incontratosi nella minestra: l'introduzione delle candelette, e dell'osso di balena in questi due casi era stata affatto inutile, e i pazienti n'erano stati grandemente tormentati, e strapazzati: ve ne sono anche di quelli, che non possono assolutamente soffrire questa operazione, e precipitano in orride convulsioni; imperciocchè ella si è tale, che richiede in chi l'intraprende con minor prudenza, che abilità.

Tuttochè il reo odore della bocca non dia d'ordinario alcuno incomodo, tuttavia è sommamente reo per quello che cagiona agli altri: si fa, che gli sconcerti cagionati nella bocca dal malfrancesse, e dallo scorbutico; che i vermi, e le crudezze dello stomaco; che i denti guasti; che le ulcere del polmone, del naso, ec. rendono il fiato puzzolente; per non parlare dei fumatori, e dei bevitori di professione; di coloro, che hanno mangiato dell'aglio, delle cipolle crude, ec. eppure segue, che non si possa riferire quest'incomodo ad alcuna delle divisate cagioni; ma alla natura dei vapori, che si sollevano dal polmone. Il fetor della bocca con indizj d'acidità, nei fanciulli è un segno di vermi: quello degli adulti, che è passeggiero, indica putride indigestioni, che si possono correggere: è soverchio il dire, che quello, che è segno, o sintoma d'un mal noto, cessa, riparato che si abbia il male principale: si è osservato come l'acetosa faceva benissimo, quando dipendeva da scorbutico. Si sono trovati in molti soggetti, che avevano patito questo incomodo, il timo, il polmone, e le viscere del basso ventre in uno stato di putrefazione; ulceri nello stomaco, ec. Si vede senza gran sapere, come in tali casi è assai difficile il rimediarvi. Il fiato puzzolente, che nasce da vapori, che si sollevano dal polmone, fa testa a tutti i rimedj: questo s'incontra, di pari che quello della traspirazione cutanea, in soggetti, che godono per altro ottima sanità: e sarebbe probabilmente pericoloso il liberargli da questo fastidio, che si può correggere mantenendosi sommamente netto - e col tenere in bocca materie fragranti, come la radice d'angelica, o d'imperatoria, la scorza d'arancia, o di cedro, ec. Gli altri casi posson ammettere la guarigione; ma questa dipende perpetuamente dal mal principale, che vi dà motivo; male però, che si sottrae bene spesso alle più esatte ricerche.

L' A N G I N A .

Le varie barbare denominazioni assegnate dagli Scrittori a questo morbo, sono piuttosto il linguaggio scolastico, che Medico. I Medici Pratici si contentano di fissarsi ad esaminare, se questo male è infiammatorio, o d'altra natura, come catarrale, cancrenoso, e convulsivo; e quali sieno le parti, non meno della faringe,

ge, e della laringe, che degli organi delle parti adiacenti, che ne fanno la sede: stanno per altro attentissimi al grado di difficoltà, che si prova, sì nell'inghiottire, che nel traspirare, come ad altri accidenti ancora, che fanno questa affezione più, o meno pericolosa. L'angina infiammatoria, o sia la vera squinanzia, è uno dei più acuti morbi: i brividi, la febbre violenta, il dolor di testa, l'enfiagione flemmonosa della gola, la faccia infiammata, ec. la caratterizzano quanto basta: investe questa la faringe, la laringe, e le parti contigue, come l'uvala, le mandorle, la lingua, il palato, ec. La deglutizione, e il respiro, ne sono più, o meno inceppati: ell'è talora accompagnata dall'enfiagione del collo, e del volto, come altresì della lingua, che in quel caso non può rimanersi dentro la bocca. L'angina catarrale da alcuni Autori denominata *angina spuria*, e che chiamasi comunemente mal di gola, il più delle volte è senza febbre: si rileva nel fondo della bocca, e per lo più nelle mandorle, una flogosi leggiera, che produce d'ordinario piccioli abscessi, la cui guarigione si lascia in mano della natura: la difficoltà d'inghiottire è più o meno faticosa, e questo è il più reo accidente, che vi è unito. Certuni hanno altresì chiamata *angina spuria* quella flussione esterna, che ha la sua sede nelle parotidi, nelle massillari, e nelle altre glandule salivari, e che addimandansi *gattoni*; ne abbiamo parlato nell'Articolo della parotide. Gli scorbutici, e gli infetti di celtico, sono pure sottoposti a un mal di gola, il quale, quanto agli effetti, ha del rapporto al catarrale; ma quello, che s'unisce alla rosolia, al vajuolo, ed alcune febbri maligne, di pari che quello, ch'è effetto del Mercurio, debbonsi distinguere dai precedenti.

L'angina cancrenosa è d'ordinario epidemica, e contagiosa: per lo più investe soltanto i fanciulli, o i giovani; ma non n'è esente tuttavia alcun'altra età: di rado comincia dai brividi: sul principio la febbre è poco rilevabile, ma per lo più s'ingagliardisce verso il terzo giorno del male: verso questo tempo, e anche prima, si scuopre un gonfiore, non meno nelle mandorle, che nell'uvala, e delle tacche giallognole, o scure, non solo sopra queste parti, ma eziandio sopra le adjacenti, fino alle labbra: degenerano queste ben presto in asse, i cui contorni infiammati, e dolorosi of-

frono un tristo carattere : in alcun il male è più profondo, e occulto ; ma la difficoltà d'inghiottire, la voce ruoca, il rantolo, e l'uscita d'alcuni stracci membranosi, la palesano quanto basta. Ci ha insegnato l'apertura dei cadaveri, che queste ulcere si stendevano non solo nel naso, ma ancora per tutto il tratto dell'esofago, dello stomaco, e delle budella, di pari che nella laringe, nella trachea arteria, e nei bronchi. Formansi sopra le parti affette, ed esposte all'occhio, delle croste a foggia d'escara, che i pazienti mandan fuori collo sputo, di pari che degli stracci della membrana, che veste queste parti, e che in tal caso soccombe ad un vero sfogliamento, staccandosene talora grandissimi brani : nei più la lingua si gonfia ; enfiansi le parotidi, e la bocca contrae un orrido fetore ; la voce divien ruoca, difficoltoso il respiro, il polso è picciolo, e irregolare, e si muove sul quinto, o sul nono giorno del male : oppure la malattia tira a lungo a segno, che termina sul quarantesimo. L'angina convulsiva è annunciata da una somma difficoltà d'inghiottire, e di respirare, senza che comparisca, nè rossore, nè stivamento, nè tumore ; talora soffoga il paziente in poche ore. Quest'ultima specie d'angina, descritta con estrema confusione, di rado è essenziale, ma bensì con frequenza un sintoma del *Tetano* ($\tau\acute{\epsilon}$ *Taro*) dell'affezione isterica, e ipocondriaca, ec. E' parimente la conseguenza della putrefazione del polmone, del timo, del fegato, ec. come ce lo ha più volte fatto rilevare l'ispezione anatomica : abbiamo già osservato, ch'era stata molte volte confusa col catarro soffogativo.

Il caldo, e il freddo, che prestamente si succedono, sono con frequenza la cagione della squinanzia : la respirazione tornata in dietro, la gotta rimontata, la soppressione menstruale, ed emorroidale, ec. possono similmente darvi motivo : è pure l'effetto dei veleni, del morso d'animali velenosi, ec. E' noto, ch'è la più pericolosa di tutte le fiorosi : talora i pazienti soccombono il primo giorno del male, ma d'ordinario sul quinto : la lingua infiammata, la spuma alla bocca, la voce acuta, il polso intermittente, le convulsioni, le ansietà, ec. sono i più tremendi sintomi di questo morbo. Si è talora osservato, come questa infiammazione si gettava sul polmone, o sopra le parti esterne del collo ; egli è agevole il giudicare, quale di queste

due accidenti è più da temersi : è pure soverchio il dire, che l'infiammazione, che investe la laringe , è più terribile di quella della faringe : tuttavia gli abscessi delle mandorle in un certo volume possono soffogare i pazienti , quando si trascura d'aprirgli . La squinanzia termina, come le altre flogosi, colla risoluzione, colla suppurazione, collo scirro, o colla cancrena : coloro , che ne sono stati attaccati, debbon temerne la recidiva : si è osservato come il flusso dei menstrui , e delle emorroidi , l'hanno sovente dileguata . Poco , o nulla ci dà da temere l'angina catarrale ; ma la cancrenosa , tuttochè apparentemente sul principio leggerissima , ci dee riempire di timore ; avvegnachè questo male , come dicemmo , può in brev'ora comunicarsi alle prime vie , ed al petto ; circostanza , che la rende mortale : ci dobbiamo aspettare tale accidente, quando ci accorgiamo , che le ulcere si stendono rapidamente : si è osservato , che i vecchi vi resistono più degli adulti , e dei fanciulli ; e che quelli , fra questi secondi , che la superano , restano in uno stato di languore , dal quale non si ricovrano . L'angina convulsiva , che sopravviene dopo le grandi perdite di sangue , e le malattie lunghe , è mortale : abbiamo detto , che coloro , il cui polmone , e il cui fegato si trovavano in uno stato di putrefazione , spesso ne muorivano ; ma se dipende da una cagione passeggera , senza vizio , o intacco alcuno negli organi , non porta seco , che lieve pericolo .

La squinanzia esige spediti soccorsi , non vi si risparmia la cavata del sangue : apronsi le vene delle braccia , dei piedi , del collo , e della lingua , si applicano le mignatte alle parti più vicine , e le coppette a taglio alle spalle , sotto le mascelle , e altrove : si amministrano in copia gli allentanti , e gli addolcenti , una bevanda nitrata , ec. si mantiene il corpo obbediente per mezzo di lassativi , e coll'intenzione stessa si fa uso dei clisteri purgativi , e stimolanti : nei casi urgenti si fa anche prendere l'emetico ; e questo rimedio ha salvata la vita a molti infermi : gl'ipnotici in questo caso sono infinitamente sospetti , tuttochè molti Medici non lascino di prescriverne : i diaforetici possono esser propri , quando il male ci dà tempo d'usargli , e che ci siamo assicurati , non meno colle cavate di sangue , che con gli allentanti , dell'incendio , che possono cagionare . I gargarismi addolcenti , e repersivi vi s'

impiegono affai ; posson giovare altresì i salivanti ; ma non s' addicono a tutti i casi : si fa uso eziandio dei cataplasmi anodini , e rilassanti , non meno per attuare il dolore , che per determinare il rumore alla superficie : quello di nido di rondine assegnato a questo male , è meritamente riputato un buon risolvente : i vescicanti alla nuca posson benissimo produrre una vantaggiosa revulsione : posson essere utili le scarificazioni nella bocca : la *broncotomia* ci dà un ripiego nei casi disperati : finalmente il cauterio è atto ad impedirne la recidiva . Allorchè rileviamo l' abscesso , non dobbiamo in verun conto aspettare , che s' apra di per sè , ma bisogna aprirlo , e poscia far uso d' un gargarismo detergente . Abbiamo altrove fatto parola del tumore scirroso delle mandorle ; quì noteremo di più , ch' è talvolta la conseguenza della squinanzia . L' angina catarrale , o mal di gola non vuol sempre la cavata del sangue ; ma vi giovano i purganti : si cuopre il collo di lana ; vi si applicano ceneri calde , sterco di colombo , foglie di giusquiamo cotte sotto la cenere , ec. Si praticano gargarismi fatti col latte , col decotto di fichi , con quello di brionia , d' iperico , di consolida maggiore , ec.

L' angina cancrenosa rade volte vuol sangue : l' emetico nel principio , e anche i purganti vi fanno gran bene : gli alexiterj , e i sudorifici vi si possono amministrar ; ma gli antisettici , come la limonata , l' acqua d' acetosa , ed altri acidi , il nitro , la china , ec. vi s' addicono di vantaggio : la canfora ha prodotto effetti migliori d' ogni altro rimedio , ed il suo uso non si può commendar mai quanto basti . Le coppette a taglio alla nuca , e i vescicanti hanno fatto gran bene : le scarificazioni tentate sopra le parti cancrenate , nell' ultime epidemie sono state fatalissime , di modo che si dee lasciare alla natura il pensiero di preparar l' escara : si può bensì agevolarne l' operazione con gargarismi addolcenti , e rinfrescanti : quelli , che sono stati preparati coll' acqua d' acetosa , e con quella di rose , nella quale si era posto qualche granello di sale di Saturno , pare che abbia prodotto miglior effetto . Si stima eziandio lo spirito di sale addolcito col miele rosato , alle porzioni di venti gocciole di spirito sopra mezz' oncia di miele , con cui si toccano più volte il giorno le parti offese . Si può rendere più energica questa mescolanza , se pare che il male s' inoltri con soverchia rapidità .

SEZIONE TERZA.

Malattie del Tronco, e dell' Estremità.

PLEURITIDE SPURIA.

Questa si manifesta per mezzo d' un vivo dolore nel petto, non meno allo sterno, e ai lati che al dorso, e verso le clavicole: questo cresce allorchè s' inspira, e che si tocca la parte: spesso vi sono unite la tosse secca, e la febbre. Questo male mostra d' aver la sua sede nei muscoli intercostali, ed altri disposti sul petto: non ha niente d' infiammatorio, ma può acquistarne il carattere, quando è mal medicato, gettandosi sulla pleura, o sul polmone, ed anche sul fegato, come ci hanno fatto toccar con mano numerosissime osservazioni: questo fatto s' accorda molto colla natura del sangue, che si trae, che ha sovente l' aspetto di quello dei pleuritici. La durata della pleuritide spuria è molto incerta: d' ordinario non oltrepassa il settimo giorno, e sovente termina più presto; ma è soggetta a inaspettate recidive. Ha sovente la sua sorgente nella cagione comune delle flussioni; ma talora è reumatica, o gottosa: la retrocessione dei mali cutanei può anche darvi motivo: nulladimeno non è pericolosa quando non si getta sopra le parti interne. Il dolore, che muta luogo, ci assicura di tale accidente.

I rimedj generali, come la cavata del sangue, l' emetico, e i purganti, sono talvolta necessari; ma non lo sono sempre: se ne dee regolare la prescrizione sopra la violenza del dolore, il grado della febbre, e lo stato delle prime vie; ma si fa grand' uso degli allentanti, degli addolcenti, e dei bechici: vi giovano i legieri diaforetici: sono talora indispensabili gl' ipnotici; se ne sono sperimentati ottimi effetti, quando si sono fatti precedere i rimedj generali: i topici rilassanti, e i calmanti, come il grasso umano, l' olio di vermi, l' unguento d' altea la canfora, il *populeum*, il balsamo tranquillo, le fomenta, e i cataplasmi emollienti, ne' quali si fa entrare il sapone, ec. posson essere in questo luogo d' una grand' efficacia, e talora sono i soli rimedj, ai quali si ricorra: finalmente i vescicanti applicati sopra la stessa parte, o alle spalle, posson produrre-

durre una vantaggiosa revulsione. Ognun sa, che dannosi altri dolori di lato abituali, che nascono dall'adesione del polmone, e da altri sconcerti del petto, che non appartengono perciò a questo Articolo.

NEFRITIDE SPURIA.

E' questo un dolore reumatico dei lombi, che verisimilmente ha la sua sede nella forte aponeurosi abbracciante i muscoli esteriori di questa parte. Questo dolore, che non è sempre congiunto colla febbre, s' aumenta col moto, e colla pressione; e una tal circostanza lo distingue bastantemente da quello, che occupa i reni, e gli ureteri. La nefritide spuria (*lumbago*) non è da temersi; ma dura alcuna volta lungo tempo, specialmente nei vecchi: ha spesso la sua sorgente nella soppressione menstruale, ed emorroidale, nell'esercizio violento, al quale s'espongono molti giovani, ec.

Con frequenza vi si rende necessaria la cavata del sangue; ma il punto principale consiste nel procurare di richiamare l'evacuazioni abituali sopresse: i purganti, e i loro accessori, sono i rimedj, che sembrano più appropriati a questo male: vi si fa anche molto uso degli allentanti, e degli addolcenti, come del brodo lungo di pollo, del siero, delle emulsioni, ec.: vi sono anche stati praticati con riuscita i diaforetici. I linimenti rilassanti, addolcenti, e calmanti, non s'addicono meno al dolore dei lombi, che a quello del petto; e in questo caso v'impieghiamo di più le fregagioni, e le docciature, di pari che lo spirito di vino canforato, ed altri risolventi; ma ciò che forse vantaggia tutt'altra cosa, si è il moto ben regolato, e successivo della parte, unito a molto calore.

Si vede, senza ch'io lo dica, che il dolore dei lombi, sintoma delle febbri, non ha che far punto con quello, di cui ragioniamo; bisogna anche distinguere dalla nefritide spuria un acutissimo dolore di lombi, con impotenza di moto, che investe in un subito, dopo un violento sforzo, o anche raddrizzandosi, quando si è stati curvati in una certa attitudine: questo è un vero sforcimento, che si può guarire sul fatto stesso, ricorrendo al suo luogo la parte logata, come si pratica pel piede; ma io non saprei, per quale fatalità i Cerusici non riescono per lo più in quest'impresa, che si lascia in mano a persone incapaci, e che tuttavia vi

rie-

riescono benissimo con istropicciare gagliardamente la parte unta con olio col polso, o con tutta la mano: io ho fatto fare talvolta questa operazione dalla prima persona, che mi si presentava, e quasi sempre con ottimo evento. I muscoli dell'addome sono parimente sottoposti a dolori reumatici: questo male non è ne anche raro, tuttochè pochissimo conosciuto; imperciocchè ora vien preso per la colica, ora per l'infiammazione dei muscoli dell'addome: è fortuna pertanto che i rimedj, i quali convengono a questi, non son contrarja quelli, de' quali abbiamo parlato.

Faremo anche in questo luogo parola d'una malattia del dorso, che non è considerabile a segno, che meriti un Articolo a parte: è questo un tumore pingue, che appartiene al dorso, o alle spalle, il cui volume s'accosta alcuna volta a quello d'una zucca. Ad-dimandasi *natta*: è questa molle, e senza dolore. Non se ne può guarire, che coll'estirpazione: questa operazione è la stessa che quella, che conviene alle lupe, e io l'ho veduta effettuare colla maggior felicità del mondo.

LE ERNIE.

E' noto, esser queste formate dalla caduta, o dallo slogamento d'una porzione del condotto intestinale, dell'epiploon, della vescica, ec. che forza l'anello dei muscoli del basso ventre, l'arcata crurale, il bellico, e qualunque altra parte dell'addome: tali sono le ernie inguinali, le crurali, le umbilicali, e le ventrali. Si fa ancora, che la prima denominasi *bubonocèle*, quando il budello, e l'epiploon si fermano all'anguinaja; ed *enterocèle*, quando questi calano nello scroto, che diviene talora mostruoso, sendosi veduto giungere fino al ginocchio; ma non è sempre agevole il distinguere, se l'ernia sia intestinale, epiploica, o mista, per non parlare della cistica: tuttavia il tumore formato dall'epiploon è più floscio, e difuguale, e quello del budello più regolare, e elastico; è altresì difficilissimo il giudicare, se il budello, come segue comunemente, è piegato nel sacco ernioso, o se non vi è che una tasca, o un prolungamento delle tuniche dell'intestino, il cui condotto resta libero nella cavità del basso ventre: questa specie d'ernia, che il *Ruiscbio* fu il primo a descriverci, la quale per altro è rarissima, non si manifesta, che nell'aper-

apertura dei cadaveri: uno s'inganna anche sovente rispetto all'ernia crurale, che prendesi per un bubbone, del quale occupa il sito, e ch'è stata perfino talora aperta con danno sommo dei pazienti. Gli sforzi, le cadute, la tosse, le grida, gli sternuti, il parto difficile, ec. sono le cagioni ordinarie dell'ernie. Ognun sa, che si curano con somma facilità nei fanciulli, ma non già negli adulti, e nei vecchi, che per lo più le portano al sepolcro: si è osservato, che l'ernia semplicemente intestinale, è più sottoposta allo strangolamento della complicata: questo accidente è seguito dalla affezione iliaca, e spesso dall'infiammazione, e dalla cancrena, che s'annunziano per mezzo di crudeli dolori, del singhiozzo, dei sudori freddi, dal polso languido, ec.

Quando il paziente nello stato ordinario è corcato sul dorso, fa rientrare agevolmente le parti uscite di luogo; ma se vi è strangolamento, o se il tumore è soverchio voluminoso, vi vuole la mano del Cerusico, non solo per ricovrare al loro luogo le parti, quando non hanno contratta alcuna adesione, ma eziandio per tenerle dentro il loro luogo per mezzo d'adequata fasciatura: con tutto ciò non è sempre possibile il far rientrare il budello, quando vi ha strangolamento; e talvolta non vi si può riuscire, se non se dopo le cavate di sangue, i lavativi rilascianti, i cataplasmi, e le fomentate emollienti, o i mezzi bagni: si praticano quindi internamente le infusioni vulnerarie, la pitana di consolida maggiore, ec. s'applicano impiastri astringenti, cataplasmi fatti colla radice del sigillo di Salomone, della consolida maggiore, colla farina di fava, ec. Tutti fanno il rimedio sì interno, ch'è esterno del *Priore di Cabrieres*: si sa, ch'è stato famosissimo: s'era buono quando era un mistero, non lo sarà meno presentemente, sendo fatto pubblico; ma la gente non è portata a stimare ciò, che possiede, e sembra, che non siasi occupati, che a cercare rimedj nuovi, lasciando andare in dimenticanza quelli, che saranno sempre di maggior valore.

Quando non riescono i tentativi fatti per ricovrar l'ernia, non vi è altro ripiego, che nell'operazione chirurgica, che esige molti lumi, e grandissima destrezza in chi l'intraprende: ma la riuscita è sempre infelice, se l'intestino è infiammato, o investito da cancrena: vi si dà sovente motivo col mortificarlo con tentativi

forzati, e indiscreti, oppure col ritardarne soverchio l'operazione: si sa, che la buona Chirurgia è provveduta d'ottimi ripieghi contro siffatti accidenti; ma si sa ancora, che pochi quelli sono, che ne sappiano far uso dicevole. La stessa operazione può farsi per guarir l'ernia, tuttochè non vi sia strangolamento, nè altro accidente: la riuscita dipende da una buona cicatrice, che serva, per così esprimerci, di turacciolo all'anello: allora non si fa correre alcun rischio al paziente; dove per lo contrario vi è gran pericolo, quando si pratica per lo strangolamento. Le persone istruite convengono, che l'operazione del bubonocèle è lunghissima, malagevolissima, e sommamente pericolosa: non vi farebb'egli un mezzo di schivare tutti questi inconvenienti con far l'apertura sopra l'anello, o lo strangolamento, e con introdurre dalla parte del basso ventre una tenta scanellata nel sacco ernioso, colla quale s'aprirebbe in un batter d'occhio, e senza pericolo d'intaccar l'intestino? Io propongo di passaggio questa operazione ai Cerusici Anatomici, che sono i soli, che sieno capaci di rilevarne i vantaggi, e gl'inconvenienti.

Dopo le ernie inguinali, e crurali, l'umbilicale, e quelle, che si formano lungo la *linea bianca*, sono le più frequenti: nell'altre parti dell'addome son molto rare. Ognun sa, che si denomina *esonfale* l'ernia umbilicale, che contiene il solo budello; si chiama *epiplonfale* quella, che riceve l'epiploon; e finalmente che si combinano queste denominazioni per le miste. Rara è l'ernia dello stomaco; ma spesso si è veduta questa viscera spinta nel petto. L'ernie ventrali si gonfiano quando si tosse, e si ritiene il respiro: questo segno le fa agevolmente distinguere da ogn'altro tumore: sappiamo pur troppo essere state prese per ascessi talvolta, e che si è avuto anche la temerità d'aprirle. L'*Epiploonfale*, che si fa, essere frequentissima, non è sempre facile a conoscersi, perchè d'ordinario contrae adesione, nè forma sovente alcun rilievo; poichè ne scuopriamo continuo aprendo cadaveri, sopra i quali non si aveva avuto il menomo sospetto di ciò. Importa moltissimo il sapere, rispetto all'*epiplonfale*, che trovasi spesso il colon, e il fondo dello stomaco strascinati verso il bellico, e l'epiploon scirroso; che risultano da questi accidenti stiramenti dolorosi, e mali di stomaco, che si riferiscono a cagioni immaginarie, contro i quali si esau-

risco-

risciono inutilmente tutti i compensi della Farmacia. L'ernie ventrali, tuttochè meno pericolose, sono le più difficili a ritenere: radissime volte son sottoposte a strangolamento, e in questo caso vogliono l'operazione Chirurgica, le cui riuscite sono incertissime: le donne, che hanno fatto molti figliuoli, o che hanno avuto parti difficili, vi vanno soggette più, che ogni altro.

L'ernia della vescica, che viene non meno agli uomini, che alle donne con più frequenza di quello altri pensì, nei primi può assomigliarsi all'idrocele; ma è facilissimo il distinguerla dal medesimo premendone il tumore, che si fa sparire nel solo caso dell'ernia della vescica: e varj pazienti ammaestrati dalla propria loro esperienza, non orinano, se non per mezzo di questa pressione: ma quest'ernia sovente è complicata, nè si giunge a conoscerla, se non col combinare i segni dell'una, e dell'altra: si è anche osservato, come la vescica era stata strascinata dalla caduta della vagina, n'è difficile, sendone pervenuti, l'accorgersene. Il *Barzolino*, ed altri dopo di lui, hanno parlato di pietre trovate in questa porzione della vescica slogata, lo che non ha in sè niente di sorprendente: importa, che si sappia, come l'ernia della vescica contrae sempre delle adesioni, che rendono impossibile il suo ricovramento: si troverà nel secondo volume dell'Accademia di Chirurgia un'ottima Memoria intorno a tal materia. L'ernia della matrice non segue, che a motivo della gravidanza, nè s'assomiglia in verun conto a quella di cui parliamo: è agevolissimo il ricoverarla, e il ritenerla: tuttavia è accaduto di non potersene render padroni, e d'essere stati forzati, per liberar la donna, d'appigliarsi all'operazione cesarea, che in questa circostanza non è di malagevole effettuazione. Finalmente giova il non ignorare, che lo stomaco, il colon, la milza, ec. possono parimente col loro slogamento dar occasione a delle ernie; che i fori ovularj, che le incavature sciatiche, sono state talvolta forzate dagli intestini; ma sì rari sono tutti questi casi, ch'è superfluo il fermarci sopra.

Dobbiamo altresì riferire a questo Articolo l'ernia spuria umbilicale, che addimandasi *Idronfale*, perchè contiene sola acqua: questo tumore ha una specie di trasparenza, e vi son molto soggetti i fanciulli; può venire agli adulti in conseguenza dell'ascite; e allora l'acqua,

acqua, che contiene, comunica colla massa rinchiusa nel basso ventre: questo tumore dà talvolta motivo a una distensione così grande degl' integumenti, che giungono a lacerarsi, dal che risulta uno scolo, che può asciugare tutta l' acqua della cavità grande: quindi è molto dicevole, per uniformarsi all' operazione della natura, il far la puntura sopra questo tumore, quando si giudica necessaria. Sonosi anche osservati sul bellico simili tumori pieni d' aria; ma questo caso è assai più raro.

Debbo finalmente parlare in questo luogo d' una malattia non conosciuta, che si può denominare *Ipogastrocele*: è questo un tumor generale del basso ventre, promosso dalla depravazione della sostanza grassa, che acquista uno straordinario volume, e una durezza, che sembra scirroso. Questa grossezza del ventre, i cui avanzamenti sono assai lenti, diviene dolorosissima, e dà motivo alla febbre lenta. Gl' integumenti, malgrado la loro sorprendente fessezza, eccedono il circuito del basso ventre, o si ripiegano, calando a foggia di gozzo sopra le cosce. Quella prodigiosa quantità di grasso, che s' unisce sul basso ventre, par che ne esaurisca le altre parti, che insensibilmente s' asciugano, e disseccansi: certamente ciò avvenne a una donna, che mi somministrò la materia di questa osservazione, la quale morì nel marasmo. Nell' aprire il costei cadavere si trovò, oltre il fisso e grosso volume del corpo pingue, che in alcuni luoghi eccedeva la grossezza di sei polsi, si trovò, io dico, un epiploonale sommamente aderente, ma che si era già rilevato; degli stivamenti scirroso; delle suppurazioni, e delle putrefazioni nella maggior parte delle viscere del basso ventre; sconcerti, che si erano sospettati, ma che non si erano potuti curare. Dovrei parlare in questo luogo dei rimedj, che furono adoperati in tale occasione; ma la loro poca riuscita, fa sì, ch' io non mi fermi sopra: terminerò questo articolo con osservare, che *Amato Lusitano* parla d' un tumore carnosio, com' ei s' esprime, il quale, dall' anguinaja, donde traeva la sua origine, calava sopra le cosce, e che pesava 25. libbre: sembra, che abbiavi qualche somiglianza fra questa malattia, e la da me descritta; ma la poco circostanziata relazione lasciataci da questo Scrittore non ci permette il deciderlo.

MALATTIE DELLE PARTI GENITALI.

L'infiammazione del *prepuzio* vien denominata *simosi*, se questo prolungamento della pelle abbraccia la glande in guisa, che non si possa scoprire; e *parasimosi*, quando lo strangolamento è sotto a quella parte, che resta nuda: nell'uno, e nell'altro caso si formano sopra il prepuzio infiammato dei tubercoli, o vesciche, quali appunto si osservano dopo le scottature, o i vescicanti: queste vesciche sono state chiamate *tumori cristallini*. L'infiammazione del prepuzio il più delle volte è un accidente dei mali venerei; ma viene talvolta dalla contusione, o dagli sforzi, che fanno *in violento congressu cum virgine defloranda, vel cum cynedis*. La simosi tien celate talora delle ulcere, alle quali è malagevole il rimediare: può questa chiudere l'apertura della glande, ed impedire perciò l'uscita all'orina: non è meno da temere la parasimosi avvegnachè un tale strangolamento possa eccitare la cancrena. Questa flogosi, di pari che le altre, richiede le cavate del sangue, gli allentanti, gli addolcenti, i calmanti, ec. si praticano esternamente cataplasmi, e fomite emollienti, e risolvanti: la midolla di pane sola, o mescolata con i fiori di sambuco, e di camomilla, è la cosa migliore, che possa usarsi: si bagna anche la parte col latte caldo, o coll'acqua tepida: taluni si servono dell'impiastrò di mucilaggine: altri vi applicano quello di *Vigo* mescolato col balsamo del Perù, o coll'olio di guajaco; si lava la glande coperta colla propria orina, ritenendola nel suo passaggio; oppure fanno delle schizzettature col vin caldo, con i decotti vulnerarij, ec. Una tal precauzione può impedire la coesione di queste parti. Quando gli accidenti sono pressanti, ci appigliamo alle scarificazioni, all'apertura per lo lungo del prepuzio, alla circoncisione ordinaria, o a qualunque altra operazione, che possa sbrigliare queste parti. Per le vesciche si pratica lo spirito di vino canforato, dell'acqua di calce col sale ammoniaco, ed altri topici i più atti ad impedire la cancrena, di cui si sa, che le parti genitali d'ambi i sessi sono in estremo suscettibili.

I porri, i porrifichi, i condilomi, e le creste, sono picciole escrescenze note ad ognuno, e che non sono fra esse diverse, che per la figura: sono più, o meno numerose, e comuni a tutt' e due i sessi: queste inva-
stano)

stano la glande , e il prepuzio , e gettano talora una specie di sanie . Si usa portargli via colle cesoje , o colla legatura , quando lo comporta la loro configurazione : si possono anche distruggere coll' allume calcinato , colla polvere di sabina , col precipitato rosso , ec. Si spolvera la parte inumidita prima colla saliva , o s' incorporano coll' unguento basilicon , o con qualsivoglia altro : si pratica altresì l' acqua fagedenica , il butiro d' antimonio infernale , ec. ma siffatti *cateretici* debbono adoperare con cautela . Tuttavia la cura esterna proposta non dee farci trascurare l' interna , allorchè queste escrescenze , come segue il più delle volte , sono un sintoma del malfrancese .

Dobbiamo eziandio parlare in questo luogo d' un tumore indolente dei corpi cavernosi , che addimandasi *nodo* (*nodus*) : questo non si manifesta a dovere , se non nel tempo dell' erezione : e questo una specie d' ernia di questi sacchi , alla quale è quasi impossibile il rimediare : tuttavia se ne può tentar la cura con i topici astringenti : l' impiastro stittico del *Crollio* vi è adattatissimo : ma bisogna portarlo lunghissimo tratto di tempo , e schivare colla maggior cura del mondo tutto ciò , che può eccitare l' erezione , la quale distrugge in un momento tutto il bene , che l' impiastro possa aver fatto in molti giorni .

Le parti genitali d' ambi i sessi son soggette a ulceri similissime a quelle , che infestano la bocca dei bambini , e le mammelle delle nutrici : gli uni , e gli altri sono un sintoma del malfrancese , o il prodotto d' una virulenza recente , che occupa le sole parti esterne : tuttavia veggionsene talvolta , non meno nel prepuzio , che intorno alla glande , che sono mero effetto della sporcizia , e che si dileguano bagnandole , e lavandole col vino caldo . Si chiamano volgarmente *cancro* quei , che vengono da un commercio impuro : ve ne sono dei limitatissimi , e superficiali , il cui fondo è bianchiccio , e che non danno alcun dolore : gli altri sono più profondi , e si stendono di vantaggio , e sono dolorosi : i loro contorni sono infiammati , talvolta duri , o callosi , e gemono una sanie fetente : quando occupano il freno della verga , penetrano alcuna volta fino all' uretra : finalmente vengon talvolta accompagnati da bubboni , e da altri sintomi celtici . Si possono anche collocare in questo luogo gli screpoli (*rhagades* , & *fissure*) co-

muni ad ambi i sessi, che non abbisognano per la loro cura, che d'alcuni adolcenti, come dell'olio d'uova, del grasso di pollo, del sago lavato a dovere, del cerotto di *Galeno*, o di qualunque altra pomata.

Le ulcere superficiali, tanto quelle, che nascono dal non tenersi netto, che quelle che dipendono da un recente, e leggiero attacco virulento, cedono comunemente alle lavande fatte col vino caldo, coll'acqua di Balaruc, o con qualsivoglia altra termale. Se i contorni d'altre sono infiammati, si ricorre alla cavata del sangue, ai cataplasmi, alle fomentate emollienti: quindi si praticano, secondo le circostanze, unguenti suppuranti, dei detergenti, e dei disseccanti: l'allume abbrugiato, la polvere di sabina, l'unguento basilicon col precipitato rosso, fra gli ultimi, sono i più messi in opera. Allorchè non si ritrae da tali rimedj alcun vantaggio, si ricorre all'unguento Napoletano, il più atto a domare la virulenza, che gli conserva, o si espone la parte ai fumi del cinabro. Se le ulcere veneree divengon callose, bisogna toccarle con i *cateretici*, cioè, coll'acqua fagedenica, coll'acqua divina del *Fernelio*, col collirio del *Lanfranco*, col butiro d'antimonio, e colla pietra infernale; ma questa operazione richiede somma prudenza, come quella, che può risvegliare l'infiammazione: si applicano poscia i digestivi, che si replicano secondo il bisogno; e quando è attutato l'irritamento, si fa uso dell'unguento modificativo d'appio, del disseccante rosso, del pontolice, ecc. E' superfluo il dire, che nel tempo di questa medicatura si dee osservare una dieta umettante e rinfrescante, e far uso di tratto in tratto di purganti mercuriali, o d'altri: vi s'impiegano anche con riuscita i sudorifici, per non parlare degli altri antivenerei, ai quali si dee sovente ricorrere.

Si nomina priapismo (*satyriasis*) la tensione delle parti genitali, accompagnata da un'insaziabile smania dell'atto venereo; smania, che arriva talvolta a guastar la mente, ed a far perdere ogni vergogna. Questo morbo, che dallo scagliamento femminile involontario per breve spazio di tempo viene attutato, è comune ad ambi i sessi: non invetta d'ordinario che i giovani, o quei, che sono di caldissimo temperamento: non è di lunga durata, ma è talvolta mortale: i vecchi, i quali peraltro di rado ne vengono attaccati, vi hanno meno

meno da temere ; ma in essi è più ostinato . Il trattenuto libertinaggio , sì di spirito , che di corpo , gli alimenti , e i rimedj stimolanti , e soprattutto le canterelle , sovente lo risvegliano : le ulcere carcinomatose della vescica eccitano un prurito continuo nella verga con frequenti erezioni , che s'assomigliano al priapismo : sono stati trovati perfino ne' cadaveri di coloro , che erano stati i più ardenti , i reni d'una straordinaria grossezza ; le arterie spermatiche doppie , ec. S'investe questa vergognosa infermità colle cavate di sangue , con rinfrescanti , e temperanti d'ogni specie : il latte , il siero , la limonata , l'orzata , le emulsioni , i brodi lunghi di vitella , o di pollastra , le bevande nitrato , ec. sono i più adoprati : i bagni , e i mezzi bagni , sì tiepidi , che freddi , fanno pure gran bene : i calmanti cavati dalla canfora , dal nenufar , e dall'agno casto ; dai granelli di papavero , di lattuga , ec. sono parimente molto stimati : finalmente si schiverà , più che sia possibile , il caldo del letto , e tutte le occasioni , che possono irritare il male .

L'impotenza , che è conseguenza , o effetto dei mali ctonici , dura quanto questi persistono , e si guarisce nel tempo medesimo : quando è effetto del timore , o della prevenzione , si fa cessare , attaccandone l'immaginazione offesa : si può anche rimediare a quella , che si è contratta per l'abuso del vino , e dei piaceri vietati ; ma si reputa incurabile quella , che dipende da un vizio di conformazione negli organi . Il governo ben inteso , la tranquillità di spirito , e il divertimento , sono le principali cose , che possono rimediarvi : il latte , le uova fresche , le gelatine , i colombi , le mandorle , le nocciole , e i pistacchi ; il vino vecchio generoso , la cioccolata , gli aromatici , in una parola , tutto quello , che è atto a ricovrare le forze , concorre efficacemente a questa guarigione . L'uso interno delle canterelle , molto noto ai libertini dissoluti , eccita veramente alcuni moti passeggieri ; ma può essere sommamente nocivo , eccitando l'orina sanguigna , dolori nefritici , ec. e può render la malattia più ostinata : non parlerò della flagellazione , nè di parecchi altri mezzi , che pare non appartengano alla medicina .

La gonorrea è una delle malattie più comuni , e delle meno illustrate : si offre questa con varietà così grande , e la sua origine è talora così occulta , che è

difficile il parlarne con qualche metodo . Io credo , prendendo per guida la sola osservazione , che possiamo riconoscerne quattro specie , vale a dire , la *virulenta interna* , ch'è la più frequente , la *virulenta esterna* , la *semplice* , e la *spuria* ; ma tutte queste specie a riserva della seconda , si uniscono talora fra esse per somiglianze impercettibili , senza contare la loro complicazione , ch'è sovente quasi impossibile il poterle discernere . Finalmente è un male dei più spinosi , che ognuno vuol medicare , tuttochè pochissimi sieno quelli , che ne sono capaci ; e , lo , ch'è anche più triste , questi secondi non si degnano d'abbassarsi a medicarlo .

La *gonorrea virulenta interna* , che non comparisce d'ordinario prima del quarto giorno del commercio impuro , e di rado più tardi del duodecimo , comincia da uno scolo sul principio seroso , che in progresso diviene giallognolo , verdastro , e talora puzzolente : non si può dubitare , che la materia scolante non sia purulenta , poichè malgrado la sua abbondanza , i pazienti possono espellere tanto buon seme , quanto nello stato della loro più perfetta sanità . Questa gonorrea è accompagnata da brugiori , e ardori orinando , che si riferiscono comunemente alla cima della glande ; ma talora si fanno sentire per tutta la lunghezza del canale , ovvero nella radice della verga : l'orina cola stentatamente , ed è anche talora ritenuta : taluni patiscono delle erezioni violente , che rendono molto più acuti i dolori , e fanno curvar la verga : e questo è ciò , che in Francia s'intende per l'*orina calda incordata* . L'infiammazione del prepuzio , i tumori cristallini , e le ulcere fanno talvolta questo male complicato : talvolta sopravviene un'oftalmia : ma l'infiammazione dei testicoli , male noto fra noi sotto la denominazione d'*orina calda caduta nello scroto* , è un caso molto più frequente : questo segue unicamente per la soppressione dello scolo , dopo il moto a cavallo , le iniezioni astringenti , o alcuno stravizzo nel governo : alcuni addimandano questo stato *gonorrea secca* ; ma tale denominazione s'addice più a una *disuria venerea* , la quale , a riserva dello scolo , è accompagnata dalla maggior parte dei sintomi della gonorrea ordinaria , i dolori , i brugiori , e la difficoltà d'orinare facendosi anche in tal caso sentire con violenza maggiore , e più grave : riputandosi il male .

La gonorrea recente, e ben curata si risana facilmente; ma non segue lo stesso dell' invecchiata, la quale è la sola fra tutti i mali celtici, che non piega la testa alle fregagioni, e all' altre cure del malfrancesese. L' orina calda, che ha il suo corso ordinario, o che dura dai venti ai trenta giorni, di rado dà il malfrancesese: ma si dee temere questo morbo, se lo scolo si ferma prima del tempo, o se oltrepassa il suo termine: le urine calde antiche, vale a dire, di sei mesi, e più, son sempremai ostinate: talvolta altri le porta tutto il tempo di vita sua, senza molto incomodo; ma possono precipitare nel marasmo. Se le vecchie ulcere del canale, che ne sono la fucina, arrivano a seccarsi, lasciano il più delle volte delle cicatrici, che strangolano il passaggio, e per conseguente formano un ostacolo all' uscita libera delle urine; ostacolo, che vien riferito comunemente a carnosità; ma ci hanno intorno a ciò molto bene disingannato le recenti ispezioni anatomiche: ci hanno queste parimente fatto vedere, che la prostata era la sede ordinaria della gonorrea, e che col tempo il vizio si comunicava non solo alle altre parti dell' uretra, ma eziandio ai vasi, e alle vescichette femminali.

Si comincia il più delle volte la cura della gonorrea virulenta dal cavar sangue; nulladimeno ciò non è sempre necessario. I purganti mercuriali, e altri non son dicevoli, se non dopo che ha dato giù l' infiammazione, cioè, verso il quarto giorno: allora si debbon replicare alcuna volta; ma prima di questo tempo si praticano clisteri emollienti, e addolcenti non solo per ammolliare le parti offese, ma eziandio per tenere il ventre obbediente, e questo è un punto rilevantissimo: sul principio si dee far grand' uso degli allettanti, e dei leggieri aperienti, come del latte, del siero, delle emulsioni, dell' acqua nitrata, delle ptisanne di radice di malva, di nenufar, di dente di cane, e di fragolo: si praticano colla stessa mira talora le acque minerali aperienti, sì fredde, che calde: molti v' impiegano i diaforetici, i vulnerarij, e i detergenti: ma non ci dobbiamo aspettar buoni effetti da questi rimedj, se non dopo che hanno piegato la testa il dolore, e la flogosi: l' acqua di cavoli temperata col latte è uno de' migliori detergenti, che si possano praticare in questa occasione; ma poche persone sono ca-

pacì di darla a tempo , e luogo , e di condurla a dovere : siamo spesso forzati per calmare i fieri dolori a ricorrere al laudano , al diacodio , alla tintura anodina , alle pillole di cinoglossa , e ad altri ipnotici ; ma ci vuol prudenza grande nell'amministrazione di questi rimedj : la canfora è un calmante meno pericoloso , e il cui effetto è di maggior durata , tuttochè meno sensibile.

Quando coll' uso dei rimedj proposti sonosi dileguati tutti gli accidenti , e che lo scolo non meno per la sua durata , che per la sua abbondanza , è stato tale , che si debba distruggere , possiamo operare per consolidar la piaga coll' uso del balsamo del Copahù , di quello del Canada , della trementina di Scio , e d' altri balsamici : è anche permesso il servirsi in alcuni casi del sangue di drago , dell' allume , del cascìu , e d' altri astringenti ; ma tutti questi rimedj debbon darli con grandissima riserva : abbiamo manco da temere delle acque di Forges , di Passy , e d' altre ferrate : sonosi veduti buoni effetti dal rimedio proposto da M. Garidel nella sua istoria delle piante , all' articolo del *cisto* : v' entra l' ipocisti , la gomma di guajaco , la cocciniglia , e le canterelle : questo è atto a fermare lo scolo più ostinato delle gonorree , per le quali sonosi tentati indarno gli altri rimedj tutti : il darlo in altre circostanza sarebbe pericoloso . Per la gonorrea recente si può rimediare alle erezioni dolorose , fomentando le parti col latte , o coll' acqua fredda : si fanno prendere i mezzi bagni per la ritenzione d' orina : pel caso medesimo si schizzetta del latte , dell' olio di mandorla dolce , dell' acqua di malva , di seme di lino , ec. Quando sono calmati gli accidenti , e che la materia è perfettamente bianca , si praticano iniezioni colla panacea , o col mercurio dolce , nell' acqua comune , o nell' acqua di piantaggine : si usano nella guisa stessa l' acque di Balaruc , quelle di Bageres , ed altre termali : ultimamente si può dar mano alle iniezioni astringenti , quando tutto è stato provato .

I vantaggi , che posson procurare tutti i da noi proposti rimedj contro la gonorrea , sono molto inferiori a quelli , che ci dobbiamo promettere dalle fregagioni mercuriali : fanno queste ogni tre , o quattro giorni con circa un grosso di pomata ordinaria : per lo più bastano tre , o quattro , e al più sei fregagioni , o una-
zio-

zioni . Abbiamo detto , come le gonorree invecchiate lasciavano delle cicatrici , che strangolavano questo canale : vi si rimedia , dopo aver fatto precedere tutti i rilassanti interni , ed esterni con introdurre delle candelette graduate , oppure delle tente di piombo di varj calibri , che a poco a poco ne dilunghino i piccoli strati : le iniezioni oleose agevolano grandemente una tale operazione . Si preparano eziandio delle candelette con alcuni unguenti suppurativi , o cateterici colla mira di squagliare le parti per lo più stirate , che formano l'ostacolo : vi sono varie maniere di comporle : ogni chirurgo ha la sua , che , come è naturale , giudica migliore di tutte le altre : una cosa essenziale da osservarsi in questa cura si è il tenere per lungo tempo il canale dilatato , affinchè le nuove cicatrici non cagionino più strangolamento . E' poi quasi inutile il proporre rimedj contro la gonorrea secca , perchè si offrono naturalmente : allora non vi è alcuno , che non pensi alle cavate di sangue , agli allentanti , agli adolcenti , e ai calmanti , di pari che ai mezzi bagni , alle fomentate , alle iniezioni , ed ai clisteri .

La gonorrea virulenta esterna ha la sua sede fra le glandule , e il prepuzio : vi si producono flogosi , e ulcere , dalle quali scola la materia in picciola quantità , ma molto copiosamente colla pressione ; l' uretra non ne dà una stilla . Questo male apparentemente leggiero , trascurato , può produrre effetti funesti : vuole a un di presso la cura stessa , a riserva delle iniezioni nell' uretra , e d' altre cose relative alle orine , il cui corso in questa non è impedito : si fa grand' uso in questa gonorrea delle lavande vulnerarie , e detergenti ; e può bastarvi il semplice vino caldo : viene questa talora in conseguenza della precedente , cioè , quando la materia , che scola per l' uretra , è in parte fermata nel passaggio della fimosi , o dalla conformazione naturale del prepuzio , e vi cagiona col suo starvi ferma lo sconcerto divisato : si può provvedere a questo accidente , ed impedirlo con fomento , e cataplasmi emollienti , i quali , rilasciando queste parti , permettano di scuoprire le glande , e di lavarla con appropriati liquori : se non vi si può riuscire , ci contentiamo di fare delle iniezioni atte a detergere , e disseccare le parti esulcerate .

La gonorrea semplice è prodotta dallo scolo del seme ; non è accompagnata da alcun dolore , nè dipen-

de da commercio venereo : la materia , che scola , è bianca , e per lo più meno abbondante , che nella virulenta : scola questa ora prima , ora dopo l' orina , oppure insieme con essa ; ora quando altri si scarica il ventre , quando si prende un lavativo , e talora in ogni tempo : può nascere da ripienezza , rispetto a chi vive nel celibato , e nell' abbondanza , massime se si divertano in letture , e in pensieri lascivi : in quel caso dà poco da temere : ma se nasce da rilassamento degli organi , come segue talora nelle persone deboli , e di temperamento flemmatico ; se dipende da un vizio del liquore seminale , lo che non è raro nei cachetici , e negli scorbutici , ella è più pericolosa , perchè colla sua durata può precipitare nello spoffamento , e nel marasmo : non è meno da temersi , quando è una conseguenza delle polluzioni , sì notturne , che volontarie , o della gonorrea virulenta , che abbia alterato questi organi : quella finalmente , che non dipende da alcun vizio , nè del sangue , nè delle parti destinate a ritenere il seme , si cura agevolissimamente : le altre sono in estremo ostinate . La cavate del sangue nella cura di questo male di rado è necessaria , anche nel suo principio : vi sono per lo contrario utilissimi i purganti , e i più praticati sono il rabarbaro , la magnesia : s' impiegano utilmente , quando non vi si oppone il temperamento , i rinfrescanti , i temperanti , come il siero , il latte , l' emulsioni , la limonata , i nitrati , la canfora , ec. Alcune circostanze vogliono i depuranti , gli antiscorbutici , i vulnerarij , i diaforetici , ec. si fa uso parimente in questo luogo , come nella gonorrea virulenta , dei balsamici , e dei fortificanti : tali sono i balsami del Copahù , e del Canada , le trementine , le rose rosse , e i balausti , la china , il sangue di drago , i marziali , le acque minerali , le ferrate , ec. I topici astringenti non pare che facciano grande effetto ; tuttavia vi si può ricorrere , come ai bagni aromatici , e fortificanti , ai bagni freddi , ec.

La gonorrea spuria , il cui scolo non eccita nè calore , nè prurito , è sovente difficilissima a distinguersi dalla precedente ; ma le conseguenze non ne sono le medesime : la semplice , come abbiamo detto , colla sua durata precipita i pazienti nella tabe , perchè lo scolo è spermatico ; per lo contrario si porta lungo tempo la spuria , senza risentirne a mala pena incomodo ,

do , perchè l' umore cola dalla prostata , o dalle parti adjacenti : quella , di cui parliamo , pare che corrisponda al fluor bianco delle donne , ed è di malagevolissima guarigione , come quello . Quando è cagionata dal soverchio uso della birra novella , si guarisce per se stessa in pochi giorni , o coll' ajuto di un poco d' acquavite : è cosa rara , che abbisognino rimedj per questa gonorrea spuria passeggera , o accidentale ; ma ne vuole l' abituale , e dei molto continuati : i temperanti , gli aperienti leggieri , e per fino i sudorifici pare che in questo caso abbiano prodotto ottimi effetti : vi s' addicono anche a maraviglia le acque minerali acidule ; ma non è perpetuamente permesso il servirsi dei balsamici , e gli astringenti , poichè talora si dee considerare questo male , come uno sfogo naturale , che farebbe pericoloso l' asciugare , e in tal caso non si potrebbe farlo con sicurezza , se non se apprendone alcun altro , col cauterio alla gamba ; ma alla maggior parte sembra peggiore il rimedio del male stesso , il quale , come dicemmo dà pochissimo incommodo .

La polluzione involontaria è l' ordinaria conseguenza dei sogni lascivi , e talvolta l' effetto d' aver veduta alcuna bella donna , di cui uno si è acceso : questo incomodo diventa pericoloso , quando è abituale , e se ne guarisce con somma difficoltà . Può questa , come accennammo , degenerare in gonorrea semplice . I giovani , che trasmodatamente s' abbandonano ai piaceri vietati , vi sono più degli altri sottoposti : forz' è proibir loro , non solamente qualsivoglia commercio carnale , ma eziandio la lettura , e i pensieri stessi , che possono coltivare la sozza loro passione ; e far loro osservare una dieta rinfrescante : la canfora , il nenusar , e gli altri rimedj , che s' addicono al priapismo , possono in questo caso prescriversi , combinandone le circostanze : sonosi sperimentati buoni effetti dal liquore anodino minerale dell' *Ofmanno* : la *bursa pastoris* vien creduto un buon rimedio contro una tale indisposizione : si può anche ritrarre del vantaggio dal cataplasma fatto col vino , e colla pianta di fragole , che si applica alla pube , come altresì dai bagni fortificanti , dai freddi , ec.

Debbo anche in questo luogo far parola dell' emorragia della verga : bisogna distinguerla dall' orina sanguigna , che vien sempre dai reni , o dalla vescica , e ch' è separabile dall' orina ; dove per lo contrario il sangue

gue nel caso , che proponghiamo , sgorga dal canale , e indipendentemente dall' orina . Non bisogna nemmeno confonderla col flusso menstruale , che certi uomini provano per la verga , dall' età della pubertà fino a quei quarant'anni , o cinquanta : questo caso , sebben raro , è confermato da molte osservazioni . Quei , che nel tempo della gonorrea virulenta , non si conservano continenti , quei , che trasmodano nell'atto venereo , o che l'eccitano sozzamente con frequenza in qualunque altro modo , s'espongono all'emorragia della verga : accade talora a questi ultimi in fine del loro stravizzo di sparger sangue in vece di spermar : è noto , che espone all'accidente stesso l'uso delle canarelle , e d'altri stimolanti . Quando questa emorragia va alla lunga , sposta i pazienti , e gli precipita in un abbandono , che può produrre effetti fatali : con frequenza dà motivo ad esulceramenti del canale . Questo sborso di sangue dee curarsi come gli altri ; di più dannosi delle iniezioni nell'uretra col siero inzuccherato , col decotto d'orzo , e collo sciroppo di rose secche , ec.

L'infiammazione dei testicoli , e dello scroto , unita alcuna volta alla ritenzione dell'orina , è d'ordinario l'effetto d'una gonorrea soppressa ; e il volgo allora dice , che lo scolamento caldo è precipitato nella borsella : questa deposizione può anche dipendere dal venereo , dalla cagione ordinaria delle flussioni , da percosse , da gagliarde compressioni , ec. Se ha dato occasione a tal male la gonorrea troncata , svanisce , allorchè è richiamato lo scolo : è questo un fatto comunissimo e noto , del quale però non è così facile il render ragione : tuttavia la guarigione di questo stivamento non dipende assolutamente dalla risfioritura dello scolamento , poichè si dilegua talvolta , benchè la gonorrea resti asciugata . L'epididimo è quasi sempre il primo investito , e l'ultimo a risanarsi : rimane anche gonfio per lungo tempo dopo la guarigione , ma senza alcun dolore . L'infiammazione dei testicoli termina per lo più colla risoluzione ; ma dà talora occasione ad ascessi , ad ulcere fistolose , a scirri , alla cancrena , all'idrocele , al sarcoma , ec. Quella , che è cagionata da contusione , eccita il vomito , le convulsioni , ed altri gravi accidenti . Lo scroto in tutti questi casi agevolmente vien distrutto dalla cancrena : ma si riproduce nello stesso modo in guisa sorprendente ; e veg-

gionfi

gonfi continuamente testicoli nudi , senz' ombra d' irregumenti , ricoprirsi in breve tempo perfettissimamente . Le cavate di sangue non convengono meno a questa infiammazione , che alle altre : vi giovano i purganti , massime allorchè la flussione è il prodotto dello scolamento : vi sono messi in opera i cataplasmi emollienti, e risolventi: i maturanti s' addicono a quella , che dipende da cagione esterna ; ma quando questa flussione appartiene alla gonorrea , si antepone la pietra dei coltellinaj impastata coll' olio , e coll' aceto rosato : vi è chi v' applica le foglie di giusquiamo cotte sotto la cenere: ma un tal topico sembrerà sospetto a coloro, i quali fanno, che queste parti sono sommanente suscettibili della cancrana . Le unzioni mercuriali sopra lo scroto, o sopra le parti adjacenti , sono superiori a qualunque altro rimedio , quando il caso è venereo : si praticano ancora dopo la guarigione, per dileguar la gonfiezza che resta nell' epididimo: s' impiega pure utilissimamente nel caso stesso l' impiastro di vigo, ed i fumi di cinabro : quando vi ha dato motivo la contusione, si servono anche del diabotano , dell' impiastro di cicuta, e d' altri risolventi : i clisteri emollienti, e anodini s' appropriano a tutti i casi : del rimanente è superfluo il dire , che i pazienti debbono starsi in letto, portare un' allacciatura, ed osservare una dicevole dieta.

Si sa , che l' *idrocele* è un tumore infaccato aderente ai testicoli , a' suoi vasi, o ai loro involuppi, e che trovansene di tutte le specie. La fluttuazione , che vi si può sentire, lo distingue quanto basta dagli altri tumori ; ma questo segno non si rileva se non quando è già il tumore avanzato : i suoi principj sono occultissimi , perchè i pazienti non ne provando alcuno incomodo , non se ne accorgono , se non quando il suo volume è più rilevabile : non contiene che serosità , ma questo liquido è talora tinto di sangue . Vi è un' altra specie di tumore acquoso , più comune del precedente , detto da alcuni *idrocele spurio* , il quale non è che uno stivamento edematoso dello scroto: il più delle volte è, o il principio, o la conseguenza dell' idropisia: questa enfiagione si comunica anche alla verga , che può mostruosamente ingrossarsi, con una fimosi , o perafimosi che molestanto i pazienti . Quelli , che a un tempo stesso sono investiti dall' ascite, e dall' ernia, sono
 parti-

parimente soggetti a una specie d'idrocele , di cui è la sede il sacco ernioso , che comunica colla cavità del basso ventre : si evacua facilmente con far rientrar l'acqua nella capacità dell' addome : a questo solo segno congiunto a quei dell' ascite , e dell' ernia , è facilissimo il conoscerlo : bisogna intorno a tal proposito ricordarsi , che si evacua colla facilità stessa l'ernia della vescica ; ma l'orina , che una tal compressione fa allora colar per la verga , è una circostanza , che appartiene soltanto a questa seconda , e che la distingue ottimamente dall'altra .

Il vero idrocele può essere investito , non meno con i rimedj interni , che con i topici , quando è recente : tali sono , fra i primi , i purganti , e i diuretici ; e fra i secondi , i risolventi , gli squaglianti , e i discuzienti ; ma gli uni , e gli altri giovano pochissimo , allorchè l'idrocele trovasi alquanto inoltrato : allora s'aspetta , che il tumore col suo volume diventi molesto , per determinarsi alla puntura : tuttavia è un rimedio puramente palliativo ; imperciocchè non può ottenersi una cura radicale , se non se portando via il sacco coll'operazione Chirurgica , o con distruggerlo con gli scarotici : questi due metodi sono estremamente dolorosi , e incertissima ne è la riuscita . L'idrocele spurio , o sia lo stivamento edematoso della borsa , richiede intieramente gli stessi rimedj , che l'idropisia , di cui è d'ordinario un sintoma : s'investe anche esternamente con dei risolventi , e con dei fortificanti , come colle fomentate col vino aromatico , collo spirito di vino , coll'acqua di calcina , colla rannata di cenere di fermenti , d'assenzio , ec. col cataplasma col vino , fatto coll'eupatore d'*Avicenna* , coll'agrimonia , e con altri di questa natura : è riputata eziandio la polvere di sal marino decrepitato , e racchiusa in una pezza chiara , che si cambia , quando ha contratto dell'umidità . Questo stivamento edematoso , talvolta estremo , ci forza a ricorrere alle scarificazioni , per evacuare non meno la verga , che lo scroto ; ma questa operazione può esser seguita dalla cancrena : in tal caso si procura di difendersene fomentando con frequenza la parte coll'acquavite canforata , o con applicarvi la china-china , che si fa essere attissima ad impedire la mortificazione dello scroto : il setone piantato nella parte inferiore della borsa , può anche evacuare e diradar queste parti , e forse con minor pericolo .

L'*ernia ventosa* (*pneumatocele*) è un tumore flutuoso d'uno dei lati dello scroto, a cui vanno grandemente soggetti i fanciulli, ma che è raro negli adulti: ha questo una specie di trasparenza: nulladimeno può essertalora difficilissimo il distinguerlo dall'uno, e dall'altro idrocele, se non si sapeffe, che il *pneumatocele* viene in brevissimo spazio di tempo, e che gli altri si formano lentissimamente. Non è pericoloso, e si dilegua agevolissimamente con i rimedj, che convengono, non meno alla colica ventosa, che all'idrocele: le fomite risolventi, e i cataplasmi della stessa natura, vi sono utilissimi: la farina di comino, e lo sterco di vacca, sono le materie, che sovente sonosi anteposte a tutt'altro rimedio; la puntura è stata parimente usata, ma è cosa rara l'avervi a ricorrere.

Il *varicocele* ha la sua sede nel cordone spermatico; vi si sentono in toccandolo delle disuguaglianze, comunemente in forma di grappoli, che non sono, a ciò, che comparisce, se non gonfiezze varicose delle vene: è raro, che questo stivamento si termini nell'anello del basso ventre: con gran frequenza si stende nella sua capacità; e una tal circostanza rende il male sommamente reo, e quasi incurabile. Il *varicocele* è più, o meno doloroso, e può farsi carcinomatoso: vi danno occasione le contusioni, può esserne anche la cagione il celibato: è anche talora un prodotto del malfranzese, dell'affezione scorbutica, ec. Dopo i rimedj generali, si pongono in opera gli allentanti, i temperanti, gli aperienti, gl'incisivi, e gli antiscorbutici: tali sono i cicoracei, il crescione, i centogambe, i marziali, le preparazioni mercuriali, ec. Si sciaguatta la parte coll'acqua fredda, vi s'applicano cataplasmi, e fomite astringenti; ma per lo più tutti questi rimedj vanno a vuoto, nè si ha riparo se non se nell'estirpazione del tumore, e del testicolo: questa operazione però è sommamente pericolosa, e perpetuamente infruttuosa, quando il male si stende nella capacità del ventre.

Si denomina *sarcocoele*, non meno lo stivamento scirroso del testicolo, che l'escrescenze aderenti a quest'organo, o ai suoi inviluppi: sul principio il *sarcocoele* è poco doloroso; ma diviene tale col suo accrescimento, e prende anche talora, come il precedente, un carattere canceroso: i suoi progressi sono lentissimi, e quasi insensibili: la sua durata, e la sua forma distinguono lo basteran-

stantemente dalle malattie, che hanno la stessa sede: nasce, di pari che il varicocele, dalle contusioni, o da un vizio degli umori, o celtico o scrofoloso. Quando è recente, si può anche sperare di guarirlo, ma s'è di vecchia data, se rimonta nel basso ventre, tutti i tentativi riusciranno infruttuosi. Si fa uso internamente, dopo i rimedj generali, dei da noi proposti per le scrofole, come, aperienti, sudorifici, incisivi, ec. s'applica sul tumore l'impiaastro di cicuta, quello de *vanis cum mercurio*, ed altri squaglianti: l'estirpazione, ed i caustici n'offrono finalmente un ripiego, ma perpetuamente pericolosissimo: nell'operazione si procura di conservare i testicoli; ma la dissezione, che in tal caso siamo forzati a fare, con frequenza è seguita da mortali convulsioni, e singolarmente dal *Tetanos*, come ho io stesso veduto accadere, e com'è stato da altri osservato; lo che rende necessaria la castrazione, quando il sarcoma è aderente al corpo del testicolo. Più lunga, e dolorosissima si è la cura col caustico, oltre l'esporsi, ch'ella fa il paziente ai più orribili accidenti, di modo che l'appigliarvisi è lo stesso che prendere un cattivo partito.

MALATTIE DELL'ANO.

I mali più comuni di questa parte sono le *emorroidi*: le vene dello stesso nome, sì interne, ch'esterne, ne sono la sede: questi tumori varicosi, talora in buon numero, sono più, o meno sensibili, secondo il loro grado di tensione, e in alcune circostanze fanno soffrire un vero martirio, massime quando si restituiscono escrementi induriti: l'esterne si rilevano coll'occhio, ma le interne si manifestano al solo tatto. L'emorroidi gonfiate son livide, o nericce: si sente quanto basta la fluttuazione del liquido contenutovi: varia la loro grossezza da quella d'un pisello a quella d'un uovo, lo che dee si intendere delle sole esterne. Eccitano le emorroidi con frequenza grandissimo prurito: si crede perfino, che possano divenire volatiles: questo prurito non deve confondersi con quello, ch'è cagionato dalle ascaridi, vermi, dei quali parlammo altrove: vi si sentono ancora delle pulsazioni, delle punture, del peso, ec. I melancolici, quei che stanno per lungo tempo a cavallo, che hanno il ventre insingardo, che fanno uso di liquori spiritosi; finalmente quelli, che nella loro gio-

gioventù hanno avuto frequenti emorragie, vi sono più degli altri soggetti: i bagnicaldi, la gravidanza, i parti difficili, ec. vi possono parimente dar motivo. L' emorroidi semplicemente tumefatte, non son pericolose; ma le infiammate, oltre gli acutissimi dolori, che cagionano, posson risvegliare una febbre violenta, l' affezione iliaca, il delirio, le convulsioni, l' apoplessia, ec. Vi si formano anche degli ascessi, che possono degenerare in ostinate fistole, degli scirri, che divengono talora cancerosi, per non parlare della cancrena, dalla quale son queste parti perpetuamente minacciate: ci fa vedere l' ispezione anatomica, che questa flogosi, come la cancrena, si comunica alle budella, al mesenterio, e all' altre parti interne.

Le cavate di sangue, sì dal braccio, che dal piede, sono indispensabili, quando le emorroidi sono sommarmente dolorose, e infiammate: il numero di queste dee esser regolato dagli accidenti: ne' casi estremi è perfino riuscito il cavar sangue fino al deliquio. I lassativi più miti, come l' olio di mandorle dolci, o la cassia nel siero, fanno gran bene: si praticano assai gli allentanti, gli addolcenti, e i temperanti, come il siero, il brodo lungo di pollastra, l' emulsioni; i brodi rinfrescativi di vitello, di gamberi, ec. lo zafferano di marte, l' etiope minerale, e altri aperienti, si praticano pure con felice riuscita, allorchè si è procurato qualche rilasciamento in queste parti: l' uso interno, ed esterno dello zolfo, in queste circostanze ha fatto grandissimo bene: necessarissimi son pure talora gl' ipnotici; ma bisogna evitar l' abuso, che ne fanno coloro, i quali al letto degl' infermi non hanno l' occhio, che sul momento presente. Di grande ajuto sono altresì i rimedj esterni: si fa uso dei vapori, non meno dell' acqua calda, che del decotto di brodo bianco, o di qualsivoglia altra pianta emolliente; delle fumigazioni fatte colla polvere di scrofolaria: delle fomenta, e delle iniezioni preparate col latte, col decotto di fichi, o con qualunque altro emolliente: si applicano cataplasmi anodini, come la midolla di pane, la polpa di mella cotta, ec. quei, che si preparano con i fiori di camomilla, quelli di sambuco, ed altri risolvendi, dopo i rilascianti, hanno somma efficacia. Si fa parimente uso del vino caldo, col quale si lavano spesso l' emorroidi dolorose: questo rimedio, oltre il vantaggio, che uno ha di pro-

curar

curarselo sul fatto, è uno dei topici migliori. I lini-
menti addolcenti, e calmanti, i più praticati, che si usa-
no pure in schizzettando per le emorroidi interne, sono
l'olio d'uova, quello di lino, la crema di latte, l'un-
guento populeo, il nutrito, ec. ai quali si unisce talvol-
ta la canfora, l'oppio, il sale di Saturno, ec. L'unquen-
to napoletano in questo caso è uno dei migliori risolven-
ti, che si possano mettere in opera, ed io ho soventee
veduto, che questo rimedio è bastato per tutti: si tocca-
no pure l'emorroidi coll'olio di busso: vi s'applicano
le foglie fresche di tabacco pestate: molti hanno sperim-
mentato del giovamento col farsi colare sopra le emor-
roidi alquante goccioline di sugo di cedro cotto sotto la
cenere: questo rimedio si replica più fiate: è somma-
mente cuocente; ma la calma, che in brev' ora si spe-
rimenta, compensa i brevi dolori, che vi eccita. Tutti
questi topici però non procurano sempre il sollievo, che
ci dovremmo promettere; e bene spesso non si giunge a
far dar giù l'emorroidi, se non se applicandovi le mi-
gnatte, o aprendole colla lancetta. Talora vien preso il
partito d'estirparle, allorchè sono numerose, lasciandoe-
ne una, o due che servano di sfogo. Finalmente uno
dei gran punti di questa cura consiste nel conservare il
corpo obbediente, non meno con i lassativi, e la diet-
ta rinfrescante, che con i lavativi, quando dallo stato
delle emorroidi ci vien permesso il praticargli.

Il *flusso emorroidale*, per cui si rende il sangue puro
è d'ordinario periodico, e salutare: è facilissimo il dis-
tinguerlo dalla dissenteria comune, ma talvolta si con-
fonde, quando è leggiero, e quotidiano, da una spe-
cie di dissenteria scorbutica, in cui si rendono soli
mucchi, più, o meno tinti: per altro in questa secon-
da il sangue è mescolato con g'i escrementi, dove per-
lo contrario nel flusso emorroidale, scola prima, o do-
po: prendesi anche talora pel flusso epatico; ma l'aspet-
to delle materie più sciolte, e stemperate in questo, uni-
to agli altri segni di questo morbo, può farci schivar
l'errore. Si considera il flusso emorroidale come trasmo-
dato, s'è soverchio abbondante, se dura troppo tem-
po, o se torna frequentemente: talvolta è stato reso fi-
no al volume di due libbre il giorno. Non essendo co-
sì copioso, può durare quei venti, e anche trenta giorni
se dura meno, può rifiorire ogni quindici giorni, ogni
settimana, ec. finalmente alcuna volta è continuo
que-

questo sborso di sangue nelle femmine, nelle quali accade in vece dei mestrui, d'ordinario è più considerabile. Il flusso eccessivo viene annunziato dal dolor di schiena, e singolarmente dell'osso sacro; da dolori colici, da vertigini, da un calore interno; dalla febbre, dall'intorpidimento delle gambe, ec. Vien poi seguito dall'abbandonamento, dal color cedrino della faccia, dalla cachessia, ec. I melancolici, e i sanguigni; quei, che menano una vita molle, e sedentaria, e quei, che hanno il ventre infingardo, vi sono più esposti: può anche darvi motivo il cavalcare. Non investe i giovani, qualora non abbian contratto questa disposizione dai genitori: in tal circostanza si è veduto principiare sull'età di sette in ott'anni, e durare per tutta la vita. Il flusso emoroidale, fra tutti gli sborsi di sangue, è quello che si sopporta meglio, e che dà manco da temere: vi sono persone, che rendono due, e tre once di sangue ogni giorno, e soffrono senza il menomo incomodo una tale evacuazione per lunghissimo tratto di tempo: si fa menzione d'un uomo, il quale per lo spazio di quattro anni, ne perdeva ogni giorno una libbra in circa, senza che ne comparisse intaccata la sua sanità: sonosi vedute delle donne, che hanno evacuato per la strada medesima quelle venti, e anche venticinque libbre di sangue, senza che sia loro avvenuto alcun male: la soppressione per lo contrario, siccome vedremo in breve, può cagionare i più rei accidenti. Nulladimeno il flusso eccessivo, durando lungamente, può precipitare nello spoffamento, nella febbre lenta, nella tischezza, nella cachessia, e nell'idropisia: sovente vien conservato dallo stivamento delle viscere del basso ventre, e singolarmente del fegato: questo ce lo ha additato l'apertura dei cadaveri.

Si medica il flusso emoroidale eccessivo a un di presso come gli altri sborsi di sangue. Le cavate di sangue dal braccio in questo caso sono le più dicevoli: si fa grand'uso dei rinfrescanti, e dei temperanti, come delle ptisane nitate, del siero, delle emulsioni, delle creme d'orzo, o di riso, del latte, ec. Vien da alcuni vantato in queste occasioni l'uso della pimpinella: ma non farebb'egli un rimasuglio dei pregiudizj dei nostri antichi? Si stimano con più ragione le acque minerali, sì acidule, che ferrate, i marziali, ec. Bisogna amministrar con riserva la tintura di rose, la ptisana di con-

solida, il sugo d'ortica, e soprattutto il cascìu, il sangue di drago, l'allume, l'essenza di Rabel, e altri astringenti. Il rabarbaro, la cassia, e i tamarindi sono i lassativi, che si possono impiegare con maggior sicurezza: i calmanti, come la canfora, il liquore anodino minerale, ed anche lo zafferano, di cui ne vien fatto un uso contrario, par, che molto s'addicano a questo stato: non si teme nemmeno il diacodio, la tintura anodina, e gli altri ipnotici. I topici astringenti, e stitici, tanto per iniezione, e per fomenta, che per cataplasma, il linimento e la supposta, non vi si debbono impiegare, che leggermente, e soltanto nei casi estremi, o quando si teme la sincope: il sugo di piantaggine, e di bursa pastoris, la bifforta, il bolo Armeno, il sangue di drago, la sarcocolla, ec. sono i più usati; si può con minor pericolo tener in molle le mani nell'acqua calda, far delle legature, e delle frugazioni all'estremità superiori, ec.

Se il flusso emorroidale periodico, è, come dicemmo, salutare, è naturalissimò il giudicare, che la soppressione dee essere uno stato pericoloso, e che può avere triste conseguenze, a motivo dello stivamento della vena porta, e d'altri vasi, come le dissezioni anatomiche lo manifestano alla giornata. I mali, dai quali allora uno è minacciato sono in numero così grande, che ributta il farne una compita enumerazione: mi contenterò di noverar quelli, che si veggon seguire con frequenza: tali sono le vertigini, l'apoplessia, e la paralisi, l'asma, il catarro soffogativo, l'affezione ipocondriaca, e le ansietà, la nefritide, il pisciar sangue, la cachessia, e l'idropisia, la gotta, ec. ec. Gli spropositi nella dieta, il terrore, il freddo improvviso, l'uso degli astringenti, ec. ne sono le ordinarie cagioni; e a soppressione, che ne dipende, è sempre più da temersi di quella, che nasce senza cagione manifesta, o per la sola disposizione degli umori, e degli organi. Ciò, che abbiain detto, riguarda soltanto il flusso emorroidale abituale, che diviene uno sfogo necessario; e in questo solo caso si dee procurare di richiamarlo, non meno con i rimedj interni, che con gli esterni: per tale effetto è adattatissimo il cavar sangue dal piede: posson far gran bene i temperanti, gli aperienti, gli amari, e gli emmenagoghi, fra i quali la scolopendra, e il fumosterno sono stati i più praticati: i pur-

ganti

ganti stimolanti, come l' aloe, la coloquintida, e altri di questa natura, sono in questo luogo d' un uso familiarissimo; ma dannosi delle circostanze, che non permettono il farne uso, e allora ci attenghiamo ai purganti meno irritanti. Quando i rimedj interni non producono alcuno effetto, si ricorre alle mignate, e alle coppette a taglio: si stropicciano anche l' emoroidi con una pezza di tela ruvida, o colle foglie di fico: finalmente si fa uso dei lavativi, e delle supposte, ove entrano la coloquintida, e gli altri stimolanti; ma con frequenza la natura fa per se sola quello, che non si è potuto ottenere con tutti gli ajuti della Medicina.

I vasi emoroidali sì interni, che esterni possono anche somministrare una muccosità bianchiccia, più, o meno consistente, ed acre. Questo scolo, o trasudamento, addimandano *emoroidi bianche* (*mucus, vel sudor hemorrhoidalis*): la materia, che viene dai vasi interni par, che sia più fissa, e peravventura perchè soggiorna nell' intestino retto: quella, che trasuda dalle emoroidi esterne, è più sciolta, e si presenta a foggia di sudore: l' una, e l' altra a motivo di sua acrimonia eccitano pizzicori molestissimi, il renesmo, escoriazioni, flogosi, e perfino la fistola. Questo male sommamente patente, tuttochè con frequenza ignorato, è per lo più accompagnato da una sensazione di peso ai lombi, da debolezza alle gambe; da freddo ai piedi, da frequenti delezioni, e spesso verminose: vi vanno molto soggetti i melancolici, e i cachetici: la vita sedentaria, e la buona tavola; il vino, e le donne posson darvi motivo. Di pari il flusso emoroidale ordinario può preservare da molte infermità, le quali si manifestan pur troppo, quando n' è stata precipitata la guarigione: i più evidenti sono l' enfiagione delle gambe, e l' idropisia: ma in tal caso il petto, e il basso ventre vengono minacciati da più orridi malori. Si può tuttavia guarire dalle emoroidi bianche, senza far correr gran rischio ai pazienti, investendone la sua cagione, qualunque ella siasi: ci ha insegnato l' esperienza, come i lassativi, e i purganti idragoghi vi s' adattano a maraviglia: che un lungo uso dei diuretici, dei diaforetici, e dei depuranti, metteva a coperto d' ogni accidente; che ritraevasi ancora sommo vantaggio dall' acque minerali, sì fredde, che calde; dai marziali, ed altri tonici; ma tutti i divisati rimedj debbon mettersi in opera prudentemen-

te , e per gradi : i lavativi addolcenti , e emollienti ; le iniezioni , e le lavande coll'acqua di malva , ed altre simili , sono accessorj , che non si debbono disprezzare : alcuni hanno investito questo male con i cauterj : ma quando si tratta di sfogo per sfogo , non è egli meglio sottomettersi al primo ?

L'ano è ancora soggetto a escrescenze , alle quali si dà i nomi arbitrarj di *porri* , di *condilomi* , di *fichi* , o di *creste* : questi tubercoli , che si debbon distinguere dalle emorroidi lacere , occupano i contorni dell'ano , e s'alzano principalmente di dentro delle sue grinze : quantunque indolenti , alcuna volta s'infiammano , e divengono dolorosi ; ovvero possono anche degenerare in ulcere cancerose : si è osservato in più cadaveri , che occupavano eziandio le parti interne del retto , e che vi erano talora in così gran numero , che venivano a formare un ostacolo all'uscita degli escrementi : pare , che vi vadano soggetti i melancolici , e gli scorbutici ; ma con più frequenza sono un effetto del celtico . Le *creste* (dette da' nostri antichi *marisca*) sono assai comuni : *numerosa saepius anum cynodorum infestant , a nefando scilicet & praepostero concubitu* : i *porrifichi* , de' quali abbiamo già fatto parola , si accostano molto alla natura di queste escrescenze , e dipendono dalla stessa cagione . Gli unguenti disseccanti , che s'usano con tanta familiarità per questi tubercoli , giovano pochissimo : sonosi veduti però de' buoni effetti da un linimento fatto coll'aceto , e colla cenere di fermenti ; ma ci fa vedere l'esperienza quotidiana , che altri non può liberarsene , che coll'estirpazione , o col caustico : s'investono quei tumori , che sono esposti all'occhio , colla legatura , col bisturi , e colle cesoje ; e questo è il partito , che si prende comunemente ; imperciocchè la cura con i *cateretici* è sempre più lunga , e più dolorosa . E' superfluo il suggerire , che dee combattersi con i rimedj interni la malattia , che gli ha prodotti , o che gli conserva ; e questo è il solo ripiego , che ci resta per quelle escrescenze , che stanziano nelle parti interne dell'intestino retto , le quali sarebbe pericoloso il voler distruggere con iniezioni , o supposte adattate a tale effetto , avvegnachè le parti sane sarebbero di pari esposte alla loro azione ; ma siamo anche trattenuti da far ciò , da una difficoltà assai maggiore , vale a dire , dall'incertezza , che abbiamo della loro esistenza .

La *fistola dell' ano* è la conseguenza del *flemmone or-
dinario*, o delle *emoroidi infiammate* : tuttavia gli ab-
scessi del *deretano* non sempre la producono ; poichè
quando si manifestano sul principio , e che sono uniti
alla *febbre* , e a molto dolore , il più delle volte si
guariscono colla cura ordinaria ; ma se i lor progressi
son lenti , e i dolori ottusi ; finalmente se la *marcia* vi
cova lungo tempo , ci dobbiamo aspettare la *fistola* :
sogliono anche i *Cerusici* così chiamargli , prima che
sieno aperti . La *fistola* , che nasce dal *flemmone* , è più
difficile a curarsi di quella , ch'è la conseguenza delle
emoroidi , e che occupa lo spazio , che giace fra le tu-
niche dell' intestino . Le *fistole* recenti si posson guarire
naturalissimamente , o con i più semplici , ajuti , ed ab-
biamo esempi non pochi di simiglianti guarigioni ; ma
le invecchiate , le profonde , le callose , non piegano la
testa se non all' operazione chirurgica . Quando gli ab-
scessi , e le *fistole* dell' ano dipendono dal *malfrancese* ,
si posson curare colla medicatura di questo morbo ; se
talvolta fanno testa agli *antivenerei* , la lor guarigione
si rende però sempre più facile . Le *fistole* invecchiate
sono come le vecchie *ulcere* , vale a dire , divengono
sfoghi necessarij , nel disseccare i quali corriamo sommo
pericolo : in fatti col favore di tale sfogo moltissimi
vecchi godono sanità perfettissima : se ne asciughiamo
la sorgente , ci dobbiamo aspettare i più terribili acci-
denti , e le più funeste infermità : riferirò a questo pro-
posito l' istoria singolare d' un uomo di cinquant' anni ,
dispostissimo all' operazione , la cui *fistola* non solamen-
te si seccò , ma dileguossi intieramente dentro lo spazio
di tre settimane : dopo questo tempo mostrò di star co-
st bene , che eravamo quasi certi , che non ne sarebbe
nato alcuno accidente : con questa falsa sicurezza fu
trascurato ogni mezzo per prevenirgli ; quando in un
subito precipitò in un orribile abbattimento , il quale
ad onta di tutti i più efficaci ajuti , lo condusse al se-
polcro : trovammo inondato tutto il suo cervello , e la
midolla spinale .

La *caduta del budello* (*ani procidentia*) è più , o me-
no considerabile : ne esce fuori talvolta fino a cinque ,
o sei pollici ; si pretende d' averne vedute d' un palmo ;
più degli altri vi son sottoposti i bambini : i varj scio-
glimenti del ventre , e il *tenesmo* , le *emoroidi* , le *asca-
ridi* , e la *costipazione* : le grida , gli sforzi violenti ,
che

che si fanno, massime per partorire, o per iscaricarsi il ventre, i mali della vescica, il taglio per la pietra ec. con frequenza vi danno occasione. Tutti questi casi non sono gran fatto malagevoli per la cura; ma se questo male dipende da paralisi, siccome segue in alcuni vecchi, e in quelli, che trovansi spossati per le lunghe dissenterie, difficilissima n'è la cura. La parte del retto slogata fassi talora scirroso; e in tal caso si stenta molto a farla rientrare: se sta esposta lungo tempo all'aria, può infiammarsi, o cancrenarsi: per riuscirvi facciamo uso di fomento astringenti fatte col cascìu, coll'acacia, colla scorza di mele granate, colle gallozzole, ec. cotte nel vino, o nell'acqua d'allume: con questo decotto s'inzuppano delle pezze, o delle spugne, e s'applicano alla parte ritenendovele con un'acconcia fasciatura: in questo caso non possiamo fondarci punto sopra gli astringenti interni, i quali per lo contrario, costipando il ventre, e conseguentemente obbligando a nuovi sforzi, posson produrre la recidiva.

MALI DELLE ESTREMITA'.

Non parleremo in questo luogo dei dolori, che partecipano dello scorbutico, e d'altri morbi, de' quali abbiamo ragionato altrove; come neppure del tremore, delle convulsioni, e della paralisi, che sono conseguenze dei mali della testa, nè delle lussazioni, delle fratture, e d'altri mali delle ossa: rimettiamo pure ai rispettivi loro articoli i tumori scrofolosi, le nodose contrazioni dei nervi, l'elefantiasi, ec. abbracceremo soltanto in questo la contrazione cronica dell'estremità, la loro particolare atrofia, la loro edematosa enfazione indipendente dalla leucoflemmazia, i tumori bianchi degli articoli, i patereccj, i geloni; quelle pustule delle gambe dette dai nostri *roseole saltantes*, e i calli; la sciatica, e il granchio; gli accidenti della cavata del sangue, lo storcimento, e il fetore de' piedi.

La contrazione cronica delle estremità (*contractura artuum*) non dipende dalla convulsione dei muscoli, ma dal loro seccamento, che le raceorcia: ne sono ugualmente intaccati gli estensori, e i piegatori; e fanno bene gli Anatomici, perchè questi secondi debbono vincerla: questo male è sempre assai patente, massime nella mano, le cui dita rimangono immobili, e incrociate. Le convulsioni abituali, la paralisi, il reumatismo,

tismo, la gotta, la scottatura, le piaghe, i vapori minerali, ed arsenicali, la colica spasmodica, ec. ne sono le cagioni ordinarie. Quando è antica, vi è poca speranza di guarigione; ma si può rimediarsi, se non è di vecchia data. Gli umettanti, gli addolcenti, i diaforetici leggieri, i depuranti, e gli antiscorbutici, dopo i rimedj generali, sono i più comunemente impiegati: il latte soprattutto, e le acque minerali mostrano d'aver maggior efficacia. In questo luogo i topici debbon fare un punto essenziale della cura: si fa grand' uso dei linimenti fatti coll'olio di vermi, di camomilla, e di lauro, col grasso umano, con quello di pollo, di orzo, ed altri, coll'unguento d'altea, ec. S' involupa ancora la parte colla pelle d' un animale di fresco scorticato, o si mette nel ventre d' un bue allora ucciso. I bagni parziali fatti coll'erbe emollienti, il brodo di trippe, il latte, e il sangue caldi, la docciatura dell'acque di Plombieres, d'Aix-la-Chapelle, del Monte d'oro, di Bourbon Lancy, di Digue, e altre termali; i bagni di vapori, i fanghi di Sant' Amando, e altri minerali, sì naturali, che artefatti, ec. son rimedj, dai quali ci possiamo prometter molto: ma nell' uso degli uni, e degli altri bisogna aver l'attenzione di stendere il membro piegato insensibilmente; e questa operazione abbrevia la guarigione più di tutt' altro.

L' atrofia dell' estremità (*aridura artuum*) il più delle volte nasce da un vizio occulto, non meno nei nervi, che nella spinal medulla, che può manifestarsi dalla sola apertura dei cadaveri; ma può dipendere ancora da una causa evidente, come da un tumore, che comprime i nervi, dalla lussazione producente l'effetto stesso, ec. Questo disseccamento induce nella maggior parte la perdita del senso, ed anche del moto: si formano anche talora dalla parte dei flittenti, che la minacciano di cancrena. Dopo i rimedj generali, se son giudicati necessari, e la dieta umettante, e addolcente, si fa per lo più uso dei temperanti, dei miti aperienti, e dei diaforetici; ma il più delle volte senza riuscita: ci dobbiamo prometter molto più della bevanda delle acque minerali, sì fredde, che calde, la scelta delle quali dee esser regolata dalle circostanze, di quello ci possiamo aspettare da tutti gli altri rimedj interni. Si può ritrarre qualche prò dai bagni di trippe, dell' acqua di malva, e d'altri emollienti; dalle fre-

ghe, e dalle unzioni fatte coll'olio di vermi, di cane piccolo, e di camomilla, coll'unguento rosato, ec. dalla docciatura dell'acque termali, ec. Le coppette a vento talvolta hanno fatto effetto; ma bisogna, che il male sia molto leggiero, affinchè ceda a un tal rimedio.

L'enfiagione edematosa delle gambe non è sempre un segno di cachessia, e d'idropisia, poichè le donne gravide, le oppilate, alcuni asmatici, ec. vi son sottoposti. La resipola, le legature, o qualunque altra compressione, vi danno parimente motivo: è noto altresì, ch'è l'ordinaria conseguenza delle febbri lunghe, non meno continue, che intermittenti; dei grandi sborfi di sangue, e di quasi tutte le malattie croniche; ma spessissime volte è un segno, o foriere dell'idropisia. L'enfiagione leggiera si dilegua la mattina; l'invecchiata intormentisce le gambe, e talvolta le priva del loro moto: quando è a un certo tal dato segno, come si osserva in molti idropici, vi si fanno delle fisure, o screpoli, che danno l'uscita all'acqua, ch'è vi cova: questo scolo solo è stato sempre vantaggioso; ma può esser seguito dalla cancrena: minacciano altresì un tale accidente i dolori acuti, e profondi. Quando l'enfiagione nasce da una cagione passeggera, dallo stato di debolezza, o da un semplice vizio dei liquori, si cura con somma facilità; ma s'è l'effetto d'un morbo incurabile, vi si perde il pregio, e l'opera: sono esposte alle medesime enfiagioni le estremità superiori, ma assai più di rado. La cura interna della cachessia, e dell'idropisia, conviene al male, di cui parliamo, il quale è di più suscettibile di molti rimedj esterni: tali sono le fomentate col decotto d'eupatore, e di tanesia, di fiori di sambuco, e di coccole di ginepro; coll'acqua di calcina, colla rannata di cenere di fermenti, coll'acqua d'allume, ec. i vapori di spirito di vino abbrugiato, il cataplasma di colombina, di sale, e d'acero, quello, che si prepara colle foglie pestate di leccio, e collo spirito di vino; s'immerge la parte nelle ceneri calde: si stropiccia altresì con dei tovaglioli ben caldi, fino a che sia divenuta rossa, e scottente; ma questa fattura non è libera da disordine, poichè può richiamare una flussione resipelacea: abbiamo detto altrove, che molti avevano sperimentato del vantaggio dal portar delle calze di pelle di cane; finalmente alcuni applicano una fascia

sopra la parte sgonfiata la mattina per impedirne il nuovo stivamento : questa operazione può far del bene , quando il male è leggiero . Per altro è bene l' avvertire , come tutti i fortificanti , e i repercussivi , che in queste occasioni s' impiegano a man salva , posson produrre tristi effetti , quando le cavità son minacciate di stravasamento : e si è con frequenza veduto lo stivamento dall' scroto , e della verga , l' ascite , e l' idropisia del petto , succedere all' edema delle gambe , che si era fatto dar giù con questo metodo . Nei casi estremi son talvolta riuscite le scarificazioni ; ma con più frequenza sono state seguite dalla cancrena : finalmente l' enfiagione delle gambe che vien dietro alla quartana , non si dilegua d' ordinario , che col ritorno della febbre , la quale si richiama con i purganti , o con ogn' altro mezzo : è inutile il dire , che quando danno motivo all' edema delle gambe l' evacuazioni soppresse , bisogna o ristabilirle , o supplirvi .

Non vi è cosa meno illustrata dell' indole dei tumori bianchi , che investono gli articoli , e singolarmente il gomito , e il ginocchio : talvolta dipendono dalle scrofole , ma posson dipendere da parecchie altre cagioni , come da una percossa , da una caduta , o da ogn' altro accidente . Quando ingrossano a un certo segno , tutte le parti sotto al tumore cadono nell' atrofia : i dolori , di cui sono sommamente suscettibili , possono precipitare i pazienti nella febbre lenta , e nel marasmo universale . Questi tumori però nella maggior parte son molli , senza dolore , e calore , e con poca alterazione nella cute : pajono talvolta edematosi , e lo sono in fatti , quando abbracciano l' intiera articolazione : alcuni gli hanno considerati come una specie d' idropisia ; ma tal carattere non conviene a tutti , massime quando occupano una sola parte dell' articolazione . E' quasi impossibile il risolvere questa specie di tumori , particolarmente se vi sia alcun ristagno nei ligamenti capsulari , come segue molto spesso : degenerano sovente in ascessi , e in ulcere fistolose , perpetuamente accompagnate da carie , e da putrefazione dei ligamenti : ne scola un liquor limpido , ch' è probabilmente la *sinovia* degli articoli ; e in tal caso è molto difficile l' impedire , che non perdano la loro flessibilità . Questo male , a fronte di cui tante volte l' hanno fallata e la Medicina , e la Chirurgia , può nulla dimer-

dimeno cedere ai rimedj sì interni , che esterni , quando s'investe ne' suoi principj , vale a dire , allorchè non è che una semplice flussione; ma se ne' suoi avanzamenti intacca le ossa , e i ligamenti , è cosa molto rara , che vi profittiamo coll' arte nostra .

La cura interna di questo male non può essere se non lunghissima , e sommamente variata ; si raggira questa principalmente intorno ai purganti , gli aperienti , gl' incisivi , i depuranti , e i sudorifici ; ma l' azione di tutti questi rimedj è così lenta , che altri se ne stanca sovente , prima d' aver potuto giudicare dell' effetto loro : è indubitato , che bisogna secondargli con i topici , i quali debbon anche avere in questo luogo maggiore efficacia ; si cavano dalla classe dei fortificanti , e dei risolventi : tali sono tutte le fomentate aromatiche , e spiritose , nelle quali si fa entrare l' allume , e il vetriolo : per tale effetto è sembrato acconciissimo lo spirito di vino col tartaro : l' aceto , il bolo , la mirra , e il mastice sono altresì fortificanti da non disprezzarsi . Nei primi tempi si può ritrarre alcun vantaggio dalla legatura , e dalla compressione , come altresì dalle fregagioni con tovaglioli caldi ; dal profumo del Karabè , e dell' incenso ; dalla docciatura dell' acque termali , ed anche dall' acqua comune : sonosi veduti ottimi effetti da quella , che si prende alla cascata d' un mulino , o di qualunque copiosa sorgente : è noto come questo rimedio , così semplice , quale egli è , è riuscito perfino nelle membra inchiodate dalla gotta . Alcuni hanno tentato di far sopra la parte delle unzioni mercuriali ; ma un tal rimedio non può convenire se non se in alcune circostanze . Finalmente se tutti gli ajuti divisati non giovano , siccome accade pur troppo con frequenza , forz' è aprire il tumore coll' incisione , o col caustico , defendendone però i ligamenti , e i tendini : si medica in progresso questa piaga col metodo ordinario , cioè , coi digestivi , coi detergenti , e con i cateretici : il *basilicon* , e l' unguento egiziaco , vi sono stati più che altro messi in opera : scaturisce , come accennammo , da questa piaga una sinovia , che ne rende difficoltosa in estremo la guarigione : e appunto per tal ragione non bisogna darsi fretta per chiuderla , se non vogliamo esporre il paziente ad un attacco più crudele del primo .

Il *pateccio* (*paronichia*) forma un male infiamm-

ma-

matorio , ora leggiero , ora grave , secondo che vi è maggiore , o minor profondità : è noto che questo non occupa , che le punte delle dita , e che talvolta scorre per tutte quelle della mano : è raro , che investe quelle dei piedi : è agevole il giudicare , che il pateruccio non s' affomiglia in alcun modo agli altri tumori infiammatorj , comunemente scrofolosi , situati sopra le altre parti delle dita , sì della mano , che del piede . L' enfiagione , che cagiona il pateruccio , si comunica talvolta a tutto il braccio , di pari che i dolori , che sono acutissimi : il superficiale , che investe i soli integumenti , si cura con molta facilità ; ma non segue lo stesso del profondo , che penetra fino al tendine , ai ligamenti , al periostio , e all'osso : questo è unito a un calor grande , a pulsazione , ad un dolore rodente intensissimo : inoltre risveglia la febbre , fa cadere in deliquj , dà le convulsioni , il delirio , ec. sì l' uno , che l' altro terminano colla suppurazione ; ma il secondo è seguito con frequenza dalla carie , e dalla cancrena : se ne fa reo augurio , quando l' enfiagione non corrisponde alla veemenza dei dolori . La puntura , le contusioni , l' immersione della mano nell' acqua fredda , ec. spesso vi danno occasione .

Ognun sa , che si dee favorire la suppurazione del pateruccio superficiale con applicarvi la midolla di pane , o un fico secco pastoso , inzuppato anche se si vuole , nel latte di donne : che divenuta bianca la pelle , se ne fa l' incisione ; e che si medica poscia la piaga coll' unguento *basilicon* , o con quello della madre : ma il profondo , che si distingue dai segni da noi esposti , richiede la più esatta attenzione , e la cura delle persone più intelligenti , e più istruite : non si può dispensarsi in questo caso dal cavar sangue una , o due volte : si danno internamente in copia i rinfrescanti , e gli addolcenti ; e siamo anche alcuna volta costretti a prescrivere i narcotici : si procura d' accelerar la suppurazione coll' applicazione della midolla del pane , dell' impiastro di aquilon colle gomme , e d' altri a questi analoghi : non si dee tardare ad aprirlo per impedire , per quanto è possibile , lo sconcerto , che la marcia sicuramente cagionerebbe ; e forza è inoltrare il taglio fino all'osso , quando si teme , che il male vi sia giunto : siamo talora costretti a troncar la falange , ed anche il dito , per salvare il braccio , o la vita al paziente .

ziente: si medica la piaga col balsamo d' *Arceo*, coll' unguento di storace, colla tintura di mirra, e d' aloe, ecc. Si fa uso parimente dell' olio di guajaco dell' allume abbrugiato, della polvere d' euforbio, e d' altri disecchanti, e catteretici, secondo le circostanze, e le mire, che si possono avere. La maggior parte di coloro, che hanno più volte sofferto questo male, hanno imparato a troncarne gli avanzamenti coll' immergere più fiate il dito nell' acqua bollente: si può ben credere, che non vi si lascia stare gran fatto, e che questo rimedio non può convenire, che nei primi momenti dell' attacco: la rannata di cernere di cermenti ben calda, in cui si tiene il dito per più ore, è riputato un ottimo preservativo: si fa pure l' uso stesso dello spirito di vino, del decotto di calandrina, o querciuola, nel latte, ec. Ma tutti questi rimedj, che par che operino da risolventi, non possono esser propri, allorchè è per istabilirsi la suppurazione. Il pateruccio delle dita de' piedi si può curare nella stessa guisa; ma è difficile lo schivare l' amputazione del dito.

I pedignoni, o geloni (*pernio*) così familiari nei ragazzi, e nei giovani, investono non solo i piedi, e le mani, ma ancora il naso, le orecchie, ec. gli caratterizzano bastantemente l' enfiagione paonazzetta, e il pizzicore: non vi si forma giammai l' abscesso; ma con gran frequenza delle screpolature, ed anche delle ulcere, più o meno profonde: i loro contorni lividi, la sanie fetente, che ne scola, e le pustole, v' annunziano la cancrena, e la carie. I geloni nell' invernata fanno testa a quasi tutti i rimedj, nè se ne vanno se non al ritorno della buona stagione: possiamo impedirgli infondendo spesso la parte nel sangue di bue fumante; le lavande frequenti coll' acque termali sulfuree, ce ne possono parimente preservare: si stropiccia anche la parte colla neve, quando è stata esposta al gran freddo, che è, come è noto, la cagione ordinaria dei geloni. Ma quando questi son formati, la Medicina altro non ha contro essi, che palliativi: si cavano questi dagli emollienti, dagli addolcenti, e dai risolventi: tali sono gli olj d' ulive, e di mandorle dolci, il midollo di cervo, e lo spermaceti; tutte le pomate, e cerotti addolcenti: il profumo col seme di giusquiamo; le lavande coll' orina, col vino caldo, e coll' acquavite; collo spirito di vino, in cui sia stata sciolta della canfora, e del-

della triaca; con i decotti aromatici, con quello di pariataria, ec. Si fanno delle unzioni col petriolo, coll' olio di trementina: si applica l'impiaastro di sapone, ec. Finalmente si medica, l'ulcera, e la cancrena con i rimedj appropriati.

Nascono alcuna volta alle estremità, ma più comunemente alle gambe, tubercoli infiammati della grossezza d'una picciola fava, assai somiglianti alle pustole celtiche, o a quelle da noi dette *epinittidi*. Aurelio Severino denominollì *roseole saltantes*, a motivo del loro cerchio rosso, e dei dolori pruriginosi, che non lascian tener ferme le gambe ai pazienti: questi tubercoli, che non sogliono attaccare se non i giovani d'ambi i sessi, terminano talvolta colla risoluzione; ma il più delle volte vi si forma un'ulceretta, che non ci dà motivo alcuno di temere: si dileguano per lo più spontaneamente, o non abbisognano che dei topici comuni. Si può opporsi al lor frequente risorgere col governo, e con i rimedj generali; con i depuranti, e con altri appropriati a mali della cute.

Sa ognuno, che i calli (*clavi pedum*) che sono aderenti d'ordinario al periossio, provengono da una replicata pressione, e che non vi sono mezzi migliori per ischivarne i dolori, che cagionano, che il difendergli dalla pressione stessa, o con usare una calzatura più larga, o involupbandogli, o tagliandogli, o fradiciandogli: la maggior parte degl'impiaastri, che vi si applicano, mi pare, che non abbiano virtù più efficace della cera gialla, o d'ogn' altra materia molle, che possa ricevere la loro impressione, e per tal mezzo difendergli da qualunque pressione. Gli emollienti sono i più atti a calmare i dolori, e ad agevolarne la loro estirpazione: con tal mira appunto si tiene in molle il piede nell'acqua calda, s'applicano cataplasmi, e impiaastri emollienti, un pezzetto di carne di manzo cruda, le foglie di giubarba, ec. Allora si può staccare con gran facilità la porzione dura, o portarne via tutto quello, che sopravanza la pelle. Ho veduto persone, che pretendevano esserne state intieramente liberate colla rannata ordinaria calda, nella quale avevano tenuto più ore, e in varie volte, il piede in molle: altri ascrivono la stessa proprietà all'aglio, all'impiaastro di gomma ammoniac, a quello di vigo, ec. E' riputato buon rimedio la scorza d'*acagiù*; ma può produr-

re dei perniciosi effetti, eccitandovi l' infiammazione, e la suppurazione, come ho più d'una volta osservato io stesso: finalmente se ci possiamo promettere alcun giovamento da tutte le divise applicazioni, ciò non può seguirse, se non dopo aver ben bene ammolito i calli con i bagni, e con gli altri mezzi proposti, e dopo d'avergli sbarbati con un istrumento appropriato a tal uso.

La sciatica (*ischias*) ha grande affinità col reumatismo, e colla gotta: i dolori, che la caratterizzano, son per lo più preceduti da intorpidimento, e da informicolamento; nella maggior parte questi cominciano dai lombi, e si stendono sopra la parte esterna della coscia, e talora alla gamba, e fino al piede: dopo una tale esposizione non è difficile il giudicare, che n'è la sede la *fascia lata*. Questo morbo, che di rado è unito alla febbre, è poco da temere: tuttavia l'invecchiato indebolisce ed accorcia talvolta la gamba: le persone di vivaci passioni; i più sottoposti a innamorarsi; quei che hanno perduto il flusso emorroidale; i melancolici, gli scorbutici, i gottosì, i calcolosi, ec. vi vanno soggetti più degli altri. La cura della sciatica dee esser cavata da quella, ch'è propria per la gotta, pel reumatismo, di cui, come accennammo, questo male partecipa: la cavata del sangue dal piede, vi è talvolta vantaggiosa, di pari che le mignatte all'ano: si fa grand'uso degli allentanti, dei temperanti, e degli addolcenti: i diaforetici posson essere pericolosi, e talvolta accrescono il male: i lassativi, e i clisteri vi convengono moltissimo: i calmanti ipnotici debbon essere amministrati con riserva, perchè rendono il male più ostinato: sonosi veduti ottimi effetti dalle pillole di sapone, da quelle di *statkei*, dal fiore di zolfo nel latte, dallo spirito di trementina col miele, ec. Importa molto il tener difesa la parte dal freddo, e dall'inazione: si stropiccia collo spirito di vino canforato, coi linimenti, tanto rilascianti, che risolventi, e calmanti: vi s'applicano cataplasmi fatti colla radice di brionia, e coll'olio di lino: s'espone al bagno di vapori, ai profumi risolventi, alla doccia di quell'acque termali, ec. Finalmente i vescicanti, e le coppette, hanno prodotto de' buoni effetti, per non parlare del cauterio attuale, in quest'occasione molto praticato dagli Antichi.

Il granchio, che a mala pena merita d'esser collocato

cato in questo luogo , è un male passeggero , la cui natura non è per altro ben nota : ognuno ha provato , che il dolore , ch' eccita , è talora insopportabile : sembra , che ora nasca da convulsione , e ora da intorpidimento : sovente afferra nel letto , e più comunemente quando altri è stato per lungo tempo in letto in una situazione disacconcia : il primo caso pare spasmodico : il secondo par che dipenda dalla sola compressione dei nervi , poichè la gamba è allora intormentita , e come priva di senso , tuttochè vi si sentano dei dolori interni . Si rimedia al primo col semplice stropicciamento , o facendo alquanti passi per la camera : si dilegua il secondo , mutando situazione . Non bisogna confonder col granchio quel dolore , che si prova talvolta alle gambe , stendendole in letto : questo accidente , ch'è talora vivissimo , par , che dipenda da una specie di storcimento , o da un leggiero slogamento dei muscoli , e dei tendini , al quale si rimedia facendo scorrer dolcemente la mano sul muscolo , o maneggiando il suo antagonista .

Gli accidenti della cavata del sangue più frequenti sono il *trombus* , che non è che un tumore formato dal sangue stravasato ; l' *echimosi* ; la puntura dell' *arteria* , dell' *aponeurosi* , del *tendine* , e del *nervo* . Il *trombus* , e l' *echimosi* prodotti tutt' e due dal sangue stravasato nel tessuto cellulare , non sono senza pericolo , avvenchè talvolta accada , che degenerino in infiammazione , e questa flogosi può esser seguita da un ascesso , e anche dalla cancrena . Compariscono anche talvolta dopo la cavata del sangue , dei *tumori linfatici* , che non ci danno da temere , e che si dileguano di per sè , o coll' applicazione dell' acqua vulneraria , di quella della Regina , ec. Si dilegua il *trompus* , e l' *echimosi* con i risolventi medesimi , o colla semplice acquavite , della quale s' inzuppano dei piumaccioli : alquanti granelli di sale rivoltati in una pezzetta di tela bagnata , sono attissimi di pari a produrre questo effetto e quando vi è qualche segno di suppurazione , vi s' applica l' impiastro diaquilon , l' unguento della madre , ec. Se la parte illividisce , bisogna scarificarla , e usar poscia dei digestivi , e degli antiputridi , tanto in cataplasma , che in fomenta . Il sangue , ch' esce con empito , e di sbalzo , fa bastantemente conoscere , ch' è stata aperta l' *arteria* , ma non segue lo stesso della semplice puntura ,
che

che non si manifesta se non alcun tempo dopo , e per lo più coll' aneurisma , di cui abbiamo parlato altrove : si può impedirlo formando una gagliarda compressione : la carta masticata sostenuta da una buona fasciatura , è nata fatta per tale effetto ; il braccio però non dev' essere troppo stretto per timore della cancrena : se l'arteria è aperta , bisogna , prima di porre in opera la compressione , lasciare uscire il sangue fino al deliquio , quando lo permettano le circostanze del male anteriore , e che il medesimo esca con libertà : se per lo contrario si stravaia , e forma un tumore intorno alla ferita , si dee fermarlo subito , e aprir la vena dell' altro braccio . Tali sono gli accidenti , che seguono nel cavare sangue , relativamente ad esso sangue , e a' suoi vasi : gli altri riguardano i tendini , e i nervi piantati vicino al vaso , che si dee aprire .

La puntura dell' aponeurosi , e del tendine , è un accidente orribilissimo : il Cerusico può esserne avvertito dalla resistenza , che prova la lancetta , e dall' estremo dolore , del quale il Paziente si lagna ; per altro coloro , ai quali tocca questa disgrazia , spesso non sentono il dolore se non alcune ore dopo essersi cavati sangue : essi lo riferiscono talvolta all' ascella , ma con più frequenza a tutto il braccio : in brevissim' ora si forma intorno alla piaga una deposizione infiammatoria dolorosissima , che eccita i brividi , e la febbre , e dà talora motivo alle convulsioni : termina in un abscesso accompagnato da putrefazione , e minacciato da cancrena , non contenendo se non della sanie . In questo caso sono indispensabili le numerose cavate di sangue , di pari che gli allentanti , gli addolcenti , e i calmanti . Le officinate , la chiara d' uovo , il bollo armeno , ec. sono i topici più atti ad impedir la flussione : quando è dichiarata , si usano i cataplasmi , e le fomentate emollienti , anodine , e risolventi : si favorisce la suppurazione colla midolla di pane , col cataplasma di cipolle di gigli , e con altre ; e s' apre per tempo l' abscesso , si fa colare tanto nella prima , che nella seconda piaga del balsamo del Perù , della trementina , dello spirito di vino , dell' acqua della Regina , del balsamo del Fioravanti , ec. Finalmente , secondo le circostanze , si fa uso dell' unguento della madre , di quello di cerusa , del ponsolice , ec. La puntura del nervo cutaneo , ch' è in solo esposto al taglio della lancetta , non ci fa paura
mi-

minore ; non si può conoscere che dal dolore , e dall' intorpidimento , che si prova per tutta la lunghezza della parte anteriore del braccio fino alle dita : si rimedia all' uno , e all' altro , stropicciando la parte coll' olio di mandorle dolci , o con quello di vermi , coll' acquavite , col balsamo del Fioravanti , con quello del Commendatore , e con altri spiritosi .

Lo storcimento (*pedis distortio*) è un accidente , che bisogna riferire a uno stiramento doloroso , e talora a un laceramento delle parti membranose , ligamentose , aponeurotiche , e tendinose del piede ; al dilungamento , o slogamento dei tendini , ec. Ne sono talvolta smosse le ossa , e ristabilite nel sito loro per lo sforzo dei ligamenti : ne può anche risultare una vera lussazione : ne faremo parola nel seguente Articolo ; ma nel presente dobbiamo parlare di quello dell' osso sesamoide del dito grosso dei piedi , che può cagionare i più atroci accidenti , i quali non cessano se non se coll' amputazione della parte . Lo storcimento è ben presto seguito da una fluxione infiammatoria , che occupa le adiacenze del tarso ; e questo stivamento impedisce di rilevare il più delle volte , ove si trova il vizio : vi si forma talora un ascesso , che degenera in ulcera ostinatissima , a motivo della sinovia , che ne cola , e la conserva : quest' ulcera dà spesso occasione alla putrefazione dei ligamenti , alla carie , e all' ancilosi : finalmente la sua durata può precipitare nella febbre lenta , e nel marasmo . L' articolazione del piede è la sede ordinaria degli storcimenti ; ma il polso , e il gomito non ne sono esenti : questo accidente segue non solo per le cadute , e le percosse , ma eziandio per la mala posizione del piede , saltando , ballando , ed anche camminando . Si può schivare la fluxione , come ce lo fa vedere la quotidiana esperienza , immergendo la parte nell' acqua fredda ; ma questa immersione dee essere spedita , e prima che ne sia sopraggiunta l' enfiagione : quando non si crede più approposito , si applicano sopra la parte delle rose rosse cotte nel vino : l' acquavite col balsamo del Perù ; lo spirito di vino canforato , e altri risolventi , per non parlare degli emollienti , dei digestivi , degli anodini , e d' altri topici , che possono esser voluti dalle circostanze : non è sempre agevole l' evacuar questa parte , e rimane spesso una gonfiezza delle più ostinate : si procura di dileguarla colla docciatura delle ac-

que termali, come di Plombieres, di Vichy, di Bourbon, di Bireges, ec. o tenendo la parte più spesso, e più lunga rente che si può pel ventre d'un buo di fresco ucciso. Non abbiamo parlato della cavata del sangue, perchè è molto raro, che si abbisogni di ricorrervi. nè dei lassativi, dei temperanti, e d'altri rimedj interni, i quali però possono esser renduti necessarj da molte circostanze.

Il sudore dei piedi, il cui fetore è dispiacevolissimo, è un leggiero incomodo; il volerli liberar dal quale tuttavia è pericoloso, ed a cui non si dee rimediare, che con un'estrema pulizia: quei, che hanno tanta imprudenza da seguire il consiglio degl'ignoranti, o dei ciarlatani, e bagnano i lor piedi in decotti astringenti, e aluminosi, o gli spolverano con materie assorbenti, e stittiche, veramente possono asciugare queste parti; ma espongono le altre a più terribili malattie, come a vertigini, a soffogamenti, alla tosse, alla cardialgia, e a varj stivamenti, che si manifestano con dolori interni, ed esterni, ec. Pochi sono i Pratici, che non abbiano avuto per le mani questi casi, e che non sappiano il modo di rimediarvi; o con richiamare il sudore col bagno caldo, con i vapori, o colla fumigazione; oppure supplendovi con dei sinapismi, con vescicanti, ec. per non far parola della cavata del sangue, dei purganti, e d'altri evacuanti, che possono corrispondere alle stesse intenzioni.

MALATTIE DELLE OSSA.

Coloro, che non hanno perduto la memoria della forma delle ossa, del meccanismo di loro unione, e delle potenze, che fanno loro eseguire tutti i movimenti, dei quali son capaci, conosceranno con somma facilità tutte le lussazioni, e le fratture, e troveranno ancora senza molto studio i mezzi più spediti, e più certi per rimediarvi. Le lussazioni della testa, delle vertebre, e del coccige, son molto rare: ma son molto ovvie quelle della mascella, della clavicola, dell'umero, delle ossa della parte anteriore del braccio, del polso, delle dita, delle ossa della gamba, e del piede. Le percosse, le cadute, e gli sforzi straordinari, sono le cause più frequenti delle lussazioni, e delle fratture; ma segue talvolta, che diano occasione alle prime le convulsioni, il rilasciamento dei ligamenti, l'inondazione

zione della sinovia entro la cavità articolare , il gonfiamento dell' intestatura delle ossa. E' agevole il rimettere le lussazioni , che dipendono da cagione esterna , ma nella riduzione delle altre s' incontrano estreme difficoltà , massime se il soggetto è paralitico , o scorbutico. La lussazione dell' osso della coscia , quasi impossibile a ricóvrarsi , è sommamente rara , tuttochè non si pensi ; imperciocchè mi ha fatto vedere l' apertura dei cadaveri , come vien presa alla giornata per questa lussazione la frattura del collo del femore , e lo scolamento della sua epifisi ; mali anche più difficili a rimediarsi : è ugualmente durissima la lussazione del tarso ; ed è sempre mortale quella delle vertebre. E' incomparabilmente più agevole il rimettere le ossa tanto lussate , che rotte nel loro vero sito , che il conservarle : e questo ultimo punto dee essere il principale della cura , la quale ha parimente per oggetto il rimediare agli accidenti , che accompagnano , o seguono questi sconcerti : tali sono le contusioni , le piaghe , l' infiammazione , i dolori , la cancrena , la febbre , le convulsioni , ec. Se nell' uno , e nell' altro caso non si dà alla fasciatura il grado di tensione conveniente , ci dobbiamo aspettare un secondo slogamento dell' osso : se si stringe soverchio , s' espone la parte agli accidenti , che risultano dalla gagliarda compressione , come allo stivamento infiammatorio , o edematoso , alla cancrena , ec. Non ignorano i Pratici , che i topici fortificanti , e astringenti sono acconcissimi a rassodare queste parti , e a fiancheggiar l' effetto della fasciatura : che per le fratture , la natura può di per sé riunire i pezzi , e che l' opera della Chirurgia si limita a riassettargli nel lor vero sito , e a conservarveli : fanno ancora , che le picciole ossa possan esser riunite in capo a quindici giorni ; ma che per le grosse non si può fondarsi sopra la solidità del callo , se non dopo quaranta giorni , e anche di vantaggio.

Si conosce sotto il termine *ancilosi* un male degli articoli , che gli priva del loro moto : dipende questo dalla riunione , o saldatura dell' osso , che in tal caso non formano , che un pezzo solo incapace di piegarsi ; o dallo stato non naturale dei ligamenti , che a loro fatto perdere la propria flessibilità ; ma la parte in quest' ultimo caso può conservare un moto più , o meno sensibile . Le contusioni , le lussazioni , le fratture ,

gli sforcimenti, l'enfiore delle ossa, e dei ligamenti, i vizj della sinovia, le deposizioni purulente, la carie, ec. sono le cagioni più ordinarie dell'ancilosi, alla quale lo sgretollo dell'ossa annunzia una prossima disposizione: gli scorbutici, gli scrofolosi, gli infetti di celtico, e i gottosì, vi vanno più d'ogn'altro soggetti. Quando le ossa son saldate, appena vi ha speranza di guarigione; ma non vi è impossibile il rimediare all'aridezza, e all'asprezza dei ligamenti, come altresì a gli altri vizj dell'articolazione: tuttavia è sovente difficilissimo il decidere a quale delle cagioni debbasi riferire la mancanza del moto. Gli emollienti, e i rilasianti, o in fomenta, o in bagno, in cataplasma, o in unzione; la docciatura delle acque termali, o dell'acqua ordinaria calda; quella della soluzione del sal marino, o del sal ammoniaco; l'applicazione dei fanghi termali, o artefatti, ec. posson ammolliare alquanto i ligamenti; ma tutti questi topici, come bene uno se l'immagina, sono di lieve soccorso per la saldatura: si procura, per lo più indarno, di scioglierla coll'applicazione del diabotano, dell'impiastrò di vigo, di quello di sapone; coll'unzioni mercuriali, ec. Questi rimedj posson produrre qualche effetto, quando il male non è invecchiato; ma negli altri casi, non vi è altro ripiego, che l'amputazione: altri però non vi si determina facilmente, poichè a molti il rimedio sembra peggiore del male: è inutile il dire, che può impedirsi l'ancilosi, quando si è avvertiti del pericolo, facendo fare ogni giorno alla parte alcuni moti graduati, ec.

Si addimandano *esofiosi* tutti i tumori, e i gonfiamenti delle ossa: hanno questi più gradi di solidità: ve ne sono di quelli, e sono i più comuni, i quali sono ugualmente, e anche più duri dell'ossa stesse; altri sono molli, e cedono al tatto, a un di presso come i ganglioni: si addimandano *gumme* (*gumme*): questi secondi appartengono d'ordinario al cranio, e all'ossa grosse, e passano per un sintoma del malfrancese: ve ne è una terza spezie, che chiamasi *nodo* (*nodus*), la cui consistenza è fra quella de' due primi; e questo parimente si considera per prodotto venereo. Non si dee porre fra le esofiosi il tufo della gotta, nè le disuguaglianze, che forma il callo, dopo la riunione delle fratture; e ancor meno l'ossificazione delle tendini nelle loro attaccature, come si vede seguire fa-

mi-

miliaramente nei vecchi. Le esostosi occupano soltanto una parte delle ossa grosse; ma nelle picciole, come in quelle del carpo, del metacarpo, e altre, questo gonfiamento ha tanta estesa, quanta ne ha l'osso. Il dolore, che si prova nelle esostosi, nasce comunemente dal loro crescere: nulladimeno ve ne sono di quelle, le quali, o per lor natura, o per le circostanze del luogo, che occupano, son sempre dolorose, ed eccitano ancora la febbre lenta. Si rileva dalle dissezioni anatomiche, che sono di diversa natura: ve ne sono di quelle, la cui tessitura non è punto differente da quella delle ossa; se ne veggiono circondate da una crosta, che per la sua solidità si avvicina allo smalto dei denti: se ne trovano di quelle, che rinchiudono delle sostanze carnose, delle materie mucilaginoso, purulente, o saniose; della carie, ec.

L'esostosi termina talora colla risoluzione, o colla suppurazione, e colla tarlatura: se si dilegua senza darvi motivo con alcuna medicatura, bisogna temerne le conseguenze. La cute rossa, e infiammata: i dolori vivi, e profondi, che sentonsi nel tumore, sono i più ordinarij indizj della suppurazione: in queste circostanze il tumore s'ammollisce, e vi si può anche rilevare alcuna fluttuazione: questo stato è inseparabile dalla carie. Quando l'esostosi di nascita, o di causa esterna, non dà alcuno incomodo, nè rende la parte deforme, non vi si dee por mano: si può anche lasciar sussistere sotto le stesse condizioni quella della cagione interna, quando ha fatto testa allo specifico della malattia principale: negli altri casi possiamo tentare di scioglierla coll'applicazione del diabolano, dell'impiaastro di cicuta, con quel di vigo, ed altri squaglianti; ma ciò, che è superiore a tutti questi rimedj, si è la docciatura delle acque di Bareges, e d'alcune altre termali, che a un tempo stesso si prendono internamente: finalmente non ricavandosi da tutti questi soccorsi alcun vantaggio, non è ripiego, salvochè nell'operazione chirurgica, che verte sull'amputazione del tumore, o sul cauterizzamento; ma una tal cura non è mai senza pericolo.

La *carie*, che è all'ossa ciò, che l'ulcera è alle parti molli, è *secca*, e *umida*: la prima, che investe quasi sempre l'ossa scoperte, o nude del loro perioftio, si manifesta dal color giallo, scuro, o nero dell'osso:

gli converrebbe meglio il nome di cancrena , che quello di carie ; imperciocchè , ciò , che se ne sfoglia , è d'ordinario duro , e compatto , senza erosione , nè gonfiamento : non sempre però le ossa scoperte si sfogliano : questa operazione della natura si fa con molta speditezza nei fanciulli , e nei giovani ; ma è sommamente lenta nei vecchi . I più gagliardi sfogliamenti si fanno nella tibia , ove talvolta si vede tutto il corpo dell'osso , o una grandissima parte , separarsi , e staccarsi dalle due estremità . La carie umida , ch'è una specie di tarlatura , è inondata d'una sanie per lo più fetente , e prodotta dalle carni bavose . Debbonsi distinguere le carie di causa interna da quelle , che sono l'effetto dell'azione dell'aria , della marcia , e della sanie . La spina ventosa , di cui parleremo nel fine del presente Articolo , è un esempio della carie di cagione interna : l'osteofiti , gli ascessi del midollo , il vizio celtico , scrofoloso , ec. spesso vi danno parimente motivo ; le contusioni , le fratture , le piaghe , gli aneurismi , e altri tumori , sono le più frequenti cagioni esterne , che possono eccitare la carie . La sanie oleosa , nericcia , e fetida , che scola dall'ulcere ; le carni pallide , spungose , e senza senso , che cuoprono le ossa ; il dito finalmente , e la tenta , per mezzo dei quali si possono scuoprire le disugualgianze , sono i segni della carie : per lo contrario quando la carne , che cuopre l'osso , è fissa , granellosa , e sensibile , non si dee temere , che l'osso sia guasto . Le ulcere del naso , della bocca , dell'angolo degli occhi , e delle articolazioni , son quasi sempre unite alla carie . Quella , che nasce da cagione interna , è la più terribile : la invecchiata , cioè , quella che dura da più d'un anno , è quasi incurabile .

Nella carie secca , lo sfogliamento si fa sovente dalla sola natura : ma talora abbisogna dell'ajuto dell'arte , che vi impiega la raspa , le cesoje , il trapano forante , ec. I mezzi stessi possono essere impiegati per la carie umida , la quale , come dicemmo , è una specie di tarlatura ; ma non vi è cosa più atta a troncarne gli avanzamenti , dell'impedire colle frequenti medicature il soggiorno della sanie . I rimedj interni , che vi si usano , non meno per fissar la carie , che per accelerarne lo sfogliamento , sono lo spirito di vino , l'acqua della Regina , ed altri liquori di tal indole : questi topici però non s'addicono , che alle leggiere , cioè ,

quel-

quelle , che non dipendono , che dal semplice contatto dell' aria , alla quale ancora l' osso non sia stato lungamente esposto ; ma se la carie è profonda , si porta via comunemente colla raspa , o con alcun altro strumento . La polvere d' aristolochia , d' iride di Firenze , di mirra , e d' aloe , d' euforbio , ec. l' olio di garofani , di canella , e di guajaco , sono i topici più usati , non meno con intenzione di seccar le ossa , che di promuovere lo sfogliamento : l' olio di canfora , lo spirito di nitro , l' acqua fagedenica , ec. sono attissimi a cauterizzare tutto quello , ch' è alterato , massime nella carie umida . Se tutti questi mezzi sono inutili , si scuopre l' osso , si raschia , si lima , o si scava , per toglierne via tutta la carie . Talvolta si fissa poscia col cauterio attuale ; ma non si usa applicare il fuoco alle ossa del cranio , allo sterno , alle costole , e alle altre ossa spungose : si debbono anche rispettar quelle , che son circondate dai ligamenti , dai nervi , e dai tendini . Si giudica dell' evento di tutte queste pratiche dall' aspetto della piaga : è noto , che le buone carni debbon venire dalla superficie dell' osso , e non dai contorni dell' ulcera . Le carie , che accompagnano le ulcere cancerose , fanno testa a tutto quello , che abbiamo proposto , nè cessano coll' amputazione del membro : non sono queste le sole indomabili : ve ne sono parecchie altre , che ci forzano a ricorrere parimente a questo estremo rimedio . Finalmente si vede , senza ch' io lo dica , che un punto essenziale in questa cura si è di rivolger le sue mire sopra il fermento celtico , scorfoloso , scorbutico , ec. che ha dato occasione a questo morbo , o che può conservarlo : i mercuriali , i sudorifici , i vulnerarj , e gli antiscorbutici , dopo i rimedj generali , sono i più familiarmente praticati .

Vi è una spezie di carie , che alcuni riguardano come un cancro dell' osso , che addimandasi *spina ventosa* ; è questa una protuberanza dell' osso , situata vicino alla sua articolazione , unita a un dolore profondo , sommamente acuto , e che s' esacerba toccandovi , tuttochè non apparisca talora nella cute alcuna alterazione : tuttavia il più delle volte si vede una gonfiezza nelle parti molli , e il tumore sempre gonfiato : il dolore in queste circostanze , par che si unisca in un punto , non altramente che se una spina pungesse il periossio , e da ciò appunto venne tratta la singolare , e

barbara denominazione di questo male . La medesima infermità, quando non vi si rimedia speditamente, eccita i più orridi sintomi, è sempre lunghissima, e il più delle volte incurabile : ella ha d'ordinario la sua sede nelle ossa spungose del piede, o della mano, e con minor frequenza nelle articolazioni, tanto dell'estremità, che della mascella . I giovani, e i fanciulli, massime in istato di languore, vi vanno soggetti : non ne sono però esenti gli adulti : il suo carattere è d'ordinario scrofoloso : ma può anche dipendere dal celtico, dallo scorbutico, dalla rachitide, ec. La cura è principalmente chirurgica ; s'apre il tumore fino all'osso, e si medica la carie, come le altre . Non debbonsi trascurare i rimedj interni . I purgativi replicati, il guaiaco, il sassafras, ed altri sudorifici ; i mercuriali, ec. sono i più usati : le unzioni, e i fumi mercuriali, e l'impiastrto di vigo, posson dar qualche giovamento . Ma si cava per lo più poco frutto dalla miglior cura, sia interna, che esterna, nè vi è ripiego, che nell'amputazione, la quale è pure infruttuosa, se non si sia corretto il vizio del sangue . Non parleremo in questo luogo della mollezza delle ossa, morbo rarissimo, e ch'è stato descritto dagli Arabi, cui crediamo un prodotto del celtico, e dello scorbutico, benchè faccia testa agli specifici migliori di questi mali : come nemmeno dello sgretollo, di cui parliamo nell'Articolo della seconda di queste infermità.

SEZIONE QUARTA.

Malattie della Pelle.

VIZJ DEL SUDORE.

LA maggior parte delle malattie sommamente variate della cute, sono state tanto moltiplicate dalle frequenti trasposizioni, che avremmo avuto somma briga a fissarvici, se avessimo consultato i soli libri . Non parleremo in questo luogo dell'iterizia, della paralisi, delle piaghe, della scottatura, della cancrena, e d'altri morbi della cute, che abbiamo riferiti ad altre classi : in questa non comprenderemo se non quello, che sem-

sembra, che appartengano alla pelle più propriamente, o che sono indipendenti da ogn'altra affezione: tali sono i vizj del sudore, le malattie pediculari, le tacche, le volatiche, la rogna, e altre fioriture.

Il sudor naturale, o che nasce dal calore dell'esercizio, non è un male, ma il suo istantaneo troncamento può produrne dei gravissimi; e si vedono alla giornata in questa occasione, flussioni d'ogni genere, non meno di testa, che di gola, e di petto, vertigini, affezioni comatose, la tosse, l'oppressione, la febbre, la sincope, la cardiaglia, la colica, le stanchezze, dolori reumatici, artritici, ec. Il troncamento del sudore non è meno da temersi nella febbre: questo la rende più ostinata, e dà sovente occasione ad infiammazioni interne, a deliquj, a convulsioni, alla febbre lenta, all'idropisia, ec. in tutti questi casi bisogna procurare di richiamare il sudore, o di supplirvi con alcun'altra evacuazione: i cordiali, e i diaforetici, il tè, il caffè, il brodo, e altre bevande; il calor del letto, i bagni caldi, quei di vapori, le stufe; l'esercizio del corpo, ec. sono i mezzi più atti a compiere il primo oggetto: le cavate del sangue, i purganti, i diuretici, sono i più favorevoli alle altre intenzioni. Il sudore, che dura poco tempo, non ha niente di pericoloso: quello, che segue in tempo di notte, non nasce sovente, che dalla ripienezza di stomaco, ma l'abituale precipita i pazienti nello spoffamento: è un segno, che fa perpetuamente paura nella febbre lenta, e negli altri casi indica una disposizione ad alcuni mali di languore. Il sudore nelle febbri acute è sovente critico, e salutare, ma talvolta sintomatico: lo che non è malagevole a rilevare. Ognun sa, che le febbri intermittenti terminano nel sudore, quando se ne aspetta il suo fine nel letto: ma quelli che lo abbandonano, non sudano se non perfettamente, o nulla affatto. Non parleremo in questo luogo del *sudore anglicano*, di cui abbiamo ragionato, nè dei sudori freddi comuni a tutte le malattie: non ci fermeremo tampoco sopra i varj colori, e le consistenze del sudore: si sa, che vene sono dei lattiginosi, dei sanguigni, dei gialli, dei paonazzi, dei verdi, e dei neri; degli oleosi, dei colloso, e dei terrei, ec. e che sono il semplice prodotto d'altri morbi. Osserveremo soltanto a questo proposito, che quanto più il sudore si dilunga dal suo stato naturale, tanto più è da temere.

Non

Non vi è , che il sudore abituale , che voglia una cura : versa questa sopra gli addolcenti , e i temperanti : tali sono il latte , le creme d'orzo , e di riso , le emulsioni , i nitrosi , gli aciduli , l'arcano duplicato , la polvere temperante , ec. Vi si usano con vantaggio i lassativi : e i diuretici : si ricorre talvolta alla China , e gli alti febrifughi , per fermare i sudori periodici : per altro i pazienti devono star poco in letto , e starvi leggermente coperti , respirare un'aria fresca , ec. Il sudore di tutto il corpo , ma singolarmente quello delle ascelle , e de' piedi è spesso sommamente fetente : quei di pelo rosso sono soggetti molto a questo incomodo , il quale non è per altro pernicioso , nè vuole alcuna cura : conoscono i Pratici nel vajuolo , e in alcune febbri acute , un sudor fetido , dal quale molto si promettono , anzichè pensino a fermarlo ; ma non giudicano così di quello , che spira un odore cadaverico , d'ordinario segno mortale . Il sudor fetente , che non dipende da altro male , dee correggerfi coll' estrema pulizia : fa di mestieri mutarsi spesso di camicia , ec. lavarsi le ascelle , e i piedi , prendere i bagni , ec. tuttociò , che accresce il grado del calor del sangue , come l'abuso del vino , gli alimenti molto conditi , ec. può rendere questa disposizione più rea : abbiamo già detto , che sarebbe un estremo pericoloso il voler fermare questo sudore , servendosi dell'allume , della limatura di ferro , o di qualunque altro astringente , col quale si spolverizzano lenzuola , ec. e che si è veduto più , e più volte , che una tale imprudenza ha dato occasione alle più gravi infermità .

MORBO PEDICULARE .

Questo è molto raro ; ma tutti coloro , che vivono nella sozzura , possono avere dei pidocchi ; senza avere il morbo pedicolare (*phthiriasis*) . Le polveri d'aloè , e di seme di stasifaglia , per l'esterno sono i rimedj più atti a distruggere i pidocchi : hanno però questi ceduto alla *cervadiglia* , che dai pratici in questa materia vien preferita a tutto ciò , che si usava prima della sua scoperta : il mercurio distrugge tutto , di pari i pidocchi , che tutti gli altri insetti , ma non si può applicarlo a tutte le parti , ne servirsi in tutte le età . I piattoni (*pediculi inguinales*) che risvegliano pruriti insopportabili , s'attaccano alla cute con tanta forza , che si steno .

si stenta affaissimo a distaccarne gli: non occupano questi le sole adiacenze dei membri genitali d'ambi sessi, ma si annidano anche nelle ciglia, e fra le ascelle. La cenere di tabacco, e il sapone nero son topici molto atti a fargli sparire; ma non vi è cosa superiore all'unguento Napoletano, e per lo più non abbisogna la seconda unzione. Si genera molto di rado sotto l'epidermi una specie di pidocchio, o verme, che cagiona estremo pruriginoso: questo è sì picciolo, che talora si sottrae alla vista: addimandasi *Cirone*: d'ordinario occupa la palma della mano, o la pianta de' piedi de' fanciulli, ove eccitata, massime in tempo d'estate, delle pustole o bolle pruriginose, entro le quali si trova annidato: si cava fuori con un ago, o vi s'applicano dei topici amari, e dei mercuriali, per ucciderlo: il decotto d'assenzio, la tintura di mirra, e d'aloe, l'unguento Napoletano, ec. sono adattatissimi a questo effetto: torna bene il farne uso anche dopo, che se n'è estratto il verme, affinchè non se ne riproducano de' nuovi.

TACCHE DELLA PELLE.

Son queste malattie di poco momento: abbiamo parlato altrove delle tacche porporine, e delle scorbutiche; ma in questo luogo non tratteremo, che di quelle, che pajono indipendenti da ogn' altro morbo. Osservansi sopra pelle della faccia, e del collo delle tacche brune talora della larghezza della palma della mano: addimandansi *efelidi*: vi son sottoposte le donne gravide; e non vogliono alcuna cura. Le tacche rosse (*lentigines*) sono assai note, sì nel viso, che nel collo, e nelle mani, e si dileguano con estrema difficoltà: i rimedj, che vi s'impiegano, sono il latte verginale, l'olio di tartaro per deliquio, quello di mirra, ec. si fa uso degli stessi rimedj per le tacche fegatosi (*macula hepatica*) così dette a motivo del loro colore rosso cupo, ch'è quello del fegato: queste sono disuguali, e pruriginose, e occupano più o meno d'estensione del collo, del petto, e del dorso: oltre i topici, queste richieggono dei rinfrescanti, dei depuranti, e altri rimedj, che indicheremo per le volatiche, colle quali pare, che questo male abbia grande affinità. Si può riferire alle tacche della cute anche le abbronzature, che contraggono coloro, i quali stanno giornalmente esposti al Sole: per dileguarle si fa uso del sugo di cedro,

dro, dello spirito di vino canforato, e di varie specie di saponi *cosmetici*: è molto difficile il dire, standosene agli Autori, ciò, che si debba intendere per *esantema*. hanno essi dato questo nome non solo alle tacche della pelle, ma anche a molte sorte d'eruzioni rilevate come ai flitteni, alla porpora bianca, o vescicolare alle pustole del sudore, e ad altre bolle, delle quali fra poco parleremo: nulladimeno è un uso assai comune fra i Pratici il nominare esantemi le semplici tacche senza sensibile elevazione, come quelle dello scorbutico, delle febbri maligne, ec. Gli esantemi presi nel loro senso, essendo sintomi d'un altro morbo, non richiedono cura particolare.

L'*echimosi*, è una macchia, che sembra formata dallo stravassamento del sangue sotto la cute: la più comune nasce dalla contusione: da principio ella è rossa, quindi paonazzetta, e livida; e spesso l'accompagnano il dolore, e la febbre: non è esente da suppurazione, e anche da cancrena. Tuttavia le contusioni non eccitano sempre delle echimosi alla pelle: talvolta non vi comparisce alterazione; ma l'ammaccatura è allora più profonda, e per conseguente più pericolosa, avvegnachè vi si formino degli abscessi, i quali alcuna volta si manifestano un mese dopo; vi sono anche delle echimosi di cagione interna, che riconoscono un vizio scorbutico, o uno stivamento nelle parti vicine. Quelle, che dipendono dalla contusione, di cui già parlammo, hanno, come ben si può vedere, più gradi: per le leggiere se ne lascia il pensiero della guarigione alla natura: le gagliarde richieggono una, o più cavate di sangue: si dà internamente il sugo di cerfoglio, o d'ortica, lo spermaceti, la trementina, gli occhi di granchio, l'antimonio diaforetico, ec. si fa uso esternamente dell'acquavite semplice, o impregnata della palla di Marte, dello spirito di vino canforato col sale ammoniac, del balsamo del Perù sciolto nello spirito di trementina, del balsamo del Commendatore, della storace, ec. Si applica ancora l'impiaastro di spermacetti, dei cataplasmi fatti col poligonato, col linfite, colla bardana, ec. Se sopravviene un abscesso, o la cancrena, si medican col metodo comune. Termineremo ciò, ch'è dobbiam dire delle ammaccature, col fare osservare, che lasciano talora delle macchie, che durano lungo tempo, e che si è provato, che un cata-

cataplasma fatto colla *radice vergine* era proprio per dileguarle.

Chiamerò col volgo *bolle* più specie di fioriture cutanee, infiammatorie, e pustolari, la maggior parte delle quali assomigliansi molto, ma che mostrano d'essere di diverso carattere: io credo, che se ne possano considerare di cinque specie. La prima è quella, che dipende da un certo grado di calore della massa del sangue: si chiama volgarmente *ribollimento*: son queste pustole rosse e in gran copia, che fioriscono sul petto, alle braccia, e nella faccia: sono accompagnate da maggiore o minor febbre, e spariscono cessando la medesima; ma tornando la febbre ricompariscono. La seconda poco differente dalla prima, (*sudamina*) sembra il prodotto del sudore: comparisce sul collo, nelle braccia, e sul petto: è d'ordinario, come il sudore, una conseguenza, o effetto del calor febbrile; ma talvolta si fa vedere, senza che sia preceduta la febbre. La terza, che ha grande affinità colle prime, è quella, che nell'estate cagiona il caldo grande, e l'ardor del sole: i bambini, e i giovani, vi vanno più degli altri soggetti: questa pare indipendente dalla febbre: queste tre specie di bolle, di cui le pustole miliari fanno la cute ruvida, e disuguale, durano poco tempo, o al più quei due, o tre giorni: in alcuni lasciano delle scaglie, come la rosolia, alla quale apparentemente somigliano; e questo è ciò, che ha indotto il *Sydenham* a denominar la febbre, che loro è unita, *febris morbillosa*. Vi è una quarta specie, ch'è soltanto una varietà delle precedenti, in cui le pustole producono delle vesciche, che contengono qualche serosità: molti le hanno chiamate *purpura alba*, a motivo della bianchezza della granellatura, avendo alcune delle precedenti chiamate *purpura rubra*: queste due sorte di porpora, come dicemmo altrove, accompagnano con frequenza le febbri maligne, che per tal ragione diconsi *miliari*, tuttochè una tal fioritura non ne muti il carattere.

La quinta specie di bolle, che dicesi *purpura urticata*, si distingue bastantemente dalle altre per l'estensione dei suoi tubercoli, che per lo più formano larghe placche rilevate, con ardore, e prurito, come se uno fosse stato percosso con dell'ortica, o punto da un gran numero di zanzare: queste cuoprono in un batter d'occhio tutto il corpo, e spariscono in poco tempo, ma-

massime quando s' abbandona il letto; ma risorisccono ben tosto, rientrandovi: questa eruzione dura d' ordinario due, o tre giorni: di rado s' unisce alla febbre: ma talora, comparisce nella febbre maligna, come le precedenti. Tutte queste sorte di bolle vogliono a un dipresso la medesima cura: dopo i rimedj generali, i depuranti, i temperanti, e i diaforetici, sono i messi in opera più familiarmente: nulladimeno si lasciano talvolta passare, senza porvi mano: tanto son questi mali leggieri; ma è bene il saperli, che posson esser segno d' una viziosa disposizione del sangue, e degli umori, che importa sempre il correggere: e molte volte altri si è molto pentito di non averle considerate con questa mira.

VOLATICHE, E PRURITO.

Si sa, che la volatica (*herpes*) è l' ammasso d' un gran numero di pustollette pruriginose, formanti placche più, o meno estese, che hanno pochissimo, o niun rilievo, e che investono la faccia, le mani; e tutte le altre parti: credo, che se ne possano considerare di quattro specie, cioè, la *volante*, la *miliare*, la *farinosa*, e la *corrodente*. La prima, o sia la volatica volante è quella, le cui pustole, staccate le une dall' altre, suppurano, e si seccano in breve tempo: questa è la più semplice di tutte: occupa d' ordinario il viso; e il prurito, ch' eccita, dura soltanto alcuni giorni. La seconda, o sia la miliare, presenta innumerevoli pustollette ammassate; formano queste ampie placche sul petto, sulle reni, all' anguinaja, nello scroto, sopra le cosce, ec. è molto pruriginosa, e scola alcuna serosità, quando si gratta, nel che s' avvicina alquanto alla rogna: si cuopre per lo più di croste superficiali, che allora le fanno dare la denominazione di *crostosa*; è di malagevole guarigione, e risorisce bene spesso, quando si crede dileguata: si acquista portando biancherie, o usando rasoj, che sieno serviti a chi n' era infetto. La terza, o sia la farinosa, è formata da pustole appena rilevabili, e che colla loro unione formano delle tacche rosse, o scure, che si cuoprono d' una specie di farina scagliosa, e bianchiccia: pare, che non sia gran fatto differente dalla miliare, se non fosse che questa seconda, come dicemmo, produce talora delle croste leggieri, ma ugualmente secche, che le scaglie.

La quarta o sia la corrodente , che addimandasi anche *volatica viva* (*serpigo*) è così detta a motivo dell' ulcere , che scava ; questa si cuopre di croste umide , che cadono facilmente , e lasciano delle impressioni nella cute , dalle quali scola una sanie abbrugiante : risveglia gran pizzicore , o bruciore , e lascia delle gonfiezze in quei luoghi , che occupava . Finalmente il pizzicore (*pruritus*) è uno stato della pelle , che s' accosta molto alla volatica : questo è , com' essa , ora secco , ora umido , e vi si formano talora delle pustole in minor numero di quelle della volatica , ma che gemono ugualmente una serosità saniosa : i magri , i biliosi , i melancolici , e i vecchi , sono le persone più sottoposte al pizzicore . Dopo la volatica volante , la meno ostinata è la farinosa ; le altre fanno talora testa a tutti i rimedj . Ci ha fatto spesso vedere la dissezione anatomica , che le volatiche ostinate , come gli altri mali cronici della pelle , dipendevano con molta frequenza da un vizio del fegato ; e l'osservazione ci insegna ogni giorno , come le volatiche più indomabili , per la maggior parte , riconoscevano un veleno celtico , scorbutico , o scrofoloso .

La cura delle volatiche vuol perpetuamente i rimedj generali ; si dee anche far uso frequente dei purganti : si praticano a un tempo stesso gli addolcenti , i rinfrescanti , i depuranti , i sudorifici , e talvolta gli amari , gli aperienti , e gli squaglianti : il latte , e il siero , le creme farinose , e le emulsioni ; il fragolo , la pazienza , il crescione , il fumosterno , e la carlina ; i gamberi , i centogambe , e le vipere ; i marziali , gli antimoniali , e i mercuriali , sono i rimedj più praticati , e dai quali se ne sperimentano gli effetti migliori : sonosi anche con molta riuscita amministrate le acque minerali sì termali , che acidule , e ferrate . I bagni , allorchè la stagione , e le altre circostanze ce ne permettono l'uso , in questo caso fanno gran bene , e sono anche necessarij : gli altri topici più approvati si cavano dalle classi degli addolcenti , e risolventi , dei deterfivi , dei disseccanti , e talora dei cateretici : tali sono la crema , il burro , l'olio d'uova , il cerotto composto d'olio di mandorla dolce , ed i cera bianca , la soluzione del sale di Saturno nell'acqua di piantaggine , le acque di Balaruc , di Plombieres , di Vichy , d'Aix-la-Chapelle , di Baryes , di Bourbonne , e altre

termali; l'acqua marina, o la salata, l'inchiostro comune, ec. Si fa uso grandissimo della pomata col precipitato bianco; di quella, che si prepara collo zolfo, e colla polpa di radice di pazienza, del ponsolice, dell'*album rbasif*, del cerotto di pietra calaminare, ec.: finalmente vi s'impiega, sebben di radissimo, l'arsenico, il sublimato, e gli altri corrosivi: il cauterio, che s'apre a qualche distanza della volatica, ha con frequenza prodotto in cortissimo tempo quello, che non si era potuto ottenere da un uso lunghissimo di tutti gli altri rimedj. Il prurito è talvolta ostinato ugualmente che la volatica: si procura di calmarlo coll'uso interno degli allentanti, dei temperanti, e dei rinfrescanti: coll'applicazione degli addolcenti, e dei rilascianti, come i bagni, ec. Prima di terminare il presente Articolo debbo fare osservare, che in tutti questi casi debbonfi impiegare i topici soltanto dopo d'aver fatto prendere, per un tratto di tempo conveniente, i rimedj atti a purificare la massa del sangue, o a correggerne la rea disposizione: tutti fanno, come coloro, che trascurano questo precetto, espongono ogni giorno i loro ammalati ai più orribili accidenti: questo timore, tuttochè fondatissimo, non dee però gettarci nell'opposta estrema, che è fiancheggiata dal pregiudizio, adottato anche da parecchi Medici; che la guarigione, cioè, di questo male invecchiato, in qualunque modo si acquittato, è sempre pericolosissima: l'esperienza per mio avviso ci dee molto accertare intorno a ciò, non essendo raro l'incontrarsi persone, che sono state liberate dalle volatiche, che avevano portate lunghissimo tempo, e che godevano tuttavia la miglior sanità del mondo.

LA ROGNA.

Rende questa la pelle disuguale con assai rilevabili pustule, e si sparge per tutto il corpo, ma con più particolarità nel polso, e fra le dita: il volto però: che è la sede ordinaria delle volatiche, va esente dalla rogna. Si fa, che eccita un pizzicore grandissimo, e che si comunica per le biancherie, per gli abiti, ec. colla maggior facilità del mondo: non è sempre facile il distinguerla ne' suoi principj da quelle fioriture pustolari, da noi comprese sotto il nome di *bolle*: tuttavia la lontananza della febbre, la sua durata, le pustole, che non lasciano di comparire fra le dita; l'ec-

cessivo pizzicore , che le accompagna , e finalmente il contagio , non ci dà luogo di equivocare . E' noto , che la rogna (*scabies*) di pari che le volatiche , e il prurito , è umida , e secca : la prima , meno pruriginosa , forma delle ulcerette cutanee , che gemono marcia , o sanie , e si cuoprono d'una crosta , che cade a brani : la seconda , o sia la secca , geme parimente qualche sanie , che si cangia parimente in crosta ; ma rimarrebbe nella sua aridità , se non si grattasse , lo che invita a fare a ogni momento il suo estremo prurito : sì l'una , che l'altra sono superficialissime , e non oltrepassano la pelle . La rogna si prende comunemente per contatto ; ma la sporcizia , e le abitazioni umide possono ugualmente produrla : dipende anche alcuna volta da una cagione interna , come dal malfrancesco , dallo scorbutico , dalla quartana , dai mali del fegato , ec. La rogna recente acquistata per contatto , o per l'immondezza , si cura molto facilmente , massime se è umida , e che il soggetto non sia vecchio ; ma l'invecchiata , o che nasce da cagione interna , è più ostinata , e può anche degenerare in lebbra . Se in queste circostanze si fa bruscamente rientrare , può produrre i più orridi sconcerti , come la febbre , la tosse , l'oppressione , la tifezza , l'epilessia , l'apoplessia , ec. La cavata del sangue , i purganti , i diuretici , e i sudorifici , possono impedire i divisati accidenti , e rimediarvi ; come altresì i bagni caldi , i sinapismi , i vescicanti , ec. Si è anche fatto uso internamente in tale occasione dei fiori di zolfo , del mercurio dolce , ec.

E' noto , che lo zolfo , non meno preso per bocca , che come topico , è lo specifico della rogna : la pomata comune , che se ne prepara , della quale si fa uso per tre , o quattro giorni , dopo d'aver fatto precedere i rimedj generali , la porta via facilmente , quando non è molto invecchiata : negli altri casi , bisogna prima di por mano allo specifico , fare un lungo uso dei temperanti , dei depuranti , degli amari , e degli aperienti ; dei sudorifici , e dei purganti : la cicoria , la borraia , il fumo-terno , la pazienza , i luppoli , la scabbiosa , la pimpinella , i gamberi , le vipere , i centogambe sembrano i più appropriati , e più usati ; ai quali bisogna aggiungere il latte , quando lo stato dello stomaco , e le altre circostanze ne permettono l'uso . Molti considerano ancora il mercurio preso per bocca ,

Come un efficacissimo rimedio ; ma secondo ciò , che mi è sembrato , non conviene , che alla rogna venerea : se è riuscito in alcuni altri casi , non bisogna concluderne , che sia ugualmente sicuro , che lo zolfo : le acque termali non meno per uso interno , che esterno , hanno sovente domato le rogne , che avevano fatto testa a tutti gli altri rimedj . Finalmente si fa grand'uso de' bagni domestici , e d'altri , prima , e dopo la cura : la canfora , il litargirio , il sale di Saturno , il sapone nero , l'olio d'uova , e di carta ; l'olio di tartaro per deliquio , il nutrito , l'unguento di pazienza , e la pomata mercuriale , dopo lo zolfo , sono i rimedj più usati .

ROGNA LEBBROSA .

Questa pare l'ultimo grado di quella , di cui ora abbiamo trattato , e la disposizione prossima alla vera lebbra : in questa le pustole sono confluenti , e formano delle specie di grappoli , che cuopronsi di scaglie , e che esalano per lo più un reo odore ; ma ciò , che la caratterizza anche meglio , sono i tubercoli mobili , indolenti , e scirrofi , che si manifestano particolarmente nella faccia , parte , come dicemmo , rispettata perpetuamente dalla rogna ordinaria : oltre a ciò si patiscono dolori per tutto il corpo ; la voce irrochisce , i denti divengono neri , le ossa si gonfiano , ec. Dal detto fin qui si vede , che la rogna lebbrosa (*impetigo*) non si limita , come l'altra , alla pelle , ma che penetra più addentro ; e che non sembrerà maraviglioso a quei , che fanno , esser d'ordinario il prodotto del celtico , e dello scorbutico .

E' agevole il giudicare , ch'è difficile a curarsi , massime se si lascia di ricorrere a gli specifici delle malattie , dalle quali prende la sua origine : i purganti , le preparazioni mercuriali , i sudorifici , e gli antiscorbutici ; le acque termali , e le ferrate , vi si usano familiarmente , per non parlare di parecchi altri rimedj da noi indicati nell'Articolo precedente . Finalmente abbiamo veduto per la specie di rogna , di cui qui parliamo , degli ottimi effetti dall'acqua marina , cioè de' suoi bagni ; ma bisogna praticargli per lungo tempo , ed è anche necessario l'aver fatto precedere le altre preparazioni .

L' ELEFANTIASI: /

La lebbra considerata, come un male della pelle, è una specie di rogna scagliosa, e crostosa, sparsa per tutto il corpo, e orribile a vedersi: non vi è dubbio, che sia stata data tale denominazione un tempo al malfrancese, di cui era ignota la natura, e la cura; ma non è meno certo, che la lebbra esiste indipendentemente da questo male. La lebbra, come abbiám detto, esiste indipendentemente da questo morbo. E' una specie di cancro universale, che si manifesta dalla pelle untuosa, gonfia, aggrinzata, disuguale, e screpolata, dalle mani, e dai piedi tumefatti, di pari che i gomiti, e le ginocchia, che anche sono con frequenza i primi investiti: si osservano sì nel viso, che nelle altre parti tubercoli lividi, e scirrofi, che d'ordinario s'aprono, e prendono un carattere canceroso. Veggionsi in questo stato ulcere fagedeniche profonde, e callose, le quali non hanno senso, a segno tale, che vi si possono immergere gli aghi, senza che i pazienti ne sentano il menomo dolore: bisogna aggiungere a questo la caduta dei capelli, e d'ogni altro pelo, il volto piombino, le labbra stivate, e screpolate, lo sguardo truce, e talvolta la satiriasi: il sudore, e il fiato sono fetenti, le ossa si cariano, il naso, le dita delle mani, e dei piedi putrefannosi; per non parlare di molti altri sintomi, che son comuni allo scorbutico, e al malfrancese, de' quali la lebbra può essere il prodotto. Si denomina *elefantiasi* quella, ch'è limitata alle gambe, che ne sono gonfie, livide, e nericce, gremite di croste scagliose, d'ulceri varicose, ec. L'*elefantiasi* non è più sanabile della lebbra; e io ho osservato, che non ne andavano esenti coloro, che vivevano nella maggior abbondanza, e agiatezza.

Dopo i rimedj generali, i rinfrescanti, i nitrosi, i depuranti, gli antiscorbutici, i sudorifici, lo zolfo, il mercurio, ec. sono quelli, ai quali ci appigliamo, ma dai quali non se ne cava molto prò. I topici preparati collo zolfo, e col mercurio, ec. vi si possono parimente impiegare, per non far parola di quelli, che sono indicati dallo stato delle piaghe. Finalmente tutti i rimedj da noi indicati nell' Articolo della lebbra, posson esser riferiti al presente; ma non è gran fatto certa la loro riuscita.

L'A RESIPOLA.

Si fa , avervene di più specie ; che la più comune principia d'ordinario dai brividi , e dalla febbre , e non si manifesta , se non dopo alquanti giorni coll'infiammazione alla cute d'un rosso lucido , ma che divien bianco toccandovi : è dolorosa , e scottante : vi s'alzano sovente delle pustule , o flitteni , come nella scottatura : è noto parimente , che la resipola cresce con somma speditezza , che spesso muta luogo , e che dura quei sette , o otto giorni , in capo ai quali la pelle diviene scagliosa : il volto , e le gambe sono le parti più esposte a questo male : si chiama *zoster* la molto rara resipola , che abbraccia il corpo , come una cintura . La febbre nelle resipole ordinarie dura pochi giorni ; ma nei soggetti di reo carattere è molto più lunga , e accompagnata da tristi sintomi ; diciamo meglio : la resipola allora è un sintoma della febbre putrida , maligna , o pestilenziale : in queste circostanze , verso il quarto giorno del male , e spesso anche più tardi , compare questa fioritura , come quella della rosolia , e del vajuolo : allora scema la violenza degli altri sintomi , dura più della resipola ordinaria , e termina talvolta nella suppurazione , o nella cancrena . Dannosi ancora *flussioni resipelacee* , che pajono d'altro carattere : queste si dileguano con frequenza in uno , o in due giorni , ed anche senza rimedj ; ma quelle , che dipendono da uno stivamento edematoso , che occupano le adiacenze delle piaghe , durano di vantaggio . Si osserva parimente una specie di resipola universale , che eccita delle pustule pruriginose per tutto il corpo , le quali si mutano in iscaglie , e che cadendo lasciano un segno rosso , che dura 'alcun tempo : questa investe sovente coloro , che trasmodano nel vino , e nei liquori : talora addimandasi *resipola bollata* ; ma ve ne ha un'altra specie , che può ricever la stessa denominazione con maggior proprietà : si dice *rossalia* : non investe questa che i fanciulli , e i giovani : quest'ultima si manifesta nei primi giorni con pustule , poco diverse da quelle della rosolia ; ma le tacche , che loro servono di base , si stendono , e s'uniscono per coprire il corpo : una verace resipola , che si dilegua verso il nono giorno della malattia , e lascia la pelle piena di scaglie : questa fioritura è da temersi più della rosolia , colla quale :

quale talvolta vien confusa : è anche stata considerata da alcuni Autori, come una specie di vajuolo ; ma comunemente non se le dà alcun nome particolare , come a molt'altre malattie della cute.

Il temperamento sanguigno , e il bilioso , il calore dell'aria eccessiva , l'esercizio trasmodato , le vigilie , le passioni violente , l'abuso del vino, e dei liquori , ec. son le cagioni più frequenti delle resipole. Investono queste molto familiarmente gli scorbutici : in tal circostanza durano di più , e si convertono talora in ulcere ottinatissime in un'età avanzata , massime nelle gambe. La resipola del volto, e della testa è tanto più pericolosa, quanto n'è considerabile l'enfiagione: quella , che ha la sua sede nelle parti glandulose , e singolarmente nelle mammelle , è la più trista. Lo *zoster* è pure tenuto per orribile : finalmente ognun sa , che il tornare indietro della resipola , specialmente se occupa la testa, può risvegliare i più formidabili accidenti.

Le cavate del sangue non s'addicono meno alla resipola , che all'altre infiammazioni : se ne regola il numero sopra il grado della malattia , che varia infinitamente : si fa quanto basta , che il sangue , che si cava , è sovente infiammatorio. I temperanti, gli allentanti, e gli addolcenti, come il brodo di pollo, il latte , il siero , l'emulsioni , l'acqua lattea, ec. sono i rimedj più usati : i diaforetici , dei quali si fa grand'uso nei paesi settentrionali , non fanno bene nei climi temperati, ove i rimedj caldi e i freddi in questo male sono di pari sospetti : possiamo tuttavia amministrar i primi , quando si teme , che la resipola torni indietro ; accidente , come dicemmo, sempre da temersi. I purganti non s'addicono gran fatto , se non sul terminare della malattia ; ma sul principio si può amministrar l'emetico , quando lo richiegga lo stato delle prime vie ; ed è sempre vantaggioso il tenere il corpo obbediente con li mezzi a tutti noti : nulladimeno lo stato delle prime vie, il delirio , l'affezione comatosa, ec. non ci lasciano aspettar sempre il tempo indicato per li purganti : necessarij bene spesso sono i calmanti , non meno per attutare i dolori , che per riparare alla vigilia ; ma fa d'uopo schivarne l'abuso : i vescicanti, e alla schiena, che alle cosce, e alle gambe, sono appropriatissimi , quando ci proponghiamo di disimpegnar la testa, o di difenderla, se venga minacciata.

S'applicano sulla parte dei risolventi , come l'acqua di fior di sambuco , lo spirito di vino canforato , l'acqua di calcina , ec. Si prepara coll'acquavite , colla triacca , e con gli aromati una pirtima , usata familiarmente dal *Sydenham* . Il *Riviera* si serviva d'un decotto fatto colla salvia , e col sapone di Venezia . Si debbono schivare i reperlivi , i rinfrescanti , e i narcotici , come rimedj dannosissimi : i grassi , gli oli , e le mucilaggin debbonfi parimente bandire : tutti quei topici , ai quali ricorre il popolo , e alcuni ignoranti , hanno sovente cagionato il dare indietro della resipola , o la cancrena . La resipola della faccia non vuole alcuna applicazione , qualora non tendesse alla suppurazione , o alla cancrena . Quando la resipola non fa i suoi ordinarij avanzamenti , e che si dilegua innanzi tempo , si dee procurare di prevenire gli accidenti , dei quali si vien minacciati , non solamente con i cordiali , e con i diaforetici , ma ancora coll'applicazione dei vescicanti ; e questo secondo mezzo è per avventura il più sicuro . Finalmente s'impedisce il ritorno di questo male , allorch'è riconosciuto per abituale , con le cavate del sangue , e con i purganti miti , con i temperanti , e con i depuranti , con gli aperienti , e con gli antiscorbutici ; col latte , con le acque minerali , acidule , ec. per non far parola dei bagni , che sono anche nati fatti per questo effetto .

LA SCARLATTINA .

Questa si manifesta per gli esantemi , o per tacche rosse , che cuoprono tutto il corpo . Una tal fioritura vien preceduta dai brividi , e dalla febbre , dal dolore di testa , e dalle ansietà , dal dolore , e dal rossore degli occhi , dalla gravezza delle palpebre , e dal lagrimamento , dal mal di gola , dalla roccaggine , dalla tosse , dall'oppressione , ec. Verso il quarto giorno le tacche compariscono sul volto , e poscia sul tronco , nell'estremità : da principio son separate ; ma si uniscono in brev'ora , stendendosi , e la cute ne rimane alquanto tumefatta . Questi esantemi si dileguano verso il terzo giorno , e lasciano , dileguandosi , come l'altra fioriture , un' asprezza scagliosa nella pelle ; di modo che in tutto , questo male dura quei sette giorni incirca . Di tutte l'eruzioni cutanee non vi è , che questa , la resipola , la rosolia , e il vajuolo , che abbiano un tem-
mine

mine prefisso, sì pel principio, che per la durata. La scarlattina, come la resipola, è talvolta miliare, o vescicolare, e allora dura di vantaggio, perchè l'uscita delle pustule non segue, se non quando il roffore è sul punto di dileguarsi: alzanfi anche in alcuni delle vesciche più grosse di quelle, delle quali abbiamo parlato, non meno sul dorso, che sull'altre parti. La febbre scarlattina non investe per lo più, che i fanciulli, e i giovani, specialmente le ragazze, e le donne, che sono oppilate, o che hanno i loro menstrui disordinati: ella è con frequenza epidemica, come la rosolia, colla quale pare, che abbia molta affinità. Il male, di cui parliamo, non è gran fatto da temersi; ma ree possono esserne le conseguenze, singolarmente per i fanciulli; conciossiachè lasci talora delle ostruzioni, e degli stivamenti, che non cedono facilmente ai rimedj: allora si gonfia il ventre, ed offre una disposizione prossima all'idropisia; tuttavia questi accidenti debbonfi comunemente riferire a una rea condotta, quasi ugualmente da temersi in questa malattia, che nella rosolia, e nel vajuolo.

La scarlattina vuol pochi rimedj: la cavata del sangue sul principio talora è necessaria: ella può altresì convenire dopo la fioritura, se lo esigano lo stato del polso, e quello della testa; e io non ho veduto in questo caso, che abbiala fatta rientrare, come si persuade la volgar gente. In tutto il corso della malattia si dee fare un grand'uso degli allentanti, e dei temperanti: si posson dare altresì in alcune occasioni leggieri diaforetici, ed altri rimedj adattati alla rosolia. Si rimedia alle affezioni comatose, e convulsive con i vescicanti al dorso, e alle gambe, con purganti, ec. Non s'amministrano questi secondi però, che sul fine della malattia; cioè, al cader delle scaglie, ed anche si replicano per impedire le da noi indicate conseguenze; e una tale precauzione non è meno necessaria in questo caso, di quello s'ialo nelle malattie, delle quali siamo per ragionare.

LA ROSOLIA.

Non seguirò in questo luogo l'uso ordinario, ch'è di comprendere in uno stesso Articolo la rosolia, e il vajuolo: mi sembrano due mali in fra se così distinti, non meno pel loro carattere, che per la loro carriera,

come lo sono le malattie precedenti, delle quali perciò appunto abbiamo sempre trattato separatamente: la rosolia (*morbilli*) e il vajuolo, cominciano tuttavia a un di presso nella guisa stessa: spesso è malagevole il distinguergli nel loro primo dar fuori; di modo che i Medici più sperimentati, se non son determinati dall'epidemia, che domini, stentano a pronunziare sopra l'uno, o l'altro di questi due mali: nulladimeno le tacche lenticolari, o le pustule della rosolia, sono d'ordinario molto più numerose, che nel vajuolo il più confluyente; e io credo esser questa la sola differenza molto sensibile, che si possa rilevar nella pelle: ma si sa, che dopo questi primi giorni, ciascuna prende un aspetto affatto diverso, e che non lascia motivo ad equivocare. La rosolia per lo più comincia con i brividi, seguiti dal caldo: questi talvolta succedonsi a vicenda nel primo giorno: quindi la febbre predomina, la testa s'aggrava con voglia di vomitare, le palpebre si gonfiano, gli occhi divengon lagrimosi, e sfavillanti: si ha mal di gola, e si tosse, senza spurgarsi: finalmente il languore, e le ansietà, lo starnutire, il dolore ai lombi, il vomito, la colica, lo scioglimento del ventre, e l'emorragia, sono i più ordinari segni, che annunziano la fioritura. Questa si manifesta solo sul quarto giorno del male per mezzo di tacche lenticolari, o pustule poco rilevate, unite insieme a foggia di grappoli, che formano sopra la pelle un' asprezza, che si scuopre agevolmente toccandovi: è noto, che queste pustule non suppurano, che cominciano a comparire sulla faccia, che quindi si spargono sul petto, e sulle altre parti, come nella scariattina, e nel vajuolo: la fioritura di quest'ultimo scema i sintomi; dove per l'ordinario sussistono dopo quella della rosolia, che dura solo due, o tre giorni, come la scarlattina: le pustule del male, di cui parliamo, lasciano, seccandosi, delle scaglie, o una specie di farina sopra la pelle. Non solamente la febbre, la tosse, e l'oppressione possono durare anche per qualche tempo dopo il dileguamento delle pustule; ma inoltre può sopraggiungere la peripneumonia, la diarrea, e altri accidenti gravissimi. Vien fatto menzione d'una specie di rosolia, ch'è il sintoma d'una febbre, che dura quattordici giorni, chiamata dal *Sydenham febris morbillosa*; ma questa fioritura non sembra diversa da quella, di cui abbiamo parlato altrove.

E' no-

È noto, che la rosolia, alla quale vanno più soggetti i bambini, e i giovani, di rado è pericolosa, qualora non la renda tale o la rea regola dei pazienti, o la cattiva medicatura. Quando la tosse, che l'accompagna, è violenta, e che si è fatto uso dei rimedj caldi col pretesto di sollecitarne l'eruzione, può dar motivo all'infiammazione del petto, degenerare perfino in tifichezza, o in qualunque altro morbo di languore. Si fa buono augurio delle pustule rilevate, che seguono l'ordine del tempo da noi indicato: per lo contrario si teme la fioritura innanzi tempo, di pari che la troppo lenta, il suo continuare oltre il quarto giorno, le tacche, le quali anneriscono, ec. Abbiamo veduto per le dissezioni anatomiche le viscere, sì del petto, che del basso ventre gremite di pustule somiglienti a quelle della cute.

Nella cura della rosolia, come in quella dell'eruzioni precedenti, e in quella, che segue altresì, non ci proponghiamo, che di palliare la malattia, non essendo in poter nostro l'abbreviarne il corso. Se vi è cosa, che ci possa porre a coperto dei rei sintomi, e degli accidenti, che l'accompagnano, si è la cavata del sangue, e l'emetico, amministrati sul bel principio del male: le numerose cavate di sangue, quando la violenza della febbre, l'oppressione, l'infiammazione del petto, o della gola non le richieggiono, non solamente sono inutili, ma ancora dannose: è raro, che ci convenga farne fare la terza. I falli, che si commettono, non meno nella rosolia, che nel vajuolo, col moltiplicarle, ugualmente che negli altri rimedj, son tanto comuni, ch'è impossibile il dissimulargli. Si è più d'una fiata osservato, e in luoghi diversi, come queste infermità, lasciate affatto in balla di se stesse, o della natura, erano riuscite manco micidiali, di quelle state fossero, medicate secondo il metodo ordinario. Sanno ciò i Medici prudenti, e sperimentati, e ne fanno ben profitte.

Gli allentanti, e i temperanti sono i rimedi messi più in opera, e i meno da temersi; possono dare alcuno ajuto parimente i nitrosi: i cordiali, e gli alexiterj, che un tempo vi s'impiegavano a man salva, rarissime volte son necessarij; ma si stenta talora assai-fimo a far testa all'opinione del volgo, che vuole ostinatamente anteporgli ad ogni altro rimedio. Se l'espe-
rien-

rienza ha fatto conoscere, ch'erano dannosi, o pericolosi nel vajuolo, ci ha altresì fatto toccar con mano, che potevano far mali maggiori nella rosolia: fa però di mestieri eccettuarne i leggieri diaforetici, come la scorzonera, la borrana, i fiori di papavero erratico, o salvatico, e somiglianti, che fanno entrare d'ordinario nella bevanda comune. Si ricorre ai bechici addolcenti, e anodini, allorchè i pazienti vengon molestati soverchio dalla tosse; al decotto bianco, e al diascordio, quando sembra eccessivo lo scioglimento del ventre: ai più semplici lavativi; allorchè si teme lo stato contrario: agli antispasmodici, sopravvenendo le convulsioni; e finalmente ai narcotici, quando vi ci forzano le vigilie, la tosse eccessiva, e i dolori: questi ultimi però debbon essere amministrati con grandissima prudenza, dicasiene pure ciò che vuole il gran *Sydenham*, che ne faceva un uso troppo familiare: quando si tratta dei bambini, dobbiamo perfino astenercene affatto: si ripara al male della gola per mezzo di gargarismi addolcenti, e con dei cataplasmi rilascianti: si sciaguatano gli occhi coll'acqua di rose, e di piantaggine, ec. Accade alcuna volta, che la fioritura si dilegui, e sparisca tutt'in un subito, e prima del termine da noi indicato poc'anzi: in tal caso si procura d'impedire gli accidenti, dei quali venghiamo minacciati, colle cavaute del sangue, con li vescicanti, con li purganti, con i diaforetici, e con li cordiali. Ultimamente dobbiamo fare osservare, che i pazienti non debbon si cuoprire più di quello si fossero prima d'essere investiti dalla rosolia: molti e molti, non meno in questa infermità, che nel vajuolo, sono stati, e tuttora sono alla giornata le vittime del maledetto pregiudizio contrario. Finalmente ci ha insegnato l'esperienza, che si deve terminare questa cura con purganti replicatamente amministrati, e non vi è cosa più ovvia dei malori, che sono venuti addosso a coloro, che hanno ciò trascurato.

DEL VAJUOLO.

La maggior parte degli Autori, che hanno trattato del vajuolo (*variole*) mi sembra, che abbiano stabilito troppa differenza fra il *discreto*, ed il *confluente*; ed una tal distinzione, soverchio inoltrata, s'io non vado errato, ha somministrato delle false idee dell'uno, e dell'altro. Non ignorano i saggi Pratici, non esser que-

sti,

fi, che varj gradi dello stesso morbo, e che, malgrado tutto ciò, che ne vien detto, si vedono anche con molta frequenza dei vajuoli discreti più rei, e pericolosi dei confluenti, non meno pel numero delle bolle, che per la violenza dei sintomi. E' malagevole il dare una Storia esatta di tuttociò, che segue nel vajuolo, a motivo delle varietà innumerabili, a cui va soggetto: le pustole solitarie d'ordinario sono più sollevate; ma l'enfiagione generale è più considerabile nei confluenti: è noto, che le bolle del vajuolo s'alzano sopra tutta la superficie della pelle, non eccettuandone la palma della mano, la pianta del piede, e le parti genitali; investono ancora il globo degli occhi, di pari che le cavità del naso, della bocca, e della faringe. Il *Sydenham* ha denominato *regolare* il vajuolo, che non ha seco alcun reo sintoma, e *irregolare* quello, che comparisce con ciò, che intendesi coll'espressione di segni di *malignità*.

L'uno, e l'altro vengono annunziati dai brividi, e dalla febbre, dal dolor di testa, e di schiena, da stertuti, dal sopimento, o dal delirio, da nausea, o dal vomito; dalla cardialgia, e da stanchezze; dalla colica, dall'orina ardente, ec. La fioritura, sovente pruriginoso, è d'ordinario preceduta dal sudore più, o meno manifesto: le prime pustole compariscono sul volto, e nel petto, verso il quarto giorno, e prima, quando debbon essere confluenti: questa fioritura spunta la febbre, o la fa intieramente cessare: talvolta accompagna la P'emorragia, ma con maggior frequenza nei bambini, che negli adulti: gli occhi non soffron la luce, e talvolta si chiudono a motivo del prodigioso stivamento delle palpebre: l'enfiagione della faccia, del collo, e delle altre parti, talvolta è estrema; e in tal caso pare, che serva di base alle pustole confluenti una resipola universale. I pazienti in tali circostanze si lagnano d'una difficoltà d'inghiottire, e hanno una salivazione più, o meno copiosa; questa ha soltanto luogo negli adulti, avendo i bambini in quella vece la diarrea: il polso s'innalza, e nel tempo della suppurazione si fa più frequente: questo è ciò, che si è creduto a proposito di chiamare *febbre secondaria*, che molti, sedotti da tale denominazione hanno voluto considerare, e medicare, come una febbre putrida, senza saper gran fatto in che consista questa putridezza: tuttavia nella più parte dei confluenti la febbre non cessa dopo la fioritura, e si rinforza sol-

tanto nel tempo della suppurazione: abbiamo detto, che il delirio, e il sopimento talvolta precedevano l'eruzione; ma questi sopravvengono anche negli altri tempi, di pari che le convulsioni, lo scioglimento del ventre dissenterico, ec. Le croste cadono fra il duodecimo, e il decimoquinto della malattia: i pazienti periscono un poco avanti di tal caduta, cioè dall'undecimo al decimoquarto.

Il vajuolo, com'è noto, è più da temersi in un'età avanzata, che nell'infanzia, e nell'adolescenza: si distingue bastantemente il pericolo all'ispezione della faccia, e allo stato del petto: non vi è chi non sappia, che l'enfiagione estrema del collo, e della testa coperta d'un prodigioso numero di pustule, come altresì l'oppressione, son sempremai da temersi. Se la fioritura spunta nel primo, o nel secondo giorno del male, si può francamente accertare, che sarà gravissima: niente meno dobbiamo farci paura della troppo tarda; le bolle ben rilevate, e infiammate ci fanno molto sperare: si temono per lo contrario assai le cristalline, le picciole, le livide, le picchettate di nero, e le appassite: non ci fa minor paura il loro tornare indietro, e l'accasciamento dell'enfiagione, che loro serviva di base. La febbre, che dopo la fioritura si mantiene, annunzia il pericolo: è ancora imminente, allorchè si distingue nell'intervallo delle pustule una specie di volatica miliare, dei granelli di rosolia, delle tacche porporine, e cancrenose; quando annegriscono la lingua, e le labbra, ec. Le orine sanguigne, come le altre perdite di sangue, sono da temere negli adulti, e singolarmente per gli scorbutici; ma il flusso menstruale, che sopravviene nel corso di questo morbo, non è seguito da alcuno accidente: i gran sudori sul principio danno reo augurio, massime se allora il polso è debole. Son da temersi lo scioglimento del ventre, e lo stato contrario; ma più il primo, che può dare occasione all'appassimento delle bolle. Si fa ancora un reo presagio delle dejezioni verdastre, dissenteriche, ed estremamente fetenti; dell'iscuria, della disuria, ec. Si noverano fra gli accidenti gravi le convulsioni, che sopravvengono dopo la fioritura, o nel tempo della suppurazione: la salivazione troncata negli adulti, e la diarrea nei fanciulli, posson produrre effetti formidabili: non son meno orribili quelli, dei quali si è minacciati dopo il termine del morbo: è no-

to, come si formano delle deposizioni purulente, non solamente sopra le parti esterne, ma eziandio sul polmone, e nelle altre viscere; che sopravvengono cancrene, e carie, delle quali di radissimo si guarisce; che si perde la vista, l'udito, l'uso delle gambe, ec.

Dall'esposto fin qui risulta, che il vajuolo è un morbo de' più micidiali: l'*inoculazione* praticata altrove con molta riuscita, è il solo mezzo, che possa troncargli il corso a questa mortalità: ci giova sperare, che una volta s'apriranno gli occhi delle persone, e che il ben pubblico la vincerà a fronte delle mire, e dell'interesse d'alcuni privati. L'apertura dei cadaveri ci fa sapere, come le viscere si cuoprono di bolle somiglianti a quelle della pelle; se ne son vedute in gran copia sopra la superficie del polmone, nei bronchi, sul fegato, sulla milza, sul pancreas, sopra gl'intestini, ec. Si sono incontrati stivamenti, infiammazioni cancrenose, e putrefazioni in varie parti. Il cervello, e il cerebello son comparsi talora estremamente molli, e accasciati: i loro vasi stivati, e varicosi: si è trovato il cuore inaridito, lo stomaco esulcerato, l'epiploon distrutto, ec. Sonosi finalmente osservati stravasamenti serosi, o sanguigni, non meno nella testa, che nel petto, e nel basso ventre.

Vi è un'altra specie di vajuolo, che si chiama volante (*variole nothæ*) che ha minore affinità con quella, di cui abbiamo parlato, che colla rosolia, e colla scarlattina, che ha la stessa durata: le bolle però di questo vajuolo si affomiglian molto a quelle dell'altro; ma se vi si fa una leggiera attenzione, si rileva esser cristalline; cioè, che la loro punta è formata da una vescichetta, che contiene della serosità: questa eruzione è preceduta da una febbre assai leggiera: termina in tre giorni, nè richiede, che il governo, gli allentanti, ed una, o due purghe nel fine del male.

La cura del vajuolo ordinario dee essere ugualmente semplice, che quella delle fioriture precedenti; ma gli accidenti, che l'accompagnano, richiedono ajuti sommaramente variati: una, o due cavate di sangue, l'emeticò, ovvero un purgante, sono nel principio tutto il meglio, che si può fare: le numerose cavate di sangue, che alcuni Medici, che hanno voluto singolarizzarsi, hanno introdotte, in questo caso sono in estremo sospette: col loro ajuto si pretende schivare lo stivamento dei vasi, e l'emorragia; ma non s'impedisce nè l'

uno,

uno, nè l'altra, e io ne giudico sopra le stesse loro osservazioni: tuttavia l'oppressione, la salivazione troncata, ed alcuni altri gravi accidenti, vogliono la cavata del sangue, anche senza aver riguardo al tempo del male: il *Sydenham* non temeva di far cavar sangue nella febbre secondaria, quando lo esigevano i sintomi; ma questa evacuazione non conviene quanto vien creduto; quando le orine sono sanguigne, quando gli sputi son tinti, e nè anche nell'emorragia: ella si è ancora più pericolosa, quando vi sono dei segni di ciò, che addimandasi malignità. In tutto il corso di questo morbo si dee far uso d'una bevanda copiosa fatta col *dente di cane*, colla *scorzonera*, colla *borrana*, con li *fiore di papavero rosso*, colla *regalizia*, colle *lenti*, ec. Quando la sete è estrema, si può dare il brodo lungo di pollo, e di vitello, le emulsioni, la limonata, ec.

I purganti, allorchè il vajuolo batte la sua carriera ordinaria, non si debbono amministrare, se non se all'cadere delle croste; e importa molto il replicargli più fiate, per porsi a coperto delle ree conseguenze di questo morbo: è però permesso il dilungarsi da questa regola, quando lo stato delle prime vie, e gli accidenti, non permettono d'aspettare il tempo indicato. L'enfiagione prodigiosa del collo, e del volto sempre mai pericolosa, vuole, che si tenga il ventre obbediente col siero, colle prugne, colla cassia, ec. o con i lavativi atti a tal effetto: la pronta cessazione del flusso della bocca vuole onninamente i purganti, e le cavate del sangue; ma fatte eccezioni non giustificano l'enorme abuso, che fanno a' dì nostri alcuni Medici di questo rimedio; e per tal motivo seguono alla giornata sconcerti, dai quali è maraviglia, che non sieno colpiti li più prevenuti contro il prudente metodo degli Antichi: nulladimeno si può mantener libero il ventre con i lavativi; e non veggio, che questa pratica, contro la quale molte persone si riscaldano, abbia mai prodotto rei effetti. Il *Sydenham*, che considerava la costipazione vantaggiosissima in tutto il tempo della suppurazione, non era esente da fissato pregiudizio.

I narcotici posson talvolta aver luogo nella cura del vajuolo; ma non credo, che si possa imitar l'esempio dell'Autore, pur ora citato, il quale dopo il compiuto fiorimento dava il diacodio due, o tre volte il giorno, e perfino nel delirio: questo rimedio veramente è at-

tissimo.

tissimo a riparare nel tempo della suppurazione ai dolori, e alla vigilia; ma dobbiamo sempre praticarlo con riserva, essendosi spesso osservato, che conserva la febbre, e il delirio, e che costipa. I bechici addolcenti, e anodini s' impiegano contro la tosse troppo frequente, da cui sono talora tormentati i pazienti. Si fa uso dei temperanti, e dei nitrosi, della ptisana di consolida, del brodo di riso, delle emulsioni ec. Quando si ha motivo di temere l'emorragia, non vi è difficoltà di fermarla con topici astringenti, e stittici: si ricorre ai cordiali, e agli aleffiterj per la fioritura tarda, per l'abbattimento delle bolle, e per la debolezza del polso: il vino d'Alicante, o tutt'altro simile, in queste occasioni mi è sembrato migliore di tutte le medicine delle botteghe; cioè, della polvere della Contessa di Kent, di quella di vipera, dello sciroppo di acetosa, del giglio, delle confezioni, ec. Si praticano i nitrosi, e gli assorbenti contro lo scioglimento del ventre; ma l'emetico, che in questi casi non si amministra con bastante fidanza, è il rimedio più appropriato a tale accidente: quindi si può vestirlo con gli stomachici astringenti, cioè, colle rose rosse, col sommacco, colla scorza di mela granata, col sangue di drago, ec. ai quali s'uniscono i calmanti. Bisogna però osservare, come questa pratica non riguarda i fanciulli, ai quali lo scioglimento del ventre è ugualmente salutare, che la salivazione agli adulti. S'amministra la canfora, e gli acidi per l'orina sanguigna; il dente di cane, la cicoria, la parietaria, il sale del Glanbero, e lo spirito di sale dolcificato per l'iscuria: la polvere di gutteta, e altri antispasmodici per le convulsioni: lo spirito di verriolo, e altri antiputridi, allorchè comparisce qualche segno di putridezza nel sangue, o negli umori: finalmente si rimedia colla China alla febbre intermittente, massime doppia terzana, che talora vien dietro al vajuolo; e una tal pratica, sebbene ardua, è stata con frequenza giustificata da non equivoche riuscite.

Si calma il mal di gola, sintoma familiarissimo al vajuolo con li gargarismi fatti col latte, col decotto di fichi, e con altri addolcenti. Si possono ammolliare le pustole collo spermaceri sciolto nell'olio di mandorla dolce: un reo metodo è quello di pungerle con un ago, o di tagliarle: ritarda ciò la caduta delle croste, e dà motivo a profonde cicatrici: si seccano colla cre-

creta, di cui si carica la crema, colla cerusa, che si unisce all'unguento rosato, ec. si sciaguattano gli occhi coll'acqua di malva, col latte, e con altri addolcenti: si fa ancora uso del collirio preparato coll'acque di rose, e di piantaggine, e collo zafferano: dobbiamo fare attenzione alle palpebre, e procurar d'impedire il loro incollamento, per non lasciar covare la marcia, la quale non lascia di produrre delle ulcere sempre ostinate, e che spesso siamo poi forzati a fissare colla pietra infernale. Non dobbiamo lasciar di dire in questo luogo, rispetto alla fioritura soverchio tarda, che si può accelerarla col far entrare il paziente in un bagno caldo. L'illustre M. Senac in un'epidemia atroce fece grandissimo uso, e con somma felicità, di questo rimedio: talvolta basta bagnare le sole gambe, o fomentarle. Nella cura del vajuolo è sovente necessario ricorrere ai vescicanti, non meno per conservare, o richiamare la fioritura, che per disimpegnar la testa, e rimediare alle affezioni del cervello. Lascia il vajuolo, com'è noto, delle macchie rosse, che si dileguano col tempo: si tenta di distruggerle coll'olio d'uova, con quel di mirra per deliquio, e con altri cosmetici; ma da tali applicazioni non se ne veggiono effetti molto sensibili.

Tali sono i rimedj, ch'è necessario aver perpetuamente presenti per far testa a tutti gli accidenti, che possono sopraggiungere nel decorso di questo morbo; ma non dobbiamo porli in opera, che con somma cautela, avvegnachè possano attraversare i tentativi, che fa la natura per superargli. Tutti coloro, che hanno un poco di buona fede, convengono, che il vajuolo vuole pochi rimedj, e il più delle volte niuno affatto: io ho già detto, nè lo potrei mai ripeter quanto basti, essersi talvolta osservato, ch'era più micidiale, ove si trovavano no persone, che lo medicavano, che in quei luoghi, ch'erano privi di Medico. Rispetto alle malattie, che succedono al vajuolo, come la svogliatezza, la febbre lenta, le parotidi, i furuncoli, l'ulcere nella cornea, la fistola lagrimale, l'enfiagione delle gambe, e altri accidenti, che riconoscono la stessa cagione, debbonsi medicare col metodo ordinario.



COMPENDIO
DELLA
MEDICINA,
CHE ABBRACCIA LE MALATTIE
DELLE DONNE, E DEI FANCIULLI.

SEZIONE PRIMA.

Quelle del sesso .

AFFEZIONE ISTERICA.



Y questo male somma affinità coll' affezione ipocondriaca , di cui altrove ragionammo ; e la differenza , che vi si osserva, ~~dee~~ riferirsi al solo temperamento, che non è il medesimo nei due sessi, ovvero alla conformazione particolare degli organi, che ad essi sono propri. Non vi ha cosa più comune dell' *affezione isterica* ; e le sole donne, che ne vanno esenti, son quelle, che si affaticano: prende talvolta l'aspetto d'altri morbi, ma ciò non segue così frequentemente, come se lo immaginano coloro, ai quali riesce molto comodo il riferire ad alcune affezioni generali tutte quelle , delle quali non

fanno rilevare il carattere: tuttavia non si può dissimulare, che non meno nell'afezione ipocondriaca, che nell'isterica vi sono delle complicazioni, che possono far uscire di strada i più dotti, e i più sperimentati Medici. La vita molle, e voluttuosa, le passioni violente, e soprattutto la collera; le lunghe astinenze, le trasmodate evacuazioni, la soppressione de' menstrui, e dei lochj, sono le cagioni più ordinarie: vi sono delle donne, che ne sono investite prima, e dopo la fioritura mestruale, al veder certi oggetti, in sentire odori i più aggradevoli, ec. ma vi dà più che tutt' altro occasione l'avversità; intorno a ch' è sempre bene informarsi, poichè una tal cognizione può aiutarci a rilevare la malattia. E' difficile il giudicare della sua sede, se non la stabiliamo nei nervi: tuttavia c' insegna l'ispezione anatomica, che il reo stato della matrice, e delle ovaie n' è con frequenza la sorgente: par, che ciò confermi l'osservazione clinica, veggendo esservi più soggette le gravide, e quelle di parto: si fa ancora, che la soppressione de' menstrui, sia per accidente, sia a motivo dell'età; quella dei lochj, e il parti numerosi, precipitano spesso in tale stato.

La descrizione dell'afezione isterica non può esser meno vaga di quella dell'afezione ipocondriaca, per quanta cura altri si prenda di troncarne tutto ciò, che l'è forestiero. La testa è sempre più o meno attaccata: vi si sente un peso, che ne inceppa le funzioni, e talvolta un dolore intensissimo poco inteso, che addimandasi *chiudo isterico*: molte son molestate dalla palfazione delle arterie delle tempie: altre si lagnano d'una sensazione fredda in cima alla testa: la maggior parte sentono dei fischiamenti nelle orecchie, provano vertigini, paure, terrori panici, tremori, o sussulti di tutto il corpo, stanchezze; ec. La tristezza, la melancolia, e lo scoraggiamento, avvelenano tutti i loro divertimenti: si turba la loro immaginazione: ridono, cantano, urlano, e piangono senza motivo, e talvolta impazzano. Le isteriche restituiscono molte ventosità per bocca, rutti acidi, e putridi; hanno un molesto sputacchiamento, e talora dolori di denti: la maggior parte di esse sono esposte a spaventevoli soffogamenti: alcune hanno una tosse secca, che talora divien convulsiva. Comunissime sono in questo caso le palpitazioni del cuore, e talora sono così violente, che

che in alcune donne magre s'arriya a sentirle : provano anche delle pulsazioni nel basso ventre, che si riferiscono alla celiaca, al mesenterio superiore, o all'aorta : il loro polso è piccolo, disuguale, intermittente, e anche in alcuni parossismi estinto : con frequenza entra in ballo la febbre, che d'ordinario viene per accessi, una, o due volte in un giorno : le pazienti si lagnano comunemente d'anietà, e di nausea : sono anche tormentate dal vomito, che a motivo di sua violenza alcuna volta s'accosta alla passione iliaca : sentono rumoreggiamenti, stiramenti, e dolori nelle viscere, e per sino variate, e terribili coliche. In queste circostanze il ventre è per lo più duro, e gonfio : molte dicono, che vi sentono del movimento dall'alto al basso, come d'una palla muoventesi : questa undulazione si fa sovente dal basso ventre alla gola, che ne patisce uno strangolamento più, o meno grave : questo sintoma è stato pure osservato, sebben di rado, nell'affezione ipocondriaca. Lo scioglimento del ventre, o la costipazione, le urine limpide, sono anche familiarissimi sintomi nelle isteriche ; di pari che il caldo, e il freddo, che si succedono : questo secondo si fa particolarmente sentire nella schiena, che può essere ancora la sede di grandissimi dolori. Le pazienti si dolgono altresì di granchi, o d'inquietudini alle gambe, che disturbano il loro riposo : finalmente si vedono in queste parti delle enfiagioni, che non ricevono le impressioni delle dita, e che non diletua il letto.

Ha l'affezione isterica i suoi parossismi, il cui ritorno è talvolta assai regolare : questi si manifestano comunemente per via d'un serramento, o strangolamento alla gola, per una difficoltà d'inghiottire, per la soffogazione, per la perdita della parola, per una specie di sonno profondo, che toglie ogni senso alle pazienti. Talora perdono il conoscimento in tronco, come nell'apoplessia ; lo che non lascia d'ingannar coloro, che allora trascurano d'esaminare lo stato delle mascelle, che negli attacchi isterici è convulso : oltredichè gli apopletici hanno una difficoltà di respiro, e un rantolo, che non si osserva nell'accidente, di cui parliamo, che può per altro degenerare in vera apoplessia ; siccome alcuna volta si osserva. L'accesso isterico è parimente preceduto da un moto undulatorio nel ventre, di cui abbiamo parlato, e da un gonfiamento manife-

sto del collo, e della lingua, ch'è seguito dalle più terribili convulsioni, poco diverse da quelle degli epilettici: in tale stato i muscoli della respirazione, e del basso ventre provano orride scosse; e questi secondi talora si sollevano prodigiosamente. Talora s'affomiglia alla sincope; ma il pallor del volto, e i sudori freddi posson distinguer la seconda, la quale in oltre, qualunque siasene l'evento, è molto corta, dove l'accesso isterico può durare più giorni: in alcune femmine il polso è talmente sepolto, ed il respiro segue in guisa tanto insensibile, che non appanna lo specchio, e non estingue la fiamma d'una candeletta, che si presenta al naso: il freddo del corpo le fa tenere alcuna volta per morte, e d'un tale errore può accadere il massimo di tutti i mali. Molte isteriche, tuttochè senza moto, e senza parole, sentono tutto quello, che altri dice, e veggono per fino ciò, che si fa in loro vicinanza; ne ho vedute di quelle, che sono tornate in sè per un moto di collera contro quei tali, che facevano ciò, che loro dispiaceva: una fra l'altre, alla quale si volevano applicare i vescicanti, che avea in odio, prese così bene le sue misure, che diede un solennissimo schiaffo al Chirurgo, che si disponeva all'operazione; e ciò, che fa sfordire, ricadde in quello istesso istante nel suo primo stato, ma che la fece rispettare. L'accesso isterico alcuna volta termina col sudore: può durar più giorni, come dicemmo; le pazienti liberandosene, mandano profondi sospiri, e talvolta scoppiano di risa, e fanno mille gesti ridicoli: quando son tornate in conoscenza, si lagnano d'un peso doloroso, e d'un imbarazzo alla testa: sono in grande abbattimento, e col corpo tutto fracassato.

Si sa troppo bene, senza che io lo dica, come di difficilissima guarigione si è questo male, e che non è da temersi gran fatto: nulladimeno si muore talvolta nel parossismo, che può cangiarsi in vera apoplessia, se ne dobbiamo giudicare dall'emiplegia, la quale, benchè di rado, gli è succeduta. Si è pure osservato, che aveva degenerato in itterizia; ma questo accidente, come altri molti, sono stati per mio avviso con poco fondamento attribuiti all'affezione isterica: col suo continuare precipita nell'atrofia, dalla quale non si risana, massime quando vi è un vizio locale, o negli organi della generazione, o nelle altre viscere, come con

con somma frequenza ci fa vedere l'inspezione anatomica.

Ci manifesta la medesima nelle ovaje stivamenti d'ogni specie ; vi si trova un liquore limpido , giallognolo , o nero : materie sebacee , caciose , geffose , e talvolta dei peli : la loro sostanza scirrofa ; la lor superficie gremita di tubercoli , d'idatidi , e d'altri tumori infaccati , dalla grossessa d'un pisello a quella del pugno . Si è pure veduta la matrice , le trombe , e i vasi spermatici pieni , come le ovaje , d'una materia bianchiccia di varie consistenze : l'orifizio della matrice è stato trovato chiuso da una cicatrice , che era forse la conseguenza dei laceramenti potuti accadere nei parti malagevoli . Si è inoltre trovato lo stomaco fuor di luogo , e il suo fondo strascinato verso il pelvi : una prodigiosa dilatazione del duodeno , formata da uno strangolamento , che trovavasi nell'estremità di questo intestino : ostruzioni nel colon , e nel retto , prodotte da una materia stercoracea bianchiccia , e inaridita ; scirri nel mesenterio , putrefazioni nel pancreas , nell'epiploon , ec. Il cuore è comparso talora estremamente ingrossato ; i suoi ventricoli pieni d'un sangue nericcio , e molto fiso , concrezioni polipose , ec. per non parlare delle inondazioni della testa , e delle altre cavità .

La cavata del sangue , se non vi è soppressione dei menstrui , o una pletora manifesta , non conviene più a questo male , di quello si convenga all'affezione ipocondriaca : l'emetico , e i purganti producono gli effetti migliori , qualora non se ne faccia abuso : gl'ipnotici possono prescriversi contro la colica isterica , o contro qualunque altro intenso dolore : per lo scioglimento del ventre , e le ostinate vigilie , si fa grand'uso della tintura anodina , mescolata con quella di castore , o d'ogn'altra preparazione , che s'unisce perpetuamente con gli antistherici ; ma non si debbono usare i calmanti , se non dopo le dicevoli evacuazioni . Utilissimo si è l'uso interno , ed esterno della canfora ; ma si danno donne , che non possono comportarla : si sperimentano altresì molto buoni effetti dal liquore anodino minerale . Con ottima riuscita si amministra la china sola , o unita ai calmanti , e agli antistherici : fra questi ultimi la valeriana , la melissa , l'enula campana , la cedroncella , l'artemisia , il matricale , i fiori di tiglio , lo zafferano , il succino , il castore , l'assa-

fetida, l'acqua di fior d'arancio, quella di melissa composta; le goccioline Inglese, ec. sono i più adoprati. Ognun sa, che fassi parimente grand'uso degli aperienti, degli amari, degli emmenagoghi, dei fortificanti, dei marziali, della triaca, del mitridato, ec. Ma non vi è cosa per avventura più proficua del siero, del latte, e dell'acque minerali, come di Passy, di Forges, di Monfrin, di Cransac, di Spà, di Sedlitz, di Miers, di Baresges, di Sant' Amando, ec. delle quali le calde sembrano più efficaci. Non debbonfi dimenticare i bagni, e i mezzi bagni domestici, di pari che i lavativi semplici, isterici, e carminativi. Bisogna soprattutto applicarsi a dilungare l'inclinazione, che le pazienti hanno ad abbandonarsi alle loro triste riflessioni; indurle a divertirsi, e tendere, per così esprimermi, delle insidie a loro spirito, il quale, com'è noto, ha gran parte in questa malattia. Si può vedere nell'istoria dall'Accademia delle Scienze sotto l'anno 1752. quella d'un'isterica, la quale dopo d'aver provato tutti i rimedj immaginabili, fu risanata da un grandissimo spavento, che le fu fatto a bella posta, per provare se un forte sconvolgimento subitaneo le potesse giovare. Finalmente si è osservato, che il matrimonio aveva prodotto un gran cambiamento, che si era invano sperato dalla più metodica cura.

Gli accessi isterici vogliono ajuti prontissimi: la cavata del sangue può essere applicata nelle da noi esposte circostanze: fuori di tali casi io l'ho sempre giudicata dannosa, o almeno inutilissima: tuttavia non debbo dissimulare, che vien consigliata dal *Sydenham*, e da altri famosi Pratici, non meno quella del braccio, che quella del piede, e della gola: non è meno da temersi l'emetico: ha veramente prodotto alcuna fiata de' buoni effetti, ma di pari ha risvegliate orribili tempeste. I rimedj più familiarmente adoprati contro il parossismo isterico, e da cui nulla vi ha che temere, sono gli odori più fetenti, come il fumo della carta abbrugiata, delle penne, delle corna, del cuojo vecchio, ec. l'odore dell'aceto, del sale ammoniaco, delle goccioline, e del sale d'Inghilterra, ec. Si possono anche amministrar internamente questi spiriti, di pari che la tintura di castoreo, e quella di succino, che sono d'un uso più familiare: si ricovrano alcune isteriche con gettar loro semplicemente dell'acqua fredda sul viso, ap-

punto come si dileguano le convulsioni delle braccia coll'immerger le mani nell'acqua stessa. S' applica al bellico del cotone inzavardato di mirra, e d' aloe, un impiastro di galbano, ec. Fannosi delle legature all' estremità; si stropicciano le gambe; si solleticano le piante de' piedi: s' applicano delle coppette a vento sul ventre, alle cosce, ec. Finalmente si danno lavativi purganti, irritanti, isterici, e colla trementina, dai quali si sperimentano alla giornata buoni effetti.

GUSTO DEPRAVATO.

E' noto a chicchessia, che le fanciulle, e le donne gravide vanno sottoposte a un appetito bizzaro, che le induce a mangiare varie cose, anche le più ributtanti in ogn'altro tempo: tali sono, a cagion d' esempio il sale, e il pepe soli, e in copia; i frutti acerbi; la carne, e il pesce crudi; il calcinaccio, la calcina viva, la cenere, e il carbone, la neve, e il ghiaccio; la carta, il cuojo vecchio, e per fino gli escrementi, e un' infinità d' altre materie nocevolissime, e incapaci di nutrire: ve ne sono anche di quelle, che provano un estremo piacere nel sentire gli odori più disgustosi; a maneggiare, e a stritolare colle loro dita certi cotali corpi; a immerger le mani in cotali liquori, ec. Questo morbo detto *pica* nelle fanciulle è comunissimo; vi sono sommamente esposte le donne non maritate, di pari che ai colori pallidi, che ne son quasi inseparabili; ma quelle, che trovansi negli anni sotto la pubertà, non ne vanno esenti. Talvolta sono attaccate dallo stesso morbo le donne gravide, e a questo si è creduto dare il nome di *malacia*; ma non ha luogo che nei primi tre, o quattro mesi della gravidanza. Era le voglie delle donne gravide, ve ne sono di quelle, che hanno per oggetto alimenti da tutti usati; ma esse gli bramano con tanta passione, ch' è sommamente pericoloso il non appagarle; e l' esperienza ci ha fatto pur troppo conoscere, che il negargli loro, le aveva fatte cadere in sincopi, aveva cagionato l' aborto, o i più orridi sconcerti nell' organizzazione dei loro feti. Quantunque l' appetito fregolato delle fanciulle, e delle donne (*pica*, & *malacia*) non sia di per sè molto pericoloso, non lascia di divenir talora funesto per la quantità, o per la pernicioso qualità della materia, che n' è l' oggetto, che può fermarsi nelle prime vie,

o in parte transfonderfi nella massa del sangue: è anche maraviglia, che i mali, che ne dovrebbero risultare, non sieno più frequenti: la lor passione, che può appagarfi col tatto, o coll'odorato, è molto meno da temersi, tuttochè sia sempre seguita dai colori pallidi. I giovani scapoli non sono totalmente esenti da siffatte fantasie: se ne veggiono di quei, che lacerano i loro libri, e le loro carte per aver il piacere di farne dei cartocchetti, o altri giocoletti colle lor dita; ve ne sono anche di quei, che la mangiano, come anche altre cose non mangiabili, e ne risentono quindi grave incomodo: l'uso dei guanti, che non si permette che si cavino mai se non a tavola, può guarir gli uni, e gli altri da questa passione; poichè il rimedio migliore, che si possa loro opporre, si è il tener loro dilungate diligentissimamente tutte le occasioni di soddisfarla. Ma quando si teme per l'uno, e per l'altro sesso, che le prime vie non sieno infarcite di queste materie improprie, e che ne sia passata col chilo una quantità nel sangue, dobbiamo por mano ad ajuti più efficaci: tali sono pel primo caso gli allentanti, i purganti, e gli emetici; e pel secondo gli aperienti, i diuretici, e gli emmenagoghi: quindi si fortifica lo stomaco con i rimedj più atti a produr tale effetto: tali sono la menta, e la melissa, la scorza d'arancia, e di cedro; lo sciroppo di cotogni, e di limone, l'estratto di ginepro, e la triaca, ec. ma tutti i divisati rimedj s'adattano alle sole ragazze: ve ne vogliono pochissimi, o nessuno per le donne, che si liberano di questo reo appetito verso il quarto mese di loro gravidanza, o alla peggio, sicuramente nel loro parto.

COLORI PALLIDI.

E' questa una specie di cachessia leggermente febbrile, particolare, alle nubili, e alle vedove, ch'è nota sotto la denominazione di *colori pallidi*; le ragazze prima degli anni di pubertà vi sono parimente sottoposte, ma più di rado. Questa cachessia (*Chlorosis*, seu *febris alba Virginum*) si manifesta dalla pallidezza della pelle, osservabilissima nel volto, che ne diviene talora verdastro, dalla stanchezza, e gravezza di tutto il corpo, dalla gonfiezza delle palpebre, e dell'altre parti della faccia, dei piedi, ec. per dolori di testa, e inquietudini nelle gambe; per una difficoltà di respiro

al menomo moto ; per palpitazioni di cuore , ansietà , e deliquj ; per una febbre lenta errante più rilevabile la notte del giorno , per l'elevazione degl' ipocondri , gonfiezza del ventre , ec. i maleoli in tali circostanze si gonfiano ; ma questa enfiagione è più sensibile la mattina che la sera , e non riceve l'impressione delle dita , all' opposto dell' edema . Quelle , che trovansi in questo stato , hanno sovente un appetito fregolato , voglia di vomitare , un' inclinazione al sonno , e alla tristezza : d' ordinario i loro menstrui son troncati ; se talvolta scorrono , si ha motivo di temere , che il male non sia conservato dall' ostruzione delle viscere del basso ventre . I colori pallidi posson durar lungo tempo , ma son poco pericolosi : d' ordinario si dileguano tornando il flusso menstruale : per altro se vengano trascurati , posson precipitare in una verace cachessia , nell' idropisia , nella febbre lenta , ec.

La cura richiesta da questo male , è diversa da quella , che conviene alla cachessia : il cavar sangue dal piede , l'emetico , e i purganti replicati sono rimedj riconosciuti da ognuno necessarj : quindi si passa agli epatici , e agli amari ; agli aperienti , e agli emmenagoghi , ai tonici , e agli antistherici : le preparazioni di tartaro , e di marte , sone le medicine più familiari ; vi s' adoprano anche con frequenza gli assorbenti , e i sudorifici , di pari che le acque minerali , tanto acidule , e ferrate , che termali : tali sono quelle di Vals , di Passy , di Forges , di Vichy , di Plombieres , di Cransac , ec. Il *Barbeirac* teneva per sommamente efficaci in questo male i bagni ; ma la maggior parte de' buoni Pratici si contentano di far tener le gambe nell' acqua calda per qualche tempo , o di riscaldargli con delle fregagioni : finalmente si sperimenta ogni giorno , il più spedito , e il più sicuro mezzo per guarirne essere il Matrimonio .

MENSTRUUI DISORDINATI.

Ognun sa , che questa evacuazione periodica , che dura alcuni giorni , cioè , dai tre agli otto , e che ritorna prima che termini il mese , principia intorno i quattordici anni per non terminare , che su i quarantacinque , o i cinquanta : se vien più presto , termina anche più speditamente : si fa ascendere la quantità del sangue , che si perde ogni volta , a quella di cinque a dieci on-

ce : ma è difficilissimo il dar nel gusto . Benchè questo flusso lunare sia naturale al sesso , non si lascia di vedere tuttavia molte donne robuste , e laboriose , delle Danzatrici , ec. che non vi sono sottoposte , tuttochè godano ottima sanità , e sieno attissime a concepire . Non mi fa d'uopo il dire , come tutti gli sconcerti , che seguono in questa perdita di sangue naturale , se si eccettuino quelli , che nascono dalla gravidanza , sotto altrettanti mali , che posson avere ree conseguenze .

La soppressione è lo sconcerto più ovvio : nella maggior parte è accompagnata dai colori pallidi , dalla gonfiezza più rilevabile nelle gambe , e nel volto , da dolore , e peso ai lombi da dolor di testa , da vigilia , da inceppamento di respiro , da palpitazioni , da svegliatezza , e da svenimenti , da flatulenze , e da gonfiezza di stomaco , dalla colica , ec. In tale stato il polso è febbrile , o si hanno vicende di freddo , e di caldo ; si perde l'appetito , o si ha depravato , inoltre le pazienti sono sottoposte a nausea , e a vomito : somnolente , e sterili : sopravvengon loro talvolta emorragie al naso , l'emoptisi , il vomito , e l'orina sanguigni , o altre perdite , che fanno più paura , di quello sieno pericolose ; l'angina , l'ostalmia , resipole , e altre fioriture cutanee . Il ventre in questo stato talora si tumefà , a segno che fa insospettire di gravidanza : questo equivoco è però di conseguenza grande , come quello , che può diffamare fanciulle savissime , o lasciar le donne in una sicurezza , che talora lor riesce funesta : questa tumefazione del ventre , che si dee piuttosto riferire alla ritenzione de' menstrui , che alla loro soppressione , va a finire con un' emorragia , ch' è stata presa più siate per un aborto . Alcune donne , la cui età ha posto termine al corso ordinario de' menstrui , non lasciano d' essere esposte a varj accidenti , che dipendono dalla soppressione . Son questi più gravi , quando lo scolo attuale delle regole è stato in un subito troncato da terrore , dalla collera , e da altre passioni d'animo ; dall'immerger le gambe nell'acqua fredda ; dalla cavata di sangue dal braccio , ec. nascono da questo stato febbri continue , infiammatorie , intermittenti di reo carattere , cefalalgie violente , vertigini , l'epilessia , l'affezione ictérica , tremori , soffogamenti , dolori vaghi per tutto il corpo , più acuti nelle articolazioni , la cachessia ,

fia, l'idropisia, ec. La soppressione, in qualunque modo segua, che dipende da un vizio locale negli organi della generazione, e la più ostinata, e la più rea: la più suscettibile di guarigione si è quella, la cui cagione è la plethora: nello stato contrario è più difficoltosa.

Le dissezioni anatomiche hanno scoperto, oltre l'imenne, e gli altri vizj di conformazione; ulcere, escrescenze polipose, d'idropisia, e la cancrena della matrice: Rivamenti, e altri sconcerti nelle ovaje; tumori nella vagina, opponentisi allo scolo de' menstrui, ec. Sonosi anche trovate ostruzioni scirrofe nel fegato, nel mesenterio, e parecchi altri sconcerti, sì nel basso ventre, che nel petto, che ora son sembrati la cagione, ora l'effetto di questo morbo.

E' nota a chicchessia la cura, che s'addice a questo male, ma non tutti fanno farne una buona applicazione: ci dobbiamo assicurare, prima d'impegnarvici, se la soppressione sia l'effetto della gravidanza; imperciocchè venghiamo giornalmente ingannati da ragazze, alle quali preme d'occultare lo stato loro, e della cui virtù non si ha il menomo sospetto: quando non si può rilevare un tal sospetto, fa di mestieri sospendere i rimedj fino al quinto mese, tempo, in cui i segni della gravidanza sono più manifesti: la mano fredda allora applicata al ventre, può eccitare alcun movimento sensibile nella matrice, per non parlare degli altri segni della gravidanza, che non risguardano il presente Articolo. Non vi è rimedio più atto a richiamare il flusso menstruale, o ad impedire gli sconcerti risultanti dalla sua soppressione, della cavata del sangue dal piede: possiamo far precedere quella del braccio, quando lo scolo attuale d'esso flusso è stato troncato da qualche accidente: si applicano altresì coll'intenzione medesima le mignatte alla vulva, ai vasi emorroidali; le coppette a taglio alle cosce, e all'anguinaja, ec. Si può, allorchè si è la plethora, limitarsi alle cavate del sangue; ma negli altri casi, bisogna ricorrere agli emmenagoghi, agli aperienti, agli amari, agli aromatici, ed ai fortificanti: la scolopendra, la cicoria, gli sparagi, il capelvenere, e la garancia; il fumoiterno, e la centaurea minore; il marrubio bianco, e il rosmarino; le coccole di ginepro, l'angelica, e l'aristolochia, la mirra, il borace, e il croco di Marte; il tartaro marziale, l'elisir *proprietas*, ec. sono i rimedj più praticati:

cati : alcuna volta si è usata la sabina , e perfino le canterelle ; ma non è permesso se non nell' estremità ricorrere a siffatti rimedj , che vogliono perpetuamente grandissima circospezione . I purganti stimolanti , come la coloquintida , e l' aloe , che in molti casi hanno prodotto buonissimi effetti , debbon pure amministrarli con riserva : gli antistherici , come la canfora , lo zafferano , il castore , ec. meritano d' aver luogo in questo caso : finalmente si possono ritrarre i massimi vantaggi dalle acque minerali , e soprattutto dalle ferrate . I profumi appropriati , i bagni caldi , il tenere in molle le gambe nell' acqua tepida ; le fomenta , i clisteri lassativi , ec. posson parimente far qualche bene , specialmente s' è stato interrotto il flusso attuale da paura , dal freddo subitaneo , o da alcun altro accidente . Fa di mestieri osservare , come il tempo più favorevole per i rimedj proposti è quello dello scolo ordinario de' menstrui , massime se le pazienti sentono i medesimi forieri , chee hanno provato in altri tempi , come il dolore aggravativo dei lombi , la colica , il calor febbrile , ec. La diminuzione de' menstrui , o sia che ne sieno più lunghi gl' intervalli , o sia , che lo scolo sia minore della quantità ordinaria , può combattersi colle stesse medicine , dirette però perpetuamente dalle circostanze .

Prendono i menstrui alcuna volta una carriera straordinaria , (*menfes devii*) come quella del naso , degli occhi , e delle orecchie ; della bocca , sì per gli organi della saliva , che per le gengive , o per gli alveoli ; del polmone , dello stomaco , dei reni , della vescica , dell' ano , delle piaghe , ec. Sonosi perfino veduti uscire dalla cima del capo , dalle guance , dalle mammelle , dal bellico , dall' anguinaja , dalle mani , dai piedi , ec. Allora si procura di deviarli , non meno col cavar sangue dal piede , che coll' applicazione delle coppette a taglio all' anguinaja , ed all' estremità inferiori ; con i mezzi bagni caldi , con gli appropriati profumi , col vapore dell' acqua calda , o d' un decotto emolliente , ec.

La fioritura dei menstrui per le strade ordinarie è talora laboriosissima , (*mensum difficultas*) vale a dire , è preceduta da atrocissime coliche , e da altri dolori del ventre , e dei lombi : dalla febbre , dalla cefalalgia , dall' oppressione , ec. Ci fa ogni giorno veder l' esperienza , che le fanciulle , o le donne , che soffrono l' abito
di

li patire tali difficoltà, son minacciate della soppressione. Si rimedia ai dolori presenti con gli addolcenti, con i carminativi, e con i calmanti. L'infusione di fiori di malva, e di seme di lino, il brodo lungo di pollo, il fiero, l'olio di mandorle dolci, ec. in tali casi sono rimedj più usati: si praticano pure clisterj carminativi, e terebentinati; le coppette applicate all'anguinaja, e alle estremità inferiori; ma non ci determiniamo nè agli uni, nè all'altre, se son gravi gli accidenti: negli altri casi si lascia operare alla sola Natura; ma dobbiamo approfittarci degli intervalli, per far prendere alcuni emmenagoghi, ed altri rimedj da noi proposti per la soppressione.

Lo sregolamento de' menstrui (*fluxus inordinatus*) debb'esser considerato sotto due punti di vista; il primo riguarda gl'intervalli più, o meno lunghi; il secondo è relativo alla loro quantità. Veggionsi fanciulle, e femmine, che hanno il loro flusso più volte il mese; altre soltanto ogni due, o tre mesi: finalmente ve ne sono di quelle, che hanno questo flusso, ora più presto, ora più tardi, con molta irregolarità. Rispetto alla quantità, si considera la diminuzione, e l'eccesso; vi è taluna, che in ogni periodo rende soltanto alcune goccioline di sangue; e un tale stato, come ben si vede, s'accosta molto alla soppressione: altre ne perdono una quantità, che oltrepassa i limiti ordinarij: le donne, che trovansi sul punto di perdere i loro flussi, lo che segue comunemente fra i 35. e i 45. anni, sono esposte più dell'altre a tale accidente, il quale, in un'età meno avanzata, è soggetta ad aborti; può anche, perseverando, precipitare nella febbre lenta, nel marasmo, e nell'idropisia, per non parlar dell'ulcera alla matrice, che n'è la conseguenza ordinaria. Bisogna osservare rispetto a ciò, che vien preso talora una spezie di sangue emorroidale, che scaturisce dalla vagina, pel flusso menstruale: sgorga questo dalle vene varicose, che si scuoprono nell'ingresso di questo canale, simili a quelle, che si osservano nei contorni dell'ano, e scola d'ordinario a goccia a goccia, in copia maggiore, che nei veri menstrui; ma un tal flusso non è sottoposto a gli stessi periodi: è questo ancora accompagnato da dolori esterni, che non si provano nel menstruale, lo che dee bastare per distinguerli.

La copia soverchia, non meno per la durata dello
fco-

scolo, che per l' eccedente flusso, dee medicarsi con i rimedj, che convengono all' emorragia della matrice, della quale pur ora parleremo: tuttavia quando questa grande evacuazione non porta seco alcuno incomodo, si dee guardarsi dal fermarla con astringenti; ma se è seguita da spostamento, da deliquj, dalla febbre lenta, e dalla consunzione; dalla cachessia, dall' enfiagione delle gambe, ec. si può ricorrere, dopo d' aver fatto precedere altri rimedj meno efficaci, ma che non sono tanto pericolosi: tali sono le cavate di sangue negl' intervalli de' menstrui, i temperanti, e gli addolcenti, come il latte, le creme, le emulsioni, i nitrosi, gli assorbenti, ec. Se siamo forzati di por mano agli stitici, si dee fare col maggior riguardo, piuttosto colla mira di moderare lo scolo, che di fermarlo, per non esporre le pazienti a più gravi accidenti. Non credo, che si possa fare gran fondamento sopra i profumi coll' incenso, col succino, col mastice, ed altri rimedj più conosciuti da gli Scrittori, che dai Pratici. Ognun sa finalmente, che le fanciulle, e le donne, che perdono molto sangue per la matrice, debbon conservare per quanto è possibile, una situazione orizzontale, e schivare con grandissima cura tutto ciò, che può disturbare il riposo del corpo, e dello spirito.

L' emorragia della matrice, confusa da quasi tutti gli Scrittori col flusso trasmodato de' menstrui, dee considerarsi disgiuntamente: non parliamo in questo luogo di quella perdita di sangue, ch' è inseparabile dal parto, e dall' aborto, ma di quella, che dipenda da altra cagione, e che perciò è più da temersi. L' emorragia d' ordinario è più violenta, e porta seco più sangue grumoso, che il flusso eccessivo de' menstrui; peraltro non è soggetta ad alcun periodo: nulladimeno segue talvolta, che questi due mali s' avvicinino talmente insieme, ch' è difficilissimo il rilevarne il punto di divisione: il flusso trasmodato può essere anche più copioso dell' emorragia, massime quando la seconda è abituale. I dolori intensi alla schiena, e ai lombi, la pallidezza del volto, la tensione degl' ipocondri, le brivide, ec. sovente annunziano l' emorragia: le flemmatiche, le cachetiche, e le scorbutiche vi vanno più dell' altre soggette: la collera, l' abuso del vino, dei liquori, e del caffè; gli sforzi violenti, e le cadute, ne sono le cagioni più ovvie: la ritenzione de' menstrui, che innal-

za il ventre, alcuna fiata vi dà motivo; e si è osservato, che le donne giovani concepivano comunemente dopo un' emorragia di questa natura. Tutti fanno, che le perdite di sangue eccessive spesse volte sono funeste, massime alle donne d'età avanzata, le quali allora son minacciate d'ulcera, o di cancro alla matrice, d'idropisia, di marasmo, ec. le forti terminano colla sincope, colle convulsioni, e colla morte: quelle, che seguono nei primi cinque, o sei mesi della gravidanza, minacciano l'aborto: oltre questo termine annunziano il parto, o per dir meglio, l'emorragia nell'uno, e nell'altro caso, non termina se non per l'espulsione del falso germe, o del feto perfetto; ma non ci dobbiamo sempre dar fretta di liberare una donna, che trovisi in questo stato; seguendo talvolta, come dicemmo, che questa emorragia venga soltanto dai vasi varicosi della vagina, e termini naturalmente: peraltro la mano del Chirurgo assistente al parto non è d'alcun soccorso nei primi tre, o quattro mesi della gravidanza, come altresì quando cagiona questa emorragia un aborto.

La cura appropriata alle perdite di sangue, di cui parliamo, è poco diversa da quella, che riguarda le altre emorragie: nel parossismo si cava sangue dal braccio: si crede d'aver rilevato, che in tal caso era bene lasciar uscire il sangue soltanto a riprese. La consolida maggiore, la pimpinella, i sughi di piantaggine, e d'ortica, la tintura di rose, il corallo, il calcìu, l'allume, il sangue di drago, la polvere dell'Elvezio, l'essenza di label, ec. sono gli assorbenti, gli astringenti, e gli astringenti più usati; ma bisogna amministrarli con prudenza, e specialmente gli ultimi, che debbon riserbarsi per i casi urgenti: si è prescritta anche talvolta con riuscita l'ipecacuana, e la simaruba; e questi rimedj son molto meno da temere; vantaggio, che deve far dare ai medesimi la preferenza. I rimedj esterni posson essere ancora utili in questo caso: s'inviluppano le mani entro pezze di tela bagnate: s'applicano alle reni tovaglioli inzuppati nell'aceto, e le coppette sotto il seno: si fanno legature all'estremità; finalmente si fa uso, come dicemmo, di tutti gli ajuti, che convengono all'altre emorragie, ma in questa richieggiono molta circospezione.

Quando dopo il parossismo si ha motivo di temere ritorno, bisogna procurare di prevenirlo colle cava-

tedi fangue, coi temperanti, coi rinfrescanti, e con gli addolcenti: tali sono le bevande nitrofe, la limonata, i brodi di gamberi, il siero, le acque di Passy, di Forges, di Spa, di Baresges, di Bonnes, d'Aix la-Chapelle, ec. per non far parola delle creme farinose, e del latte, che sono gli alimenti più appropriati: si praticano eziandio i marziali, e particolarmente il croco di Marte dello *Schal*, ed alcuni altri astringenti: finalmente s'impiegano in alcuni casi i vulnerarij, i diaforetici, e i calmanti. Abbiamo già detto, come nelle perdite di sangue bisognava osservare il più rigoroso governo, e molta quiete, non meno di corpo, che di spirito.

LA STERILITÀ.

La pletora, l'eccessiva grassezza, la soppressione dei menstrui, il fluor bianco, la cachessia, lo scorbutò, e il malfrancesco son le cagioni più ordinarie della sterilità. Il libertinaggio, la crapola, l'abuso del vino, de' liquori, e del caffè, ec. vi danno similmente motivo: è chiaro, che in tutti questi casi possiamo farla cessare, non meno con gli adeguati rimedj, che con indurre le donne alla riforma di loro condotta. E' più malagevole il rimediare ai vizj di conformazione, e al reo stato degli organi: tali sono la smisurata grossezza della clitoride, e delle ninfe, lo strangolamento della vagina prodotto da cicatrici, che sono conseguenze dei parti laboriosi, del vajuolo, delle malattie veneree, della scottatura, ec. L'imene soverchio fisso, o che non ha l'apertura per lo scolo dei menstrui, la cui ritenzione eccita tumore del ventre, e dolori grandissimi, l'inaridimento, o il rilasciamento della vagina; le escrescenze, o altri tumori, che ne chiudono l'ingresso, ec. Si considera finalmente incurabile quella, che nasce dall'inaridimento della matrice, che rende talora il suo corpo cartilaginoso, e il suo ingresso presso che osseo; dal suo ristamento scirroso; da tumori ed escrescenze, che ne occupano la cavità; dall'ostruzione, o dal ferramento delle trombe; da tumori, e dall'idropisia delle ovaie, come da molti altri sconcerti, non meno degli organi che delle parti adjacenti, manifestatici con tanta frequenza dall'apertura dei cadaveri.

Si può combattere la sterilità, come accennammo attaccando le varie cause, dalle quali può nascere, ma queste non sono sempre evidenti, o sono sì leggier-

re, che il menomo cangiamento nella disposizione del sangue, e degli umori, può dilungarne gli effetti. In questi casi facciamo uso dei temperanti, degli aperienti, degli emmenagoghi, e dei fortificanti: tali sono i brodi rinfrescativi più semplici, e i bagni; il tartaro, e i marziali, la veronica, la menta, la melissa, e il finocchio, ec. Ma non vi è cosa, che vantaggi le acque minerali sì acidule, e ferrate, che termali: fra queste seconde quelle di Bourbon-Lancy, e d' Aix-la-Chapelle sembrano le più approvate. Ognun vede, non esser lecito l'amministrare tutti questi rimedj indifferente-mente, e che ne dee esser regolata la scelta dalle circostanze del male.

MALATTIE DELLE DONNE GRAVIDE.

Quantunque la gravidanza sia uno stato naturale, dà tuttavia occasione a molte infermità, e mali, che farebbe pericoloso il riferire ad altre cagioni, di modo ch'è ugualmente importante, che difficile talvolta il non ingannarsi intorno allo stato della matrice: è noto quanto basta, non essere agevole lo schivar l'insidie, che ci vengon tese alla giornata dalle ragazze di rea condotta, per persuaderci, che la tumefazione del loro ventre è una conseguenza della soppressione dei loro mestruj, o effetto di tutt'altra infermità, non meno colla mira d'occultare il loro stato, che per ottenere delle cavate di sangue dal piede, degli emetici, degli emmenagoghi, e altri rimedj, atti, al loro credere, a farle abortire: ci troviamo sovente nello stesso imbarazzo colle donne maritate, che non hanno motivo alcuno di dissimulare, e che anch'esse sono incertissime dello stato loro, tanto equivoci sono i segni della gravidanza: nulladimeno si possono ricavar molti lumi dal concorso dei principali: tali sono il seme ritenuto, e un certo abbrividamento, o sussulto piacevole da esse provato nell'istante del concepimento: la soppressione dei mestruj, la svogliatezza, o l'appetito depravato; le nausee, o il vomito, la cardialgia: e gli svenimenti; il dolore ai lombi, e all'anguinaja: le poppe gonfiate, e anche dolenti; il color livido dei capezzoli, e il latte; l'orifizio della matrice chiuso; e finalmente la grossezza del ventre manifesta verso il quarto mese, che può distinguerfi dalle altre tumefazioni, non meno pel risalto verso il bellico, e la li-

fica bianca, ove forma una specie di punta, che pel moto della creatura, che si rende sensibile a un di presso verso un tal tempo: bisogna aggiungere l'età conveniente, che d'ordinario non si stende oltre i quarant'anni, tuttochè vi sieno esempi di gravidanze nei cinquanta, nei sessanta, e perfino nei settant'anni. La gravidanza dei gemelli non può distinguersi dall'ordinaria, se non dal volume del ventre; ma non bisogna confonderla colla *superfetazione*, che suppone feti di differente età, e che non son partoriti dalla madre nel tempo medesimo: un tal caso è molto più raro: vi è stato perfino chi lo ha rievocato in dubbio; ma non mancano reali esempi del medesimo: questi ci fanno sapere, che le donne abortiscono per lo più il feto posteriormente concepito, ritenendo il primo, che poi partoriscono nel tempo ordinario. Si osserva ancora in alcune donne gravide dell'avversione pel coito, e una pigrizia, che non provano negli altri tempi: segue in molte, che nei primi mesi scorrono i loro menstrui, ma in copia minore: alcune gli hanno perfino in tutto il tempo di loro gravidanza; le une, e le altre vanno soggette ad aborti.

A tutti son noti gli ajuti, che richiede la gravidanza; che il cavar sangue verso il terzo, il settimo, e il nono mese, giova alla maggior parte delle donne, che trovansi in tale stato; nulladimeno bisogna nelle lor malattie acute risparmiare il loro sangue, ed allargare anche un poco la mano rispetto alla dieta: se ne vede agevolmente la ragione: si dee schivare di purgarle per quanto è possibile nei primi tre, o quattro mesi di loro gravidanza, di pari che verso il fine del loro termine: era questo il metodo d'*Ippocrate*, e degli Antichi. che alcuni Moderni credono di poter non seguire. Non s'ignora altresì, che le donne gravide sono esposte a molti accidenti relativi allo stato loro: tali sono l'appetito depravato, le nausee; e il vomito: la collica, la diarrea, e i sudori; gli svenimenti, e le convulsioni isteriche; il dolor di denti, la tosse, e le palpitazioni; l'iscuria, le emorroidi, le varici, le screpolature del ventre, l'enfiagione delle gambe, le perdite di sangue, l'aborto, il parto laborioso, ec. Abbiamo detto, che l'appetito depravato non dura oltre i primi quattro, o cinque mesi, e che di rado richiede rimedj: lo stesso è delle nausee, e del vomito, che per lo più non sussistono dopo questo termine:

ne: tuttavia siamo costretti talvolta a moderar questo ultimo colla cavata del sangue, con gli assorbenti, col rabarbaro, e coi lassativi; collo sciroppo d'assenzio, coll'acqua di fior d'arancio, col diascordio, col sugo di limone unito al sale d'assenzio, e con altri stomachici, sì interni, che esterni: del rimanente il vomito nei primi mesi non è da temersi; ma può scuotere la matrice, e dar occasione a un aborto negli altri tempi della gravidanza. Si acquieta la colica coll'acqua di cannella, e con quella di fior d'arancio; collo spirito di sale ammoniaco, e con altri carminativi, e calmanti. La diarrea pericolosissima negli ultimi mesi, richiede stomachici, e assorbenti, e sovente i purganti.

I sudori moderati sono inutili per le donne gravide; ma gli eccessivi possono avere delle ree conseguenze: si procura di rimediarvi con i temperanti. Non son gran fatto da temersi le sincopi; ma debbon far sempre gran paura le convulsioni: si medicano le une, e le altre con i rimedj usati negli altri tempi: ma le seconde richiedono talora, che si faccia partorire la donna colla maggiore sollecitudine. S'attuta il mal de' denti coll'impiaastro di *tacamahaca*, e con altri rimedj appropriati. La tosse, la difficoltà di respiro, e le palpitazioni vogliono per lo più la cavata del sangue: s'appropria altresì al dolor di schiena, e delle mammelle. Si può rimediare all'iscuria della vescica, che sopravviene soltanto negli ultimi tempi, facendo prendere alla paziente una situazione, che difenda l'uretra dalla pressione, e dal peso della matrice: questo mezzo d'ordinario riesce per se solo, e dispensa d'appigliarsi al cataplasma di parietaria, all'*algalia*, ec. L'incontinenza d'urina è molto più ostinata; ma ci dà manco da temere. Si medicano le screpolature della pelle del ventre col butiro, coll'olio d'uova, e con alcuna pomata addolcente, alla quale si può unire la cerusa, lo zucchero di Saturno, od ogn'altro disseccante. Tuttochè siamo certi, che l'enfiagione delle gambe si dilegua col parto, tuttavia quando è eccessiva, non si lascia d'usarvi delle fomentate aromatiche, l'acqua di calicina, la rannata di fermenti, ec. che si avvisa coll'acquavite, collo spirito di vino canforato, o coll'acqua della Regina; ma quando l'enfiagione si stende sopra i lombi, e che guadagna le parti superiori, si dee temere l'idropisia della matrice, o l'ascite, che sono

talora complicati colla gravidanza. Si fomentano l'emorroidi col decotto di *brodo bianco*, di fiori di sambuco, di seme di lino, di teste di papaveri, ec. Le varici addimandano la loro cura ordinaria, qualora non si voglia aspettare, che si dileguino col parto.

Abbiamo parlato nell'ultimo Articolo dell'emorragia della matrice, che s'inverte perpetuamente indarno, se è staccata la placenta: abbiamo detto, che annunziava comunemente l'aborto nel decorso della gravidanza, o il parto, allorchè la donna s'avvicina al suo termine, che era tuttavia alcuna fiata indipendente; che allora erano utili le cavate di sangue; che sonosi veduti in questo caso ottimi effetti dell'*ipecacuana*, ec. Si fa, che quella, che precede l'aborto, segue in tutti i tempi; ma con più frequenza sulla fine del terzo mese: questo accidente è comunemente annunziato da grave dolor di testa, da leggieri brivide, dall'appassimento del seno, e della parte superiore del ventre, dal dolore aggravativo dei lombi, e dell'anche, dalla frequente voglia d'orinare, ec. Finalmente l'emorragia, gli svenimenti, le sincopi, la febbre, il delirio, il sopimento, e le convulsioni, sono i sintomi più formidabili, che accompagnano l'aborto. Abbiamo già fatto osservare, che veniva preso talvolta l'effetto della ritenzione de' menstrui, sì delle fanciulle, che delle donne, per segno di gravidanza, e l'emorragia, che la termina, per l'aborto; ma gli ammaestrati, e i diligenti non vi si lasciano ingannare. L'aborto dee considerarsi come un mal grave, massime in una prima gravidanza, e negli ultimi mesi: quando segue nel corso d'una malattia grave, è quasi sempre mortale.

La vita molle, e oziosa, le perdite di sangue, il vomito, e la diarrea; i purganti drastici, il tenesimo, la costipazione, e il calcolo; il ballo, o tutt'altro esercizio violento; gli sforzi, le percosse, e le cadute, le passioni vive, gli odori disgustosi; l'abuso del caffè, del vino, e dei liquori gagliardi; le voglie non appagate, i rimedj abortivi, ec. sono le cagioni più ordinarie dell'aborto: si può impedire colle cavate di sangue, che si praticano specialmente sul punto dell'usato flusso menstruale, collo stare in riposo, e anche in letto; coll'attenerli dal coito, ec. Si amministra pure colla mira stessa la ptisana di riso, o di consolida maggiore; il sugo d'ortica, e altri rimedj da noi in-

dicati pel trasmodato flusso menstruale: le acque ferrate vengono similmente impiegate per l'uso stesso, massime quando si rileva una disposizione abituale: gli astringenti, sì interni, che esterni nel tempo dell'emorragia sono superflui, facendoci ogni giorno vedete l'esperienza, che non può cessare, se non quando la matrice sarà liberata dal feto, della placenta, e dei grumi del sangue; lo che è mero lavoro della natura, che si dee lasciar operare, qualora un'emorragia formidabile, e le convulsioni non minaccino una vicina morte: in tal caso si può ricorrere al Chirurgo, o alla Levatrice, qualora l'età del feto possa dar luogo all'operazione.

Il termine del parto è, come ognun sa, alla fine del nono mese; tuttavia è talora innanzi tempo, cioè, segue sull'ottavo, o sul settimo, e talvolta anche sul quinto mese, come pare, che ci accertino molte osservazioni: oppure è più tardo, come sul decimo, sul duodecimo, ed anche sul decimosesto mese: importa molto l'essere di ciò prevenuto. E' ancora bene il sapersi, che può esser portato un bambino morto per tempo lunghissimo: abbiamo le istorie di gravidanze di 25. di 30. e di 40. anni; ma queste son quasi sempre ventrali, cioè, che in tal caso il feto non occupa la cavità della matrice. Ci hanno insegnato le dissezioni anatomiche, che trovavasi alcuna volta alloggiato nelle trombe, e nell'ovaje: si è trovato ancora sovente nella capacità del basso ventre, poichè la placenta si attacca a tutte quelle parti, che le offre il caso: abbiamo detto, che il feto morto poteva conservarvisi lungo tempo; ma se i suoi involuppi si corrompono, alterano le parti adjacenti, donde risultano flogosi, e abscessi, che talora s'aprono nel condotto intestinale, o forano il bellico, e le altre parti del basso ventre: in tutti questi casi la marcia porta via seco il feto a brani, il laceramento della matrice può dare occasione alla caduta del feto nel ventre; ma il caso è molto raro.

Il parto, quantunque accada nel termine regolare dalla natura, tuttavia espone talvolta le donne a grandissimi pericoli: la mancanza di flessibilità delle parti, che debbon dare il varco al feto; la sua debolezza, o quella della madre, sono altrettanti ostacoli non agevoli a sormontare: gli emmenagoghi, come l'aristochia, e il borace posson far qualche bene, di pari che i fortificanti, come il vino, l'acqua imperiale, e al-

tri liquori spiritosi, ec. Si fa uso altresì per i parti difficili del castoreo, e d'altri antistherici. Se siamo forzati a ricorrere talvolta ai narcotici, questo si dee fare con somma prudenza. I lavativi emollienti, e carminativi posson di pari molto giovare: finalmente è stimata la polvere di foglie di lauro impastata coll'olio, e applicata al bellico; per non far parola di parecchi altri topici noti soltanto alla plebe. Segue alcuna volta, che sieno inutili tutti i proposti ajuti non meno a motivo della rea conformazione dell'osso del baccino, o di tumori, e callosità della vagina, e della matrice, che per le gravidanze ventrali, o per la caduta del feto entro la capacità, in conseguenza del laceramento della matrice; per l'ernia di questa viscera, ec. Si vede bene, tutti i divisati casi non esser suscettibili di rimedio, ovvero volerne d'altra natura.

Se abbiamo motivo di temer molto della debolezza del feto, si dee anche di vantaggio temere la sua morte: possiamo presumerla dal cessamento del moto, che prima sentiva la madre alla matrice; dal peso, che prova nella regione di questa viscera, con una sensazione fredda; dal tenesmo, e dalla disuria; dai brividi, e dalle convulsioni; e finalmente dallo scolo di liquori fetenti. La natura tenta d'ordinario l'espulsione del feto morto, ed è anche talora pericoloso il sollecitarla: quando il feto senza vita trovisi entro i suoi involucri racchiuso, non dobbiamo in verun conto temere la putrefazione, e la matrice lo ritiene; ma se si corrompono le membrane, ben presto si sfiancano, l'acqua scola, e tutto se ne va. Quando il feto morto non può essere espulso dalle forze naturali, nè essere estratto con gli ajuti ordinarj, non vi è altro ripiego, per salvar la madre, salvo l'operazione cesarea: essa è però crudele, e quasi sempre mortale; ma non si può negare esser talvolta riuscita felicemente, quando non solo quelli, che annolla consigliata, ma anche coloro, che l'hanno eseguita, hanno avuto prudenza, e lumi sufficienti: questa operazione è sempre necessaria, allorchè la Donna muore negli ultimi mesi della sua gravidanza; e allora non bisogna perder tempo: conviene altresì, quando la madre, e il feto essendo vivi, non possiamo prometterci alcuna cosa, nè dalla natura, nè dai comuni soccorsi: questo caso venendo ben consultato, non vi è ch'esitare, avvegnachè non ci si offra

offra altro mezzo per conservar le due vite; ma questa operazione si può soltanto tentare verso il termine del parto. Troverannosi intorno a tal materia ricerche sommamente interessanti nei due primi Volumi dell'Accademia di Chirurgia.

MALI DELLE DONNE DI PARTO.

Il freddo, le passioni violente, i falli nel governo, ec. espongono le donne di parto a molti mali, la cui cura dee esser perpetuamente relativa alle circostanze cavate dallo stato del seno, e della matrice: i più ovvj sono le perdite di sangue, le diarree, i dolori colici, la ritenzione della secondina, la soppressione dei lochi, il loro flusso trasmodato, gli sconcerti, che seguono per parte del latte, l'afezione isterica, e la febbre miliare; per non parlare di molti altri, che risguardano la pratica dei parti, materia affatto pellegrina a quest'opera.

Le donne sanguigne, e che hanno trascurato di farsi aprir la vena nella loro gravidanza; quelle, che si sgravano d'un feto assai grande, ec. vanno soggette a eccessive perdite di sangue, che talora le pongono in pericolo di vita: la violenza fatta alla secondina, della quale ne vien talvolta lasciato indietro alcun brano; le mole, i grumi di sangue rattenuti nella matrice, ec. posson darvi occasione. Non vi è dubbio, che si debba cavar sangue in questo caso dal braccio, se lo permettano le forze: è necessario collocar la paziente in una situazione favorevole: si schiverà lo scaldarla; talvolta siamo forzati ad aprir le finestre della sua camera, o a trasportarla in luogo più fresco; ad applicarle delle pezze inzuppate nell'officrate ai reni, e all'altre parti, se le fa prendere anche il sugo di *porcellana*, o *porcacchia*, ed altri rimedj, de' quali abbiamo parlato. Ma tutti questi mezzi sono infruttuosi, s'è rimasto alcun brano della secondina, o qualsivoglia altro corpo nella matrice: ognun vede, che in tal caso non vi è cosa più urgente del farne l'estrazione.

La diarrea delle donne di parto fa sempre paura, come quella, che può dar motivo alla soppressione dei lochi: s'investe con i clisteri addolcenti, fatti col latte, e co' torli d'uovo, col brodo di trippe, e con altri di tal natura. Gl'ipnotici debbonsi amministrar con molta circospezione: se talvolta hanno giovato le

cavate di sangue, è cosa certissima, che non producono sempre l'effetto stesso: i rimedj atti a fissare lo scioglimento del ventre sono anche in questo caso infinitamente sospetti, perchè posson produrre lo stesso effetto sopra l'evacuazione de' lochj; tuttavia quando la diarrea è eccessiva, e che si ha motivo di temere, che la paziente non vi si possa resistere, non dobbiamo aver difficoltà d'impiegarvi i più potenti *stomachici*, e *comprimenti*, che si mettono in opera nella altre occasioni.

I dolori colici, che le puerpere provano di tratto in tratto alla regione della matrice, d'ordinario non durano più di due, o di tre giorni; è raro, che arrivino a otto: si crede comunemente, che quelle, le quali partoriscono la prima volta, ne sieno esenti: per altro si vede continuamente il contrario. I dolori, de' quali parliamo, sono talora complicati colla colica intestinale, o con qualunque altro dolore del ventre, ed è sommamente difficile il distinguerli: importa molto il calmargli, quando sono eccessivi, potendone risultare la soppressione dei lochj; ma siamo dispensati da una tal briga, quando son moderati, poichè vengon giudicati necessarj per l'espulsione di quello, che può esser restato entro la matrice; e allora sono naturalissimi, di pari che i dolori del parto: tuttavia si crede poterli impedire, amministrando alle puerpere una mescolanza d'olio di mandorle dolci, e di sciroppo di capelvenere: si fa uso del rimedio stesso per calmargli, come anche dello spermaceti, dei fiori di camomilla, di malva, ec. Possiamo ritrarre altresì qualche vantaggio dalla tintura di castore, da quella di succino, e da altri antistherici: è anche talvolta permesso il dare i narcotici, come il laudano, il diacodio, la tintura anodina, e altri. Le donne di parto, com'è noto, debbon conservare una situazione favorevole allo scolo dei lochj, e all'uscita di ciò, che può esser restato nella matrice: si fa osservare alle medesime nei primi di una severa dieta: si applican loro tovaglioli caldi nel basso ventre, e intorno alla matrice: alcuni fanno anche delle unzioni calde coll'olio di mandorle dolci; ma non si dee far gran fondamento su questo rimedio, come nè anche della focaccetta fatta coll'olio di noce, e d'altre simili fantoccherie delle buone donnuciole. Il lavativi emollienti, e addolcenti, ai quali s'aggiunge l'olio,

olio , o il butiro fresco , in questo caso son necessarij , non potendosi amministrar purganti , se non passato il flusso lochiale : d'ordinario non si purgano le donne di parto , se non dopo sei settimane ; ma un tal uso mi sembra dannabile , poichè uno s' espone allora ad imbattefsi nel punto dell' evacuazione menstruale , che non aspetta sempre a risiorire il terzo mese .

La ritenzione della secondina cagiona gravissimi accidenti , come la febbre violenta , intensissimi dolori alla matrice , l' emorragia , che non può fermarsi , l' oppressione , svenimenti , convulsioni , ec. Il fetore dei lochj ne indica la putrefazione , e il suo stanziare colà può in tal caso esulcerar la matrice : tuttavia si sono vedute delle donne ritenere la secondina due , e tre settimane , e anche più mesi , senza alcuno accidente . La natura per se sola le libera comunemente da questo peso ; ma se questo tentativo è vanto , si può ricorrere agli stessi rimedj , che si danno con mira d' agevolare il parto : tali sono il castoreo , il succino , lo zafferano , il borace , la sabina , ec. Questi ajuti sono anche con frequenza inutili , e allora non si dee esitare di servirsi colla maggior sollecitudine della mano del Cerusico , prima che l' orifizio della matrice si ristringa : questo fallo , che si commette ogni giorno , può produrre effetti micidiali : finalmente quando vi sono segni di putrefazione , si fanno delle iniezioni deterfivo , preparate coll' orzo mondo , colle rose rosse , colle cime d' iperico , col miele , coll' assenzio sottile , collo scordio , ec. Per mezzo di tali rimedj si può anche impedire l' ulcera , della quale son minacciate in tal caso le puerpere .

I lochj scolano d' ordinario , com' è noto , per otto , o per quindici giorni : segue pertanto talvolta , che terminino in due , o tre giorni , senza che ne segua alcun reo accidente , oppure , che continuino per venti , per trenta , e anche per quaranta giorni . E' la sua quantità ugualmente indeterminata , ch' è incerta la sua durazione : sonosi vedute puerpere , che non ne restituivano tampoco una gocciola : ciò interviene principalmente a quelle , che non hanno mai avuto mensrui ; ed altre gli hanno così copiosi , che fanno perfino temere , se non si fosse altronde accertati dal buono stato delle pazienti . Questo scolo è estremamente carico di sangue per uno , o due giorni ; in progresso va schiarendosi , e prende l' aspetto d' una serosità tinta , che

va insensibilmente imbiancando, e s'inspessisce come il latte, diminuendo a proporzione. La soppressione dei lochj partorisce i più rei accidenti: tali sono la tensione, e la tumefazione del ventre, l'infiammazione del seno, dolori ai lombi, e all'anguinaja, di pari che alla regione della matrice, ove sentonsi delle pulsazioni; coliche acerbissime, la passione iliaca; brividi, e la febbre, ora infiammatoria, ora porporina, o miliare; violentissimi accessi isterici, il delirio, le convulsioni, l'apoplessia, l'oppressione, i sudori freddi, la sincope, ec. Formansi ancora deposizioni purulente, che divengono funeste, se la marcia non si spiana una uscita per di fuori. Si dee giudicare dall'esposto fin quì, ch'è questa la più formidabile di tutte le soppressioni; ed arriva a portar via le pazienti prima del giorno decimoquarto. Le altre evacuazioni, come il sudor copioso, e la diarrea, sono spesso la cagione di questa soppressione, e talvolta pare, che vi suppliscano. Si fa, che il freddo, la collera, il terrore, e le altre passioni vive, gli accessi isterici, gli odori, i falli nel buon governo, ec. cagionano la soppressione dei lochj.

Si crede di dover rimediare a questo formidabile accidente col cavar sangue: quello dal piede pare indispensabile, quando la febbre è infiammatoria; ma io son d'avviso, che si debba in ciò andar molto riservati: del rimanente i Medici son divisi rispetto a ciò: alcuni propongono più cavate di sangue; altri non ne vogliono alcuna: fra i primi ve ne sono di quelli, che vogliono, che si cavi sangue dal braccio, dove molti pretendono, che sia più utile il cavarlo dal piede: ma non è difficile il rilevare, che le loro opinioni son meno fondate sulla pratica, di quello sieno sopra le loro ipotesi: del rimanente questo caso è spinosissimo; e i saggi Medici, che non ignorano, che si son vedute morire molte pazienti sotto la lancetta, stentano ad appigliarsi a questo partito: è indubitato, che il cavar sangue può esser talora utile; ma sembra ancora da tutto ciò, ch'è stato scritto intorno a tal materia, e da ciò che si osserva alla giornata, ch'è il più delle volte micidiale. Gli emmenagoghi, come la bardana, l'aristolochia, lo zafferano, la zedoaria, il castoreo, il borace, e l'elisir *proprietatis*, sono i rimedj più atti a ristabilire il corso dei lochj; ma dobbiamo astenercene, se la febbre è acuta, e infiammatoria, e in tal caso

servirsi degli addolcenti, dei temperanti, e dei miti aperienti: tali sono il brodo lungo di pollastra, e il siero per ordinaria bevanda; l'olio di mandorle dolci, e lo spermaceti; il dente di cane, la cicoria, gli sparagi, la radice di canna, i nitrosi, ec. Si fa uso talvolta, permettendolo la febbre, del kermes minerale, dell'antimonio diaforetico, e d'altri rimedj, che danno fuori per traspirazione: vi sono sovente impiecati con riuscita gl'ipnotici, malgrado il pregiudizio della maggior parte dei Pratici, i quali pretendono, che i narcotici sieno più attia troncata questo scolo, anzichè a richiamarlo. I lavativi con latte, e zucchero, col siero; gli emollienti, e gli antistherici in questo caso fanno gran bene: si applicano altresì fomento, e cataplasmi emollienti alla regione della matrice; impiastri istherici al bellico, le coppette alle cosce; si fanno fregagioni alle estremità inferiori; si schizzetta la matrice con decotti emollienti, ec.

Abbiamo detto, che alcune donne hanno i lochj abbondantissimi, senza risentirne alcuno incomodo; di modo che non è sempre dall'apparente copia di questa materia, che dobbiamo indicare del flusso trasmodato, ma bensì dagli accidenti, che porta seco, come la tensione del ventre, l'oscuramento della vista, gli svenimenti, le convulsioni, l'enfiagione edematosa delle gambe, ec. Oltre il calore, il buon governo, e il riposo, de' quali in questo caso si ha sommo bisogno; si fa uso dei temperanti, e degli addolcenti, come della cicoria, della pimpinella, e della borraia, dell'emulsioni, delle creme d'orzo, di riso, ec. Gli antistherici, e i calmanti vi sono spesso adopati con grandissima riuscita: si può finalmente alcuna volta ricorrere agli astringenti; ma l'amministrargli richiede la prudenza più consumata, e più illuminata. Importa molto il sapere, che il flusso trasmodato dei lochj è talvolta conservato, come l'emorragia, da una porzione di secondina, o da qualsivoglia altro corpo ritenuto nella matrice, dal quale un prode Cerusico può liberare sul fatto.

Il latte sul terzo, o quarto giorno del parto, risveglia una febbre leggiera (*febris lactea*) che si dilegua in due, o tre giorni mediante un lieve madore: è raro, che voglia rimedj, quando i lochj hanno lo scolo ordinario; ma se questo si sconcerta, la febbre può durar di più, e anche degenerare. Le donne, che non

vogliono allattare il lor bambino , debbono impedire l'abbondanza del latte , che può cagionare nelle mammelle uno stivamento doloroso , che dalle stesse nutrici , che non sono sufficientemente succiate dai loro bambini , talvolta patiscono , e che può cangiarsi in vera infiammazione. La severa dieta per li sette , o otto giorni primi, in questo caso è sommamente necessaria : si cuopre il seno con drappi caldi , che si mutano quando son bagnati dal latte ; lo che dee farsi con molta precauzione per ischivare l'azione dell'aria fredda ; poichè il calore in questo caso è superiore a tutti i topici , che si usano applicare : tali sono il prezzemolo , la menta , l'appio , e il cerfoglio ; la farina di fava , e di segale ; il miele , la feccia del vino , il burro fresco squagliato nell'acquavite , l'impiaastro *diachylon* , quello di spermaceti , il cerotto col *populeum* , ec. tutte queste applicazioni non sono peraltro inutili , e sarebbe cosa imprudente il volere opporvisi ; ma dobbiamo fare maggior fondamento sopra i diuretici , che possono strascinar verso i reni la materia , dalla quale si vogliono liberare le mammelle : la trementina di Scio colla polvere di centogambe , è quella , da cui si sperimentano gli effetti migliori , quando lo stato del polso ce ne permetta l'uso , e questo rimedio merita d'esser più noto. Molte puerpere hanno l'uso di far entrar la vena nella loro bevanda ; non vi è alcuna ragione , onde opporsi a un uso , ch'è per altro assai indifferente . Ma quando le poppe stivate a un certo segno , sono sommamente dolorose , siamo forzati talora a cavar sangue , ed anche a purgare , se non vi sia cosa , che ce lo contrasti : siamo anche alcuna volta obbligati a far , che un bambino succi il latte , o a farlo succhiare da altra persona : vero è , che un tal partito può conservare la disposizione allo stivamento ; ma col rimediare ai dolori presenti , dà tempo di praticare gli altri mezzi .

Può tuttavia accadere , che malgrado tutte le divise cautele , o quando sono state trascurate , può accadere , io dico , che il latte riassorto imprima nel sangue , e negli umori un reo carattere , che divien la sorgente di mali infiniti , tanto più occulti , quanto non si manifestano che troppo tardi : si chiama per lo più latte *stravasato* : si può rimediarvi colle cavate del sangue , e con un gran governo : in questo caso giovano gran-

grandemente i lassativi replicati, di pari che i diuretici, e i sudorifici: il siero, il nitro, il sale *de duobus*, la magnesia, ec. sono i rimedj più adoprati, e che meritano d'esserlo: fanno anche gran bene in queste occasioni le acque minerali: non facciamo parola dei calmanti, dai quali si può ritrarre gran vantaggio, come altresì da altri rimedj accessori, che si posson cavare dal metodo generale.

Tali sono le malattie, dalle quali son minacciate le donne, che vogliono sottrarsi alle leggi stabilite dalla Natura; ma non ne sono esenti le nutrici: lo stagnamento del latte l'espone talvolta all'infiammazione del seno, che abbraccia tutta la poppa, o ne occupa una sola parte, che divien rossa, dura, e sommamente dolorosa: il freddo, le passioni veementi, e le contusioni, danno con più frequenza motivo a questo stivamento infiammatorio inseparabile dalla febbre, e spesso accompagnato dalla sete, dal mal di testa, dalla difficoltà di respiro, ec. L'infiammazione del seno in altri tempi si scioglie con molta agevolezza, quando s'investe nel principio; ma quello, che nasce dal latte aggrumato, come si suppone, non termina che coll'abcasso: non si può schivare, quando la flogosi dura più di quattro, o cinque giorni: dobbiamo anche temere un'ostinatissima fistola, se vi si lascia covare la marcia troppo lungo tempo: un tale stivamento può anche divenire scirroso, o carcinomatoso: ne parleremo nel seguente Articolo. Le cavate di sangue dal braccio, o dal piede son atte ad impedire i progressi dell'infiammazione, o a favorire la risoluzione: si usano colla stessa mira fomite coll'acquavite, coll'acqua di calce, e col sale ammoniaco, il vapore dell'aceto abbruciato; cataplasmi colle farine di riso, di frumento, e di segale, alle quali s'aggiunge il miele; la midolla di pane, la terra dei coltellinaj impastata coll'olio; del miele puro, del quale si inzardavano le foglie di cavolo rosso preparate per tale effetto; delle foglie di giusquiamo cotte sotto la cenere; degl'impiastri di diachylon colle gomme, e di spermaceti; si applicano ancora sacchetti caldi, pieni di sale, di crusca, di fiori di sambuco, e di camomilla, oppure una vescica piena del decotto dei medesimi fiori: finalmente si cuopre il seno con una pelle d'agnello: ognun sa finalmente, che si dee tener libero il ventre con lavativi addolcenti,

ti, e emollienti. Ci fa vedere la quotidiana esperienza, che non si possiamo dispensare in queste occasioni di asciugare la sorgente del latte, poichè si invierà sempre verso la mammella offesa, fino a tanto che l'altra non riceverà. L'applicazione delle foglie d'appio, di prezzemolo, di cerfoglio, e di menta, degli anaci, e del finocchietto, del miele, del grasso di serpe, dell'olio di camomilla, e dell'unguento d'altea, sono atti a produrre questo effetto. Non si dee perder d'occhio in questa cura il corso dei lochi, che può meglio di tutt'altre evacuare il seno. Finalmente se non si veggono segni sensibili di risoluzione verso il quarto, o il quinto giorno, bisogna aspettarsi la suppurazione, e favorirla con i mezzi, che fra poco additeremo.

Le nutrici sono di più soggette alle screpolature delle poppe: vi si rimedia con i topici addolcenti, e disseccanti: tali sono il burro, la mucilaggine di semi di mele cotogne, l'olio d'uova solo, o mescolato con una porzioncella di quello di mirra per deliquio; il miel rosato, l'*album rhabis*, il ponfolice, l'impiaastro di cerusa, ec. Siamo alcuna volta forzati per por fine a questo male, benchè leggiero, a far perdere il latte alle nutrici, poichè il succhiamento, come agevolmente si concepisce, può conservarlo.

La febbre miliare, che investe sovente le puerpere, si fa vedere in varj tempi, ma con più frequenza in quello della febbre del latte, di cui ella è una complicazione: è poco diversa da quella, che viene in altre circostanze, e di cui abbiám fatto menzione nella prima Parte di quest'Opera: osserviamo solo, che la gravezza di testa col tintinno delle orecchie; l'oppressione, il polso debole, e disuguale, ec. in questo caso sono pessimi segni: si teme ancora lo scioglimento del ventre, che può frastornare il flusso lochiale, e disordinare l'eruzione: il delirio, se non è mortale, può in tali circostanze degenerare in mania, che duri lungo tempo, e anche per tutta la vita. I temperanti, come la cicoria, la borraia, il cerfoglio, e il crescione vi vengono adoperti: sono stati alcuna fiata proficui gli assorbenti, di pari che il Kermes minerale, e altri diaforetici, e cordiali, dei quali però bisogna far uso riservato, potendo divenire incendiarij: i vesicanti alle cosce, o alle gambe, quando gli richieggió lo stato della testa, e del petto, son sempre molto

to efficaci: i calmanti, che talora s' amministrano con soverchia familiarità, possonvsi impiegare colle dovute riserve: le cavate di sangue in questo caso sono sospette: quella del piede, che si pratica tanto arditamente, mi è sempre paruta pericolosa, e si è osservato più d'una fiata, come in questa circostanza ella aveva dato motivo all' infiammazione del basso ventre: tuttavia senza bandire assolutamente le cavate di sangue, che alcuni accidenti rendono indispensabili, si può per mio avviso pronunciare, che nel numero delle febbri di questo carattere questa è peravventura quella, che ne richiede meno: finalmente i lassativi, quando gli accidenti ne permettono l'uso, non si debbon trascurare.

Ognun sa, che l' affezione isterica si produce molto in iscena nelle malattie delle donne di parto, e ch' è pericolosissimo il riferire ad altra cagione i sintomi, sovente orribili, che ne dipendono: questo fallo pertanto è comunissimo; ma non vi cadono i Medici dotti, e sperimentati. Vi si rimedia, avendo riguardo alle circostanze, colle medicine da noi proposte nell' Articolo assegnato a questo male.

MALI DELLE MAMMELLE.

Oltre gli sconcerti provenienti dal latte, di cui abbi-
am parlato nel precedente Articolo, le mammelle van-
no anche soggette a molti altri mali: tali sono il loro
gonfiamento doloroso; negli anni della pubertà la loro
infiammazione, e il loro abscesso; lo scirro, e il can-
cro. L' accrescimento delle mammelle nelle fanciulle se-
gue talora con tanta prontezza, che ne sono somma-
mente molestate: alcuni giovanetti son soggetti verso la
medesima età a un somigliante accidente: sì le une,
che gli altri lo sopportano comunemente senza lagnar-
sene, e ve gli forzano i solo dolori eccessivi: si procura
di calmargli col calore, col buon governo, colle ca-
vate di sangue, e con i lassativi.

L' infiammazione del seno nasce di rado da cagione
interna, se ciò non segua nelle donne di parto, ma
con più frequenza da alcuna contusione: è accompa-
gnata da molto calore, da tensione, e da dolore della
parte, e d' ordinario dalla febbre. E' cosa rara, che si
possa terminare colla risoluzione: il più delle volte de-
genera in abscesso, e talvolta in scirro, e in cancro.
La sua cura è poco diversa da quella delle altre in-
fiam-

fiammazioni , non meno per le cavate del sangue , e per i rimedj interni , che per i topici : fra i secondi l'impiaastro di spermaceti è il miglior risolvente , e addolcente , che si possa usare : vi s' applica ancora il sale inumidito coll'orina , e rinchiuto in un sacchetto: i fiori di sambuco , il cataplasma delle farine , la midolla di pane , e altri , sì risolventi , che suppuranti , da noi proposti contro lo stivamento infiammatorio proveniente dallo stagnamento del latte . L'abcisso , ch'è il prodotto dell'infiammazione , è talvolta situato tanto profondamente , che si stenta a sentirne la fluttuazione : si cura , come quelli delle altre parti , con i cataplasmi emollienti , e suppuranti , coll'impiaastro *basilicon* , col *divino* , ec. Bisogna piuttosto aprirlo colla lancetta , che col caustico , e non indugiar troppo , affinchè lo stanziamiento della marcia non cagioni la fistola: quindi si medica la piaga , tanto semplice , che fistolosa col metodo ordinario .

Lo scirro del seno è un male dei più comuni , e dei più terribili per la disposizione , che ha a farsi canceroso: non ci acquieta , nè il suo non esser doloroso , nè il suo esser mobile , poichè si sa pur troppo , che molti cancri hanno avuto lo stesso principio: tuttavia non credo , che si possa seguire il sentimento di coloro , che in tutti questi tumori riconoscono il cancro , incontrandosi alla giornata femmine , le quali portano per tutta la vita loro senza incomodo ciò , che si chiama *glandula del petto* . La malinconia , la soppressione de' menstrui , e principalmente le contusioni , vi danno motivo: questa malattia è soprattutto familiare alle donne di quei quarantacinque e di cinquant'anni . Si dice comunemente , ch'è cosa pericolosa a porvi mano ; con tutto ciò non si lascia d'applicarvi dei rilascianti , e dei risolventi: tali sono l'impiaastro di mucilagine , e di spermaceti; quello di cicuta , e di *vigo* , il diabolano , ec. Questa pratica può anche riuscire , allorchè si son fatti precedere i rimedj generali , di pari che gli addolcenti , i temperanti , gli aperienti , e gli squaglianti , vale a dire , il latte , e il siero ; la cicoria , la borra , la pazienza , e il crescione ; l'aristolochia , i centogambe , i fiori marziali del sale ammoniaco , le preparazioni mercuriali , ec. Lo scirro recente può cedere , e talvolta in fatti cede a questa cura ; ma l'invecchiato fa testa a tutto , nè può esser domato , che per mez-

zo dell'estirpazione : per l'uno, e per l'altro debbonfi schivare i topici suppuranti, dai quali se ne sono costantemente veduti rei effetti.

Il cancro occulto è poco differente dallo scirro : si pretende, che si possa portar l'uno, e l'altro lungo tempo, cioè 30. e 40. anni, senza incomodo; ma se si va irritando il cancro con dei topici, s'esulcera, e diviene atroce. Si parla di varj cancri esulcerati del seno, risanati coll'applicazione del cardo benedetto, della radice di sinfito, dell'aristolochia; col mele stemprato nell'acqua di papavero silvestre, di piantaggine, e di rose, colla sabina, coi precipitati, coll'arsenico, col verderame, col sublimato corrosivo, e con altri detergenti, e catetretici : ma se questi rimedj ne hanno qualche volta operata la guarigione, come venghiamo accertati, si sa pure, che il più delle volte hanno prodotto effetti funestissimi. Il latte però, dopo i rimedj generali, il siero, le acque acidule, le piante temperanti, e epatiche, ec. possono impedirne, o ritardarne gli avanzamenti : si crede d'aver veduto talvolta de' buoni effetti dai diaforetici ; ma è certo, che la dieta rinfrescante è sempre meglio riuscita : vi sono ancora alcuni topici, che si possono adoperare come palliativi : noi ne abbiamo parlato nell'Articolo generale dei tumori. Finalmente l'estirpazione è il solo ripiego, che ci si offre; ma tutti i cancri, non ne sono suscettibili ; e appunto per non saperne giudicare, questa operazione è con frequenza infruttuosa, ed anche micidiale : ella può essere ancora tale, allorchè si è trascurato di far precedere i dicevoli preparativi : tuttavia per quanto mostri d'esser felice la riuscita dell'estirpazione, non ci assicura della recidiva, se uno non s'applica a prevenirla con un ottimo governo, coll'uso dei miti purganti, dei temperanti, e dei depuranti, i quali, correggendo la pecca degli umori, possono investire il male nella sua stessa forgente.

MALATTIE DELLE PARTI GENITALI.

Comprenderemo sotto questo titolo il *furore uterino*, l'*infiammazione*, l'*ulcera*, lo *scirro*, e la *cancrena della matrice* : il *prolasso* di questa viscera, e quello della *vagina* ; la *falsa gravidanza*, per cui non si debbono soltanto intendere le varie *mole* ; ma anche le *collezioni d'aria*, *d'acqua*, o di *sangue*, che danno oc-

cazione allo stesso equivoco; e finalmente il *fluor bian-*
co. Non ripeteremo quì ciò, che abbiamo già detto
 dell'ernia della matrice nello stato di gravidanza; non
 parleremo nemmeno delle ragade, dei porri, dei corni
 dilomi, ec. che investono le parti genitali d'ambi
 sessi, di cui abbiamo pure ragionato: troncheremo al-
 tresì da questo Articolo ciò, che riguarda le confor-
 mazioni viziose, i tumori, ed altre ostruzioni della vaa
 gina, che si attraversano non meno allo scolo mern-
 struale, che alla copula, mentre le abbiamo collocate
 sotto l'Articolo della sterilità.

Il furore uterino non si manifesta sempre per le pa-
 role, e per le azioni delle ragazze, o delle donne:
 che ne sono molestate; ve ne è, massime fra le pri-
 me, di quelle, che conservano grado tale di ragione:
 e di verecondia, che si contengono, ed occultano con
 grandissima cura lo stato loro; ma le infelici non sono
 perciò meno da compiangersi. Questo è indubitamente
 un effetto della gioventù, e del temperamento; ma
 le letture, i discorsi, i pensieri osceni, e soprattutto
 l'eccessiva manstrupazione, vizio così comune, come
 occulto; e finalmente l'uso d'alimenti riscaldanti, che
 sviluppano, e lo fiancheggiano: questa vergognosa ma-
 lattia investe principalmente le ragazze sugli anni della
 pubertà, ma non rispetta le altre età: sonosi vedute
 perfino donne di settant'anni esserne investite violenta-
 mente: non ne va esente l'età più tenera: si fa men-
 zione d'una ragazzetta di tre anni, che ne provò i pri-
 mi assalti, ma il male le era ereditario. I parossismi
 del furore uterino son più, o meno violenti, e degenera-
 rano talora in verace mania, che fa testa a tutte le me-
 dicature: nella maggior parte di quelle, che son morte
 in questo stato, si è trovato la matrice infiammata; la
 clitoride, e l'ovaje d'una smisurata grossezza, e lo stesso
 si è osservato dei reni.

Le cavate di sangue dal braccio, e dal piede in que-
 sto caso sono indispensabili: utilissimo è l'emetico, di
 pari che l'uso dei *minorativi*: non debbonsi risparmiare
 i rinfrescanti, come la lattuga, la cicoria, l'indi-
 via, il nenufar, le viole mammole, le emulsioni, il
 siero, ec. i calmanti narcotici non vi sladdicono; ma
 si posson ritrarre vantaggi grandissimi dalla canfora,
 dal succino, dal castore, ec. Quando i menstrui son
 soppressi, si ricorre al tartaro, ai marziali, all'acqua
 fer-

ferrate, e agli emmenagoghi : in questa cura debbon talora aver parte gli assorbenti ; per non parlare di molti altri rimedj, dei quali abbiamo fatto menzione negli Articoli della frenesia, e della mania, dei quali si può fare una felice applicazione al presente caso. I clisteri coll' officrate, e con altri rinfrescanti fanno gran bene : finalmente fanno tutti, quanto efficaci sieno i bagni in questa occasione, massime se si ha la cura di tenergli più freddi, che caldi : non parlo dei ripieghi, che si possono ricavare dai consigli, dalle orazioni, dalle esortazioni, e dalle minacce : questi son di sommo peso, quando il male non si trova nell' ultimo suo periodo.

L' infiammazione della matrice è un male gravissimo, e forse dei meno conosciuti : non è già, che tutti gli Scrittori non ne abbiano parlato ; ma sembra, che i Pratici, pel maggior numero, sieno stati scarsi di lumi : tuttavia il calore, il dolore, e la tensione dell' ipogastro, che ne è talora sollevato sensibilmente, di pari che tutto il basso ventre, congiunti a febbre ardente, a briviture irregolari, all' aridezza della bocca, all' oppressione, ai deliquj, al delirio, e alle convulsioni, la caratterizzano molto bene : bisogna aggiungere il dolore dei lombi, dell' anguinaja, ed anche delle cosce, quando la paziente si volta sul fianco, o fa qualch' altro moto ; la voglia, e la difficoltà d' orinare, il tenesmo, le nausee, il singhiozzo, la gonfiezza, e il dolore del seno, il dolore alla schiena, e alle spalle, ec. Tutti questi accidenti variano per l' estensione dell' infiammazione, che può involuppare tutta la matrice, o occuparne una sola parte. La flogosi della matrice è quasi sempre mortale, e non v'è più in là del settimo giorno, ch'è il più da temersi : di rado termina colla risoluzione, ma con più frequenza colla suppurazione, o colla cancrena : le lanciaure più acute, e l' esacerbamento di tutti gli accidenti sono i segni della prima : i brividi, gli svenimenti, e il sudor freddo, annunziano la seconda : ella degenera anche in scirro, o in cancro esulcerato, del quale parleremo qu' appresso. Le contusioni, le violente passioni, la soppressione de' menstrui, gli aborti, e soprattutto gli accidenti, che sopravvengono alle donne di parto, come la soppressione dei lochj, la ritenzione della secondina, e altri, de' quali abbiamo parlato, ne sono le cagioni più ordinarie. Ci ha fatto sapere l'apertura dei cada-

Q 2

veri,

veri, che l'infiammazione della matrice si comunica d'ordinario alle trombe, e all'ovaje, ed anche a varie altre parti adjacenti.

In questo caso non si dee risparmiare il cavar sangue; ma non bisogna lasciarne passare il tempo, cioè i tre primi giorni: è questo uno de' più rilevati punti: nel tempo stesso si dee fare un grand'uso degli allentanti, e degli addolcenti, come del brodo di pollastra, delle ptisane di fiori di malva, e di seme di lino, dell'olio di mandorla dolce, dello spermaceti, ec. i lassativi più miti possono prescriversi, di pari che i lavativi addolcenti, e rinfrescanti: sovente giovano gli antistaterici interni, come ancora varj altri rimedj, che possono adattarsi ai mali primitivi, e accessori, che son complicati con quello, di cui parliamo: ultimamente non si trascureranno le fomentate, e i cataplasmi atti a rilasciare; per non dir niente di parecchi altri rimedj comuni a tutte le infiammazioni.

Non è sempre agevole il rilevar col tatto lo stivamento scirroso della matrice; ma si può conghietturarlo, quando, dopo i forieri noti di questo morbo, che sono l'ostruzione, e l'infiammazione, le pazienti si lagnano d'un peso alla regione ipogastrica, di dolori ottusi ai lombi, all'anche, e talora alle cosce: in queste circostanze i menstrui sono soppressi, o scolorano in poca quantità, e irregolarmente: ma talvolta sopravvengono emorragie: lo scirro della matrice, come quello delle altre viscere, dà sovente motivo all'ascite, e alla leucostemazia. E' assai probabile, che nei principj si possa dileguare questo stivamento, e che anche facciasi spesso, senza saperlo, e senza dubitarne: ma per lo più non si manifesta, se non quando non è più guaribile. Sovente per non dir sempre, degenera in ulcera cancerosa. C'insegna l'apertura dei cadaveri, che questo morbo è meno raro di quello altri pensi: la matrice, che offre più gradi di durezza, sembra con frequenza cartilaginea, alcuna volta mezzo ossea, e perfino impietrata: non si è scoperta minor varietà nel suo volume: talora non eccede la sua grossezza naturale: si è anche veduta più picciola; ma comunemente la sopravvanza, e talora assai, sendosi trovate matrici scirroso del peso di trenta e di quaranta libbre. Le ovaje, come è noto, vanno soggette ai medesimi stivamenti, che posson di pari manifestarsi al tatto, e all'occhio.

E' mol-

E' molto difficile il distinguere il cancro dall'ulcera della matrice: sembra pure, che si riguardino tali denominazioni come arbitrarie: i dolori intensissimi, e lancinanti, che sentonsi nella matrice, e che si riferiscono alle adiacenze, le materie saniose, purulente, e fetide, che ne scolano, e che esulcerano sovente la vulva; le frequenti emorragie, il tenesmo, e la stranguria, uniti alla febbre lenta, che ha esacerbamenti irregolari, caratterizzano molto bene un tale stato. L'osservazione ci ha più volte additato, che la matrice esulcerata, e cancerosa, poteva putrefarsi, o incancrenirsi; che tali sconcerti si comunicavano cogl'intestini alla vescica, e all'altre parti vicine, e che erano sempre uniti a uno stravasamento, più, o meno considerabile.

La Medicina ci somministra pochi mezzi contro lo scirro, e il cancro della matrice: gli aperienti, e gli sguaglianti più accreditati, e che giovano talora per gli scirri delle altre parti, non producono quasi alcuno effetto contro quelli della matrice, e delle ovaje: la ragione è forse, come abbiamo fatto osservare, perchè non s'attaccano, se non quando sono già fatti incurabili: so, che certuni si vantano d'averne guariti; ma hann'eglino ben giudicato la cosa? e possiamo noi credere alla loro asserzione? Sia com'esser si voglia, i tentativi, che fanno ogni giorno andando a vuoto, per lo più si abbandonano, per attenersi ai palliativi, non meno per lo scirro, che pel cancro, o per l'ulcera. Di questa cura palliativa fanno la base il latte, e le creme, per non parlare delle emulsioni, e d'altri addolcenti. Si sperimentano buoni effetti dalle acque minerali fredde, che talvolta si mescolano col latte: la magnesia, e gli altri assorbenti possono similmente giovare: gl'ipnotici finalmente procurano dei sollievi, che mascherano gli errori di questo stato infelice: si fa parimente uso colla mira medesima, dei bagni, e dei mezzi bagni, dei lavativi emollienti, delle iniezioni addolcenti, anodine, vulnerarie, e deterfive, dei profumi colla storace, col succino, ec.

Il prolapsò della vagina, e talvolta della matrice, è d'ordinario la conseguenza dei parti difficili; ma l'idropisia, il fluor bianco invecchiato, gli sforzi, le fatiche penose, ec. vi danno anche occasione: è raro fra le fanciulle; tuttavia non ne vanno esenti; si pretende perfino d'aver veduto una calata della matrice

in una ragazzetta di tre anni . Un tempo si prendeva il prolapso della vagina , ch'è comunissimo , per quello della matrice , e si è inoltrata l'ignoranza perfino a osservare , che molte di quelle , le quali nell'occasione di questo slogamento avevano sofferto l'estirpazione della matrice , non avevano in progresso lasciato di concepire , di partorire ancora felicemente : tuttavia si danno de' genuini prolapsi della matrice ; ma non sono a un pezzo così comuni , come quelli della vagina . Nascono parimente dall'una , e dall'altra parte dell'escrescenze polipose , le quali , uscendo più , o meno per la vulva , sono state frequentemente prese per prolapsi ; ma la lor forma è diversa , e il polipo , come dee pensarsi , non potrebbe avere quell'apertura , ch'è sempre agevole rilevarsi nella parte inferiore d'esso prolapso : non vii è , che il total roversciamento della matrice , morbo assai raro , che far potesse qualche difficoltà , qualora il ricovramento sempre agevole non lo distinguesse benissimo dal polipo : oltredichè un tal roversciamento non segue , che a motivo del parto , e comparisce in brev'ora , dove il polipo s'accresce lentissimamente .

Quando queste parti slogate son sane , si procura di farne la riduzione : ella è talora difficoltosissima , e spesso anche impossibile , quando la parte è stivata , e che il male è invecchiato . Queste parti essendo ricovrate nel loro verace sito , bisogna ritenervele , e questo è il punto più essenziale : posson produrre un tal effetto il letto , e il riposo , quando il prolapso è recente ; ma s'è vecchio , si ricorre alle *supposte* fatte a foggia d'anello , coperte di cera ; la loro materia ordinaria è il legno , e pezze di tela : gli astringenti , marziali , gli amari , e i tonici , sono i rimedj interni de' quali si può far uso , senza incomodo : vi s'impiega spesso il rabarbaro : si propongono anche i sudorifici ma io non veggio , che ciò corrisponda all'osservazione quanto alla loro utilità : le fomentate astringenti , e stitiche , come altresì i topici di tal indole , finalmente sono accessoj , che posson far del bene . L'infiammazione , e l'ulcera , che investono con frequenza queste parti slogate , richiedono la lor cura ordinaria . Si rimedi alla cancrena colle scarificazioni , e con l'applicazione dei dicevoli rimedj : talvolta siamo forzati a farne l'apertura , intorno a che veggansi le opere di Chirurgia

FALSA GRAVIDANZA.

Le malattie, che imitano a gravidanza, sono le mole carnose, o vescicolari; il raccoglimento dell'aria, del sangue, o dell'acqua nella matrice; e finalmente il tumore delle ovaje, e delle trombe. La mola carnososa occupa d'ordinario tutta la cavità, più o meno estesa, della matrice; ma vi s'imbatta alcuna volta colla gravidanza: la sua consistenza corrisponde molto alla sua denominazione; tuttavia sonosene vedute delle cartilaginose, e anche delle ossee: si crede, che questa possa formarsi, senza il commercio dell'uomo; ma, malgrado tutte le osservazioni, le quali par, che fiancheggiino questa opinione, la cosa si rimane tuttora incertissima: torna bene però supporla talvolta vera, quando fosse per salvar l'onore delle fanciulle, o delle vedove, che si trovano nel caso. Sovente è difficilissimo il distinguere la mola carnososa, non solo degli altri corpi inanimati, che son rinchiusi nella matrice, ma ancora dalla vera gravidanza: tuttavia la matrice, che contiene una mola, è meno fissata, e par, che ruotoli con una sensazione di peso, che la paziente prova stando in letto, ogni volta che cambia situazione: abbiamo detto, come nella gravidanza il ventre forma una specie di punta verso il bellico; nella mola il tumore tondeggia più ugualmente: la grossezza del ventre si manifesta più presto per la mola, che per la gravidanza: si sa, che gli accidenti della gravidanza variano, e che per lo più sono più considerabili nei primi mesi, per iscemare verso la metà, e sul fine: per lo contrario si mantengono nella mola, e faunosì anche più gravi: il feto rinchiuso nella matrice, non cede all'impulsione della mano, come la mola: la faccia delle donne gravidie è migliore di quelle, che hanno una mola: i menstrui nelle seconde si fanno sovente vedere sul quinto, o sul sesto mese, sebbene irregolarissimamente, lo che non segue, o di rado assai nelle gravidie. Finalmente il segno più distintivo, e il meno equivoco, dee cavarfi dal moto del feto, che le donne sentono sul quarto, o quinto mese di lor gravidanza, e dal termine del loro parto, al quale non è soggetta la mola: può questa restar lungo tempo nella matrice, e talora per tutto il tempo della vita, senza molto incomodo, se non sia quello, che nasce dal

fuoi peso; ma può ancora eccitare i più formidabili accidenti, ed emorragie mortali, quando si stacca molto tardi.

E' indubitato, che vien sovente presa per una mola la *secundina* rimasta nella matrice, non meno del feto d'alcuni mesi, che del fanciullo, ch'è maturo: si è pure osservato, che la placenta poteva convertirsi in *idatidi*, che addimandasi *mola vescicolare*, ovvero prendere un'altra forma, che può col tempo acquistare un volume straordinario, a segno d'imitare la più avanzata gravidanza. Sono state parimente prese per mola certe picciole masse di sangue coagulato, alle quali il tempo, e lo stanziar colà entro, avevano dato una grande solidità. Pochi rimedj conosciamo per le mola: poco necessarie vi sono le cavate del sangue; ma si può ritrarre qualche prò dall'emetico, dai purganti drastici, e dai clisteri stimolanti, come altresì dalle supposte preparate coll'elleboro, colla sabina, colla colliquintida, e con altre droghe piccanti: gli emmenagoghi, e i rimedj atti a espellere la *secundina*, o il feto morto, si possono in questo caso sperimentare, ma richiedono prudenza non poca: non si può ritrarre gran vantaggio dai bagni, dai mezzi bagni, dalle fomentate, e dalle iniezioni emollienti; tuttavia non debbonsi trascurare: è altresì d'un debole ajuto in questo caso la mano Chirurgica, e non si tenta questo mezzo, se non vi venghiamo costretti dall'emorragia.

La mola vescicolare, a cui le cachetiche vanno grandemente soggette, è, come dicemmo, un'unione d'*idatidi*, legate comunemente in grappoli, di modo che può esser considerata come un'idropisia infaccata. Non si conosce gran fatto questa malattia, se non quando è terminata dall'espulsione delle *idatidi*, delle quali le donne hanno talvolta restituiti intieri bacini: tale espulsione è lavoro della Natura, e segue d'ordinario più tardi del parto comune: non dee farci temere la perdita del sangue, che l'accompagna: se s'incontra colla gravidanza, il parto n'è il termine. Anche in questo caso si cavano pochi soccorsi dalla Medicina: si procura soltanto, e prima, e dopo l'evacuazione, di conservar le forze della paziente con dicevoli alimenti, ed anche con i rimedj fortificanti, quando non vi si oppone l'emorragia. Inoltre sonosi trovati nella matrice tumori anomali, escrescenze polipose, che vi erano

racchiuse , concrezioni pietrose , ec. ma queste inutili scoperte non posson farsi , che dopo la morte .

La mola ventosa non è altro , che l' enfiagione della matrice per l' aria , che vi si è imprigionata : vi è malissimo applicato il termine di mola ; noi però ce ne serviremo come di moneta corrente : imita questa come le altre , la gravidanza , ma colla differenza nella forma del ventre , che abbiamo già osservata , non provando le donne in questa la sensazione del peso , e quella specie di ruotolamento , che accompagna le altre mole , e n' è evidente la ragione . L' uscita delle flatuosità , che segue più , o meno tardi , dilegua in cortissimo tempo questo tumore : sonosi vedute donne credutesi gravide , restar sommamente sorprese di sgravarsi così presto , massime quando questa irruzione , sempre sommamente sonora , è seguita , come accade talvolta verso il termine ordinario del parto ; tuttavia comunemente si porta per più lungo tempo , e anche per uno , e per più anni . Del rimanente sonosi vedute molte donne restituire abitualmente delle ventosità per la matrice , come per l' ano , con questa differenza , che la volontà non può rattenere le prime , le quali sboccano senza esserne avvisata la donna da alcuna sensazione , ed espongono ad indecenze , che tengono sempre in timore . Se si potesse giungere a conoscer questo male , sarebbe facilissimo il dileguarlo , con aprire l' orifizio della matrice , che tiene imprigionate le ventosità ; ma siccome per lo più non si manifesta , che per la loro uscita , anche prima d' averne avuto sospetto ; così non possiamo pensarvi . I purganti energici , e i lavativi irritanti , che si son dati con altre mire , hanno talora procurato l' espulsione delle ventosità : adunque è evidente , che si potrebbero impiegar con vantaggio contro questo male .

Abbiamo già parlato del raccoglimento del sangue nella matrice in seguito della ritenzione dei menstrui : abbiamo detto , che la grossezza del ventre , che ne dipendeva , imitava , come nei casi precedenti , lo stato delle gravide , e ch' era difficile il non ingannarsi : tuttavia quando vi si farà buona attenzione , si potrà distinguer questo male dalla gravidanza : il ventre nell' affezione di cui parliamo , è più voluminoso verso il quarto , o il quinto mese , di quello debba essere nella vera gravidanza : questo segno distintivo , ch' è comune

ne

ne a molti dei casi precedenti , è fiancheggiato dalla mancanza del moto , che appartiene al feto solo , e che le donne gravide non lasciano di sentire verso il tempo medesimo , moto , che coloro , che hanno qualche uso di questa prova , rilevano benissimo , applicando sul ventre la mano fredda , e bagnata . Abbiamo detto , che lo scioglimento di questa malattia , e d' ordinario opera della Natura ; ma vi sono molti mezzi per entrar nelle sue mire , e per secondare le sue operazioni , quando si può aggiungere i dilungamenti .

Se i casi precedenti ci offrono difficoltà grandi , non ne incontreremo delle minori nell' idropisia della matrice : questa , come le altre , imita la gravidanza , la quale anche accompagna , di pari che l' ascite . E' difficilissimo il sentire in questo caso quella fluttuazione , che nell' ascite è così manifesta : la forma del ventre , come negli altri ammassi uterini , è tondeggiata più ugualmente , di quello sia nella gravidanza ; oltredichè le mammelle sono appassite , e il volto è pallido : finalmente , come si è osservato , si prova una sensazione di peso nella matrice , che non prova si nella vera gravidanza . Le donne sterili , le cachetiche , e le scorbutiche , sono le più soggette a questo morbo . Se questo non è complicato , s' investe con i rimedj ordinarij , da noi proposti negli Articoli dell' ascite , e della leucostemazia : si può anche , quando il male è noto , procurar l' espulsione dell' acque , come quella degli altri fluidi racchiusi nella matrice , col dilatar l' orifizio di questa viscera . Siamo dispensati di tal pensiero , quando s' imbatte colla gravidanza , perchè l' evacuazione dell' acque precede d' ordinario il termine del parto d' alcune settimane , ed anche d' un mese . In tal circostanza questa evacuazione , s' è considerabile , non è senza pericolo , sendosi vedute donne , che son morte dopo l' uscita dell' acque , o avanti , o nel tempo del parto , che n' è talora ritardato : in quest' ultimo caso possiamo ricorrere ai vomiti , ai purganti drastici , e ai clisteri stimolanti : si può anche far uso del borace , della sabina , dello zafferano , e d' altri emmenagoghi . Si procura d' ordinario in tutti gli ammassi uterini di rilasciar l' orifizio della matrice con i bagni , coi vapori , colle iniezioni , e colle fomentate : si può , sotto varj pretesti far uso di questi mezzi , senza esser tenuto della riuscita ; ma bisogna esserne certo , quando uno si deter-

mina

mina d'introdurre la mano, o l'istrumento nella matrice, per dare il varco alle materie, che vi covano.

Abbiamo detto, che le trombe, e le ovaje erano anche soggette all'idropisia, e a dilatamenti, per sì fatto modo enormi, che possono collocarsi fra le false gravidanze. Rarissima è l'idropisia delle trombe; ma comunissima si è quella delle ovaje: queste parti in tal caso degenerano in una specie di sacco, che può contenere più pinte d'acqua. Queste idropisie sono ugualmente difficili a conoscersi, che a curarsi: talvolta si prendono per l'ascite, tal altra per la gravidanza vera, o falsa, ec. In queste *idropisie infaccate* l'undulazione non è sensibile, come nell'ascite, benchè possano contenere trenta, e quaranta pinte di materia; ma essendo per lo più gelatinosa, o fissa, e rinchiusa talora in diverse cellette, la fluttuazione, com'è agevole a concepirsi, non è manifesta: questi enormi dilatamenti non diminuiscono la fìschezza di questi organi, che per lo contrario divengon molto più solidi: sonosi vedute delle ovaje evacuate delle loro acque, pesare venti, e trenta libbre. Il più delle volte non si conoscono queste malattie, se non per l'apertura dei cadaveri: tuttavia, quando si è fatto un poco d'attenzione ai primi loro progressi, si può distinguerli da ogn'altra idropisia. Le donne avanzate in età, e che sono state sterili, vi sembrano più soggette: non ne sono al coperto le fanciulle: l'une, e l'altre posson portar lunghissimo tempo questi tumori, cioè, trenta, quaranta, e anche cinquant'anni: sono stimati incurabili; eppure per non conoscergli sono stati fatti molti tentativi per pronunciare sopra di ciò. E' indubitato, che in questo caso possiamo far uso di tutti i rimedj, che convengono all'ascite; ma non veggionsene buoni effetti: il migliore di tutti si è l'evacuar l'acque col *bisturi*, o col *succhiellotto*: la semplice puntura d'ordinario non basta: si fa menzione d'una donna, che vi si soggettò più di cinquanta volte in meno di quattro anni, dalla quale si pretese d'aver estratto oltre mille pinte d'acqua, senza alcun buono effetto: abbiamo ancora l'istoria d'una donna di 58. anni, la quale fu risanata benissimo con un'apertura fatta al lato sempre guernita d'un cannello per ricevere le materie di varie consistenze, che posson contenere questi sacchi.

Le ovaje son parimente sottoposte a molti mali, che
non

non son gran fatto noti, se non per l'apertura dei cadaveri: abbiám parlato altrove dell' infiammazione, e dello scirro, che le investono: vi si trovano ancora tumori anomali pieni d' idatidi, e di varie sorte di materie: racchiudono altresì dei capelli, dell' ossa, delle concrezioni pietrose, ec. veggionvisi finalmente abscessi d' orido volume, putrefazioni, e talvolta la totale lor distruzione. Le trombe sono parimente esposte alla maggior parte di questi accidenti, ma son più rari.

FLUOR BIANCO.

Questo scolamento bianchiccio, ch'è stato onorato del termine di *fluor bianco*, o *flori bianchi*, attacca le fanciulle, le maritate, e le vedove: non suol cominciare prima dei dodici, o de' quattordici anni: tuttavia sonosi vedute ragazze d'ott'anni, e per fino di quattro, provarne i primi attacchi: la grandezza non ne difende; ma per lo più è sospeso nel tempo del flusso menstruale: questo ora è continuo, ora periodico, ora precede, ora segue i menstrui: in molte i suoi ritorni sono irregolari, e disturbano anche i periodi menstruali. Questo scolo è talora unito con un pizzicore, e con ardore d'orina, come quello della scolarazione venerea, ma con minor violenza: si dee riferire a una specie di cachessia, che si manifesta nella maggior parte con istanchezze, con pesi ai lombi, con inquietudini alle gambe, colla svogliatezza, per la pallidezza del viso, dalla gonfiezza delle palpebre, e dei piedi. Il *fluor bianco* (*fluor albus*) dipende spesso da un vizio scorbutico; può esser pure il prodotto del celtico, senza però potersi adomandar gonorrea, che ha un altro principio, e un'altra sede. Lo scolo, di cui parliamo, ha spesso volte un carattere sommamente equivoco. La materia è sul principio dolce, e senza odore; ma col tempo diventa acre, e fetente che rode talvolta le parti vicine, e dà occasione a ulcere, che possono intaccar la matrice: l'escerazione di questa viscera, e la semplice gonorrea, possono parimente eccitare uno scolo, che talora s'affomigli talmente a quello, di cui parliamo, che vi restano ingannati i più avveduti.

E' molto tempo, che le femmine sono in possesso di far passare le loro gonorree celtiche per *fluor bianco*: l'istoria mozza, che la maggior parte d'esse fa dello sta-

to proprio, e l'ambiguità, con cui lo cuoprono, non ci possono somministrare molti lumi, e ci offrono comunemente soli dubbj, e incertezze: bisogna aggiungere a queste difficoltà, che queste due malattie si trovano spesso complicate. Nulladimeno tutt'e due hanno i loro segni, ma non gli possiamo avere, che dalla confessione sincera delle pazienti: nel fluor bianco, oltre le stanchezze, il dolore aggravante dei lombi, la gonfiezza, e gli altri segni della cachessia, de' quali abbiám parlato, si dee osservare la qualità della materia, ch'è bianchiccia, o giallognola, pituitosa, o muccosa; ma dolce, e senza odore nei primi tempi, e che non diviene acre, corrosiva, e fetente, se non quando il male è vecchio: bisogna ancora osservare, che questo scolo rimane interrotto nel tempo del flusso menstruale, e un esacerbamento più, o meno manifesto, allorchè dee riprodursi. L'ardore d'urina, la stranguria, e il prurito della vagina, che assai di rado s'uniscono al fluor bianco, per mezzo di loro violenza caratterizzano la gonorrea: da principio la materia n'è bianca, quindi diventa gialla, verde, e purulenta, talvolta corrosiva, ma di rado fetente: oltre di che la gonorrea non cessa nel tempo dello scolo menstruale, e la materia, che scaturisce, per lo più è meno copiosa: la sede della gonorrea è principalmente intorno all'uretra, e gli altri scoli vengono dalla vagina, e dalla matrice: la gonorrea comparisce poco dopo un commercio impuro, e termina, quando non è trascurata nello spazio di quaranta, o di cinquanta giorni, diminuendo sensibilmente verso il fine: si sa, che il fluor bianco è sempre più ostinato, e che dura degli anni. Abbiamo minor difficoltà a conoscer l'ulcera della matrice, non meno dagli antecedenti, che dai vivissimi dolori, che provansi alla regione di questa viscera; oltre di che lo scolo è sanioso, o purulento, e quasi sempre fetente, per non parlare degli altri segni, de' quali abbiamo fatto menzione. Il fluor bianco, che scola in poca quantità, alcuni giorni prima dei menstrui, e che non è accompagnato da alcuna sensazione, non è da temersi; ma quando questo flusso è più copioso, senza intervallo, invecchiato, e che cagiona irritamenti, debbonsi temerne le conseguenze: si pretende, che le donne, le quali si trovano in questo stato, possono comunicare al loro marito una gonorrea leggiera, che termina nello spazio di quei sette, o ot-

to giorni: questo fatto però, tuttochè probabile, non è gran fatto confermato.

Il morbo, di cui ragioniamo, passa con ragione per uno dei più ostinati, singolarmente nelle donne libidinose, che ne son fatte per lo più sterili: è ancora più difficile a guarirsi nell'età fra i quaranta, e i cinquant'anni, cioè dopo il cessamento de' menstrui: il fluor bianco precipita spesso nel marasmo, o ingenera un'ulcera nella matrice, che può dar motivo a orribili emorragie, che posson esser mortali. I disgusti, e l'avversità vi danno occasione con frequenza, e lo conservano; è ancora la conseguenza del parto, degli aborti, delle perdite di sangue, ec. L'osservazione anatomica ci dà poco lume rispetto a questo male: sono i trovate ulcere, putrefazioni, e la cancrena, nella matrice non meno, che nelle trombe, e nelle altre parti adjacenti, lo che non si potrebbe considerare, se non come il prodotto del fluor bianco: si sono anche veduti degl'imbarazzi nel fegato, e in alcune altre viscere; ma è sommamente dubbioso, che si possano ascrivere a questo morbo.

La cura dicevole al fluor bianco dee esser lunghissima, ed è anche inutile, qualor non si rintracci il male occulto, che lo conserva. Di rado è necessario cavar sangue, qualora ciò non vogliano alcune circostanze: l'emetico per lo contrario vi è quasi indispensabile, e in tal caso vien preferita l'ipecacuana a tutti gli altri: si dee fare un moderato uso dei purganti: in tal qualità vi si praticano con frequenza il rabarbaro, e il mercurio dolce. I temperanti, e i depuranti, come la cicoria, l'agrimonia, l'epatica, la scopendrea, la pazienza, il crescione, il piè di leone, la perforata, i brodi di gamberi, il latte, il siero, ec. sono i rimedj, de' quali vien fatto grand'uso; ma non vi è cosa, che possa paragonarsi alle acque minerali, come quelle di Vals, di Forges, di Miers, di Plombières, di Vichy, di Bourbon-Lancy, di Balaruc, di Sant'Amando, ec. Si può anche far uso degli stomachici, e degli assorbenti, quando il male par, che sia stato preceduto da qualche vizio delle digestioni, lo ch'è molto ordinario nelle fanciulle, e nelle donne infermiche: tali sono il cerfoglio, la melissa, l'abrotano, l'assenzio, il can piccolo, i fiori di rosmarino, e di camomilla, l'enula campana, il rabarbaro, le coccole di gi-

nepro, il cascìu, il corallo, ec. Sonosi con frequenza amministrati felicemente i sudorifici, e gli aperienti, come la salsapariglia, la cina, la canfora, la gomma ammoniac, e i centogambe, il sale del *Glaubero*, e quello *de duobus*; gli antimoniali e i marziali, l'acqua di calcina, temperata col latte, ec. Questo morbo non cede talvolta, che ai soli antivenerei, ed è agevole l'indovinarne la ragione.

Per quanto possa esser buona l'amministrazione dei proposti rimedj, ella non asciuga sempre lo scolo: in tal caso si ricorre agli astringenti, e ai tonici più atti a rimediare al vizio locale, che lo conserva; ma questi rimedj non si possono amministrare, se non sul termine della cura, e l'averne voluto far uso prima, ha prodotto ree conseguenze: si possono similmente impiegare sotto le stesse condizioni le iniezioni preparate coll'erbe vuluerarie, l'agrimonia, la piantaggine, la consolida, il miele, ec. Le fumigazioni coll'incenso, col succino, col tacamahaca, col mastice, ec. Ma, io torno a ripetere, è perpetuamente pericoloso il troncar l'effetto d'una malattia, quando non ci siamo prima applicati a distruggerne la cagione; e si è veduto pur troppo frequentemente, nell'occasione di questa, che il suo fermarsi in tronco, ha prodotto l'angina, l'infiammazione del petto, o del basso ventre, la febbre porporina, e la febbre lenta, la gotta, l'idropisia, la tifichezza, e somiglianti malori.

SEZIONE SECONDA.

Malattie dei Fanciulli.

GENERALITÀ'.

S Appiamo per lo più dalle donne, se il bambino vomita, e quali materie; s'egli ha rutti agri, se ha dolori di ventre, se le sue dejezioni son copiose, e di qual indole, se, orina, se tosse, se ha il singhiozzo, se non dorme, se ha convulsioni, ec. E' noto, che i bambini, che prendono troppo latte, debbon rigettarlo senza sforzo, e questa specie di vomito non può riguardarsi come un male: si fa, che le loro dejezioni

comunemente son verdi per i primi tre, o quattro mesi: l'olio, che loro si dà per bocca, può anche renderle tali, e non ce ne dobbiamo prender briga; ma le bige, le argillose, fanno vedere, che la bile non iscorre, e meritano grande attenzione. E' spesso difficile il giudicar del polso dei bambini, non meno a motivo di sua estrema velocità anche in istato sano, che per istentarsi moltissimo a tener fermo il loro braccio, e non vi è cosa più rischiarata del giudizio, che ne vien fatto quotidianamente. Si dee osservare lo stato della bocca, non meno per rapporto alle aste, che alla dentificazione: si esamina pure quello del respiro, e del basso ventre, e finalmente le varie fioriture, dalle quali può la lor cute essere investita. Soprattutto non si dee perder d'occhio l'epidemia dominante, come del vajuolo, della rosolia, della scarlatina, del mal di castro, ec. i cui pregiudizj sono talora somminamente equivochi. Dobbiamo anche ricordarci, che la dentificazione, e i vermi hanno grandissima parte nelle malattie acute dei bambini; e che le loro affezioni croniche riconoscono con frequenza un fermento celtico, scorbutico, scrofoloso, o rachitico. Debbon esser pure l'oggetto delle nostre ricerche i Genitori: si sa pur troppo, come quei, che sono epilettici, scorbutici, infetti di celtico, scrofolosi, gottosi, calculosi, tifici, ec. posson trasfondere le disposizioni stesse nei figliuoli, nè vi è cosa più ovvia di tali morbi ereditarij. Dobbiamo anche informarci della maniera di vivere tenuta dalla Madre nella sua gravidanza, se siasi alimentata impropriamente, se ha avuto buona condotta rispetto ai costumi, se l'è accaduto alcuno accidente, ec. L'esame della nutrice, per quanto sia stata giudicata buona, è di pari importantissimo: un latte alterato dalle passioni, dal reo nutrimento, o da mali, che posson essere sopravvenuti, sarebbe pregiudiziale: sono pure sospette quelle, che hanno il lor flusso menstruale.

Tali sono i mezzi, che ci scortano a rintracciar l'indole dei mali dei fanciulli: diremo alcuna cosa ancora intorno alla maniera di medicargli; e un tal punto non è meno rilevante del primo. Generalmente parlando si può accertare, che pochissimi rimedj abbisognano ai bambini, e che la natura fiancheggiata dal buon governo può superar per se sola la maggior parte de' loro mali. Se l'esperienza d'ogni giorno non
mani-

manifestasse questa rilevante verità , la ragione la scuoprirebbe agevolmente : i Medici saggi , e più dotti non ne dubitano ; e il *Baglivi* , il cui candore è noto , non meno che la sua scienza , non ha avuto difficoltà di confessare , che i figliuoli dei Grandi , che vogliono sempre medicare con più pompa , muojono piuttosto per l'abuso delle medicine , che per le loro malattie. Di rado s'addice loro la cavata del sangue , qualor non sia per le gravi contusioni , per la tosse convulsiva , per l'oppressione , per la febbre infiammatoria , ec. Gli emetici , e i purganti sono a dir vero più necessarij ; ma l'uso d'essi troppo frequente può divenire perniciosissimo : il rabarbaro , la gialappa , il mechoacan , il fior di pesco , la polvere cornacchina , il mercurio dolce ; lo sciroppo composto di cicoria , quello di mele , ec. sono i più usati : i sali purgativi non riescono ; la manna , e le altre materie grasse operano per lo più malissimo , nè ce ne dobbiam servire , se non quando non è permesso di servirsi d'altri. Gli assorbenti , che posson passare per li calmanti di questa età , sono utilissimi , e di un grand'uso : per altro l'abuso dei medesimi può produrre pessimi effetti : la magnesia , che colla proprietà di questi ultimi ha pur l'altra di tener libero il ventre , è la meno da temersi di tali medicamenti. Si sa , che non dee darsi alcun acido ai bambini lattanti : l'uso dei narcotici tanto naturale in alcune provincie meridionali , è pericoloso : io non pretendo , che debbanfi assolutamente bandire ; ma credo , che la loro amministrazione voglia maggior circospezione : non abbiamo niente da temere dell'emulsioni col seme di papavero ; dello sciroppo di papavero erratico , e d'altri anodini leggeri , che danno alla giornata con molta riuscita. Si sa ancora avervi parecchi rimedj , che non s'ardirebbe d'amministrare ai bambini di due , o tre mesi ; e che allora si prende il partito di fargli passare per la nutrice colla mira d'impreguarne il latte. Finalmente per por fine a queste generalità aggiungerò , che bisogna avere una somma attenzione alla dose dei rimedj , massime emetici , purganti , e narcotici ; e una tal circostanza importa assai più di quello pensino coloro , i quali seguono piuttosto una cieca superficialità , che una pratica illuminata : veramente tutti fanno , che dee esser proporzionata all'età del fanciullo ; ma queste proporzioni non sono , nè arim-

metiche, nè geometriche; ma sono stabilite sopra la sola esperienza con tutte le restrizioni, che richieggono le varietà del temperamento. Ciò, che sembra essere più conforme al risultato delle quotidiane osservazioni, è che può darsi, a cagion d'esempio, a un ragazzo di sett'anni, e a un di presso la metà di quello può darsi a un adulto; a quello di tre anni, la quarta parte; a quello d'un anno la sesta; e finalmente l'ottava, o la decima a un bambino di fresco nato.

COLOSTRAZIONE.

Il labbro leprino, lo scilinguagnolo più ampio del naturale, l'ano chiuso, e simiglianti ree affezioni dei bambini, che null'altro addimandano, che la mano del Chirurgo, gli lascio a bella posta da un lato, per non mostrare di voler porre la falce nell'altrui messe. Tratterò pertanto di quei soli morbi, che spettano alla scienza Medica, fra i quali molti ci si presentano, che son comuni a tutte le età, ed alcuni particolari ai bambini medesimi, e di questi si è la *colostrazione*, la quale mi giova esaminare in primo luogo.

La voce *Colostrum*, Coloastro, per non equivocare nei termini, ha due significati: imperciocchè con tal voce si esprime quel latte, che stilla dalle mammelle della donna, che ha partorito di fresco, il quale, a motivo di sua sottilissima consistenza assomiglia al siero notissimo del latte; e questo, siccome altrove addittammo, ha la virtù di nettare, e rimondare le sozzure del ventricolo, e degl'intestini, e d'aprire il ventre. Collo stesso termine poi (*Colostrum*) si viene a significare quel latte, che è nella nutrice rimasto infetto, per essersi nell'atto d'allattare di nuovo impregnata, il qual latte, massime nei primi mesi dell'allattamento, somministra un pessimo alimento: da questa sorgente scaturiscono innumerabili malattie, dalle quali son molestati i teneri bambolini. Una siffatta cagione malagevolissima a scuoprirsi, per la cura grande, che hanno d'occultarla le nutrici prezzolate, possiamo sospettarla, se i bambini vengono più dell'usato tormentati da tormini di ventre; o se abbiano un'ostinata diarrea, per cui insensibilmente vanno emaciandosi, fino a tanto che compariscano in iscena sintomi più orribili, che ci promettono una morte innanzi tempo, la quale se avvenga, che schivino, sogliono avere per tutta la vita loro una co-

stituzione.

stituzione infermiccia, e veramente di vetro. Alcuni però dotati dalla natura d'un temperamento forte, se si eccettui un orrore, che concepiscono pel latte, e pel formaggio, non ne contraggono alcuno incomodo. Adunque, allorché siamo assicurati della qualità del male, senza por tempo di mezzo, dee mutarsi il latte al bambino; e per lo più questo basta a guarirlo, senz'altra medicina. Talora però giovane, con tal condizione di cose, i più miti catartici, atti a portar via i rimasugli delle ree digestioni, le quali, altramente operando, corromperebbero il latte più puro, e più perfetto. Ci giova aggiungere, come per Nota, che i bambini, ai quali è toccata questa disgrazia, diconsi da quei di Lingua d'Oca, e dagli altri Provinciali della Francia *ingannas* dal verbo Italiano *ingannare*, come quelli che sono stati in certo modo traditi, coll'essere stato ai miserelli innocenti porto latte di rea qualità.

LA FEBBRE.

La maggior parte dei mali dei fanciulli, è comune a tutte le età, e noi faremo parola soltanto in questo luogo, di quelle, che son loro più familiari senza ripetere per le altre il da noi detto altrove: rimettiamo pure all'Opere di Chirurgia ciò, che riguarda il chiudimento del deretano, lo scilinguagnolo, il muso leprino, e altri mali, che richieggiono l'operazione della mano. La *febbre*, che forma il soggetto del presente Articolo, investe molto familiarmente i fanciulli: abbiamo detto, che l'osservazione del polso è una guida poco certa per un gran numero di quei tali, che pretendono di saperne giudicare; ma il calor della pelle talora scottante, l'infiammamento della faccia, la sete, e le inquietudini non lasciano luogo a equivocare. Le febbri dei fanciulli, sì acute, che lente, sono quasi tutte sintomatiche: tali sono, fra le acute, la efemera, che precede le fioriture cutanee, e che ne dipende; la febbre ardente prodotta dai vizj della digestione; la catarrale, la verminosa, quella che nasce dalla dentificazione, ec. Le ostruzioni del mesenterio, e delle altre viscere, sono la sorgente più comune della febbre lenta. Si sa, che le febbri continue dei fanciulli terminano molto spesso con tumori critici: le intermittenti in questa età sono assai rare; tuttavia non

ne vanno esenti i bambini lattanti. I vomitivi, e i purganti sono i principali rimedj, che s'adopra per la febbre; ma non ne possiamo far uso in tutti i tempi. Di rado è necessario il cavar sangue: si fa grand' uso degli allentanti, e degli addolcenti: tali sono il brodo di pollastra, quello di riso, le emulsioni, ec. Per tali mezzi possiamo scemare il calore scottante, e l'eccessiva sete, che tormenta i pazienti. Vi s'adopra con vantaggio gli assorbenti, quando lo voglia lo stato delle prime vie: se la febbre è risvegliata dai vermi, si ricorre al mercurio dolce, all'etiope minerale, ec. Si può anche ritrar del vantaggio da questi ultimi, di pari che dai leggieri diaforetici, quando può aver dato motivo alla febbre la retrocessione delle fioriture cutanee: in tutti questi casi torna bene tenerne il corpo obbediente, o con li lassativi, o con li clisteri emollienti, e stimolanti. La febbre intermittente richiede la sua cura ordinaria. Si fa uso dello sciroppo di China-china, o del suo estratto secco, quando si può ciò ottenere dai ragazzi; nel caso contrario ci applichiamo ai lassativi febrifughi.

L' A T R O F I A.

Non bisogna confondere l'atrofia essenziale con quello smagrimiento, ch'è la conseguenza d'una malattia nota, come dell'affezione scorbutica, del celtico, dei vermi, ec. Quella, di cui ragioniamo, è unita all'enfiagione, o alla durezza del ventre, alla svogliatezza, alla tosse secca, e alla febbre lenta, con esacerbamenti manifestissimi nella digestione degli alimenti. I fanciulli posson cadere nel marasma, quando le lor nutrici scarfeggiano di latte, o che ne succhiano di rea qualità: l'abuso degli assorbenti, e dei rimedj salini; gli alimenti grossolani, de' quali talora si nutriscono i fanciulli, ec. posson parimente esser la fucina di questo morbo, che cova nelle viscere sconcerti tali, ai quali è spesso impossibile il rimediare: tali sono gli svelatici dall'apertura dei cadaveri, i più ovvj dei quali consistono in ostruzioni patentissime nelle vene lattee, o stivamenti scirrosi nelle glandule del metenterio: allora di rado si trova il fegato nel suo stato naturale; i polmoni stessi sono il più delle volte intaccati dalla suppurazione, e dalla putrefazione.

Un latte nuovo è con frequenza il solo rimedio, che

che convenga ai bambini lattanti, quando il male non ha per anche gittate profonde radici: gli allentanti, e i leggieri aperienti si praticano con felicità, non meno per li bambini da latte, che per gli spoppati: si fa grand'uso del rabarbaro, e d'alcuni altri lassativi; ma debbonfi schivare i catartici stimolanti, che non lasciano d'intristire il male. Si posson quindi provare gli amari, e anche i marziali per li bambini spoppati; la terra sfolgiata di tartaro, il sale *de duobus*, il liquore anodino minerale, e l'olio di tartaro per deliquio, son parimente rimedj, ch'entrano in questa cura: finalmente posson far qualche bene i linimenti rilascenti, le fomentate emollienti, ed anche i bagni: sonosi veduti effetti mirabili da questi ultimi, quando l'atrofia era prodotta dai *crinoni*; insetti, che investono la cute dei fanciulli, e di cui parleremo altrove.

IDROPISIA, E ITTERIZIA.

I fanciulli posson essere investiti dalla leucoflemmazia, dall'ascite, dalla gonfiezza del ventre, dallo stivamento edematoso dello scroto, e da altre specie d'idropisie, delle quali abbiamo già trattato; ma questi morbi in questa età sono assai rari. Il primo di questi mali non è gran fatto pericoloso, allorchè non venga trascurato: si risolve anche il più delle volte in un flusso d'orina, o in una diarrea. Si può guarire anche l'ascite; ma la sua cura è molto più lunga, e più difficoltosa. Poco ci dà da temere la tumefazione del ventre, che proviene da una malattia acuta; ma quella, ch'è congiunta colla diarrea, e col marasma, è pericolosissima. L'edema dello scroto, ch'è una conseguenza de' mali precedenti, ha la sorte medesima; ma si cura agevolmente, se è indipendente. L'itterizia contratta dai bambini nel ventre materno, d'ordinario fa testa a tutti i rimedj; ma quella, che viene nel corso dell'infanzia, si può curare felicemente, tuttochè venga riputata più pericolosa dell'idropisia, e che per lo più dia motivo a stravasamenti.

La mutazione dell'aria, e del latte ha spesso troncato il corso di questi morbi. Il rabarbaro, la gialappa, la polvere cornacchina, e altri *idragoghi* son rimedj usati familiarmente: si fa uso parimente degli stomachici, e degli amari: tali sono la radice d'enula campana, le coccole di ginepro, il camedrio, l'assen-

zio, e la centaurea minore : i temperanti, e finalmente gli aperienti, debbon servir di base a questa cura : tali sono la cicoria, e l'indivia, l'agrimonia, la scolopendra, e le capillari; le radici di sparagi, di luppoli, d'appio, di prezzemolo; il sale di tamarisco, e d'assenzio, i sentogambe, ec. Abbiamo già detto, che i marziali s'addicon soltanto ai bambini slattati. Tutti questi rimedj posson esser applicati all'idropisia, e all'itterizia : è anche contro questo stato prescritto il sale di succino, e la polvere di vipera : finalmente i vescicanti allo scroto, hanno talvolta prodotto uno scolo, che ha evacuato le altre parti stivate.

S'investe con rimedj stessi l'enfiagione edematosa dello scroto; ma contro questo accidente giovano assai più i topici, quand'anche fosse il prodotto delle altre idropisie. Le rose rosse, i fiori di camomilla; la ruta, e il finocchio, che si fanno bolire nel vino, per servirsene per fomenta, sono i fortificanti, e i risolventi messi in opera : per rendergli più attivi vi s'aggiunge l'acquavite, l'acqua di calcina, l'alluminosa, ec. Certuni danno la preferenza al cataplasma di farina di fava; altri alle unzioni coll'olio di lauro, per non far parola d'infiniti metodi, i quali posson parimente riuscire. Non si debbono togliere da questo numero i vescicanti applicati alla parte stessa, i quali aprono uno scolo alla ferosità; nè le incisioni, che fanno, come additammo, colla mira medesima.

IL MALFRANCESE.

I bambini lo ricevono dalla lor madre, o dalla loro nutrice : si manifesta con esantemi, o con tacche alla cute, per fioriture volatichose, con tubercoli, o pustule, che non hanno alcuna sede fissa, per la tigna corrodente, con ulcere alla bocca, o altrove, con frequenza accompagnate da carie, dall'ostalmia purulenta, per l'atrofia, ec. Le affezioni della cute fanno congetturare, che il bambino abbia contratto questo morbo nel ventre della madre; ma gli sconcerti della bocca fanno cadere il sospetto sopra la nutrice. Il celtico nei fanciulli è una malattia delle più tremende, non solo perchè non è facile il conoscerla, ma ancora perchè malagevole il guarirla. Ciò non può imprendersi nei bambini lattanti, ma bisogna aspettare, che abbiano per lo meno quattr'anni; ma se il reo stato loro non permette differirne la cura, non si dee cominciarlo, si

non dopo quindici giorni , che son nati , e con tutta la riserva , che vuole la loro delicatezza .

Si medicano i fanciulli , come gli adulti , osservando soltanto le adeguate proporzioni rispetto alla dose dei rimedj : vi s'impiegano , dopo i rimedj generali , i sudorifici , e il mercurio : si dà loro il guajaco in ptisana , e la salsa pariglia in polvere mescolata colla pappa , ec. Si fa loro prendere ogni dì qualche grano di panacea per tre settimane , e più : si fanno pure ai medesimi delle unzioni con una pomata , nella quale entri una ottava , o decima parte di mercurio , e non se ne impiega , che un mezzo grosso in circa per volta . Quando trovanfi sotto l'uso esterno , ed interno del mercurio , si ha la cura di coricargli sul fianco , affinchè la bava , che può sopraggiungere , abbia il suo scolo : si lavano le ulcere della bocca con acqua , in cui sia st to stemprato del miele , ec. Abbiain detto altrove , che si potevano curare i bambini lattanti col far passare il mercurio per la loro nutrice ; ma oltre che questo metodo ha i suoi inconvenienti , non pare bastantemente sicuro .

LO SCORBUTO.

Questo morbo , di cui abbiamo già ragionato , attacca alcuna volta i fanciulli ; ma ci vuol molto a persuadermi , ch'e' sia così comune , come da poco in qua la gente è persuasa : e di vero non par , che basti , che i rimedj soccombano ai capricci della moda , che vi si vuole eziandio sottomettere le malattie . I fanciulli possono contrarre lo scorbutto nell'utero della madre , o per mezzo del latte della loro nutrice ; ma con più frequenza viene in seguito di qualunque altro morbo abituale . Non è difficile il rilevar lo scorbutto , quando ne sono investite le gengive , e la cute ; ma questi segni non compariscono talora , se non tardi ; di modo che ci conviene ricorrere ad altri segnali , il cui concorso però non ci può dare , che congetture .

Quei , che ne sono investiti , non si curano gran fatto dei divertimenti di loro età : gonfiasi loro lo stomaco , singolarmente nel tempo della digestione : a questo stato succedono comunemente i dolori colici , o vengono in altri tempi . Provano dolori vaghi , dei quali i più non fanno lagnarsi , ma che disturbano il riposo della notte . Il pollo soggetto a molte vicende è il più

delle volte febricitante. Talvolta s'infetta il polmone; ma più di rado le viscere del basso ventre. Tutti questi segni, comuni per altro a tanti altri mali, lasciano perpetuamente dei dubbj, che non posson esser totalmente dileguati, se non quando le gengive si stivano, s'esculcerano, gittano del sangue, o della sanie, e che per conseguente il fiato diviene puzzolente: quando compariscono alla cute tacche porporine, o varie pustule d'indole particolare; quando finalmente s'alzano in varj luoghi tubercoli indolenti, che in capo a qualche giorno si dileguano; i fanciulli in queste circostanze non possono per lo più sostenersi sulle gambe: dapprincipio compariscono soltanto svogliati, o intorpiditi, quindi si scuopre, che stentano a masticare, fino a tanto che le gambe per la loro debolezza, o pel gonfiamento delle ginocchia ricusano affatto il loro ufficio: in tale stato sopravvengono emorragie, accidenti epilettici, ec.

Gli stessi rimedj s'adopra per i fanciulli, che per gli adulti, regolandone, com'è naturale, le dosi sopra l'età.

Gl'impiegativi con più riuscita sono il siero, e gli altri allentanti, che debbon far la base di questa cura; i sughi, lo sciroppo, e il vino, antiscorbutici, che in questo caso posson supplire a tutti gli altri specifici. Secondo le circostanze si fa uso parimente del fumosterno, della china, e d'altri stomachici amari. Non debbonvi dimenticare i leggieri purganti, come altresì la dieta, nella quale possiamo far entrare i ravanelli, la mostarda, l'arance, i limoni, e altri alimenti appropriati a questo morbo.

LE SCROFOLE.

Dicemmo altrove, che questo male riguarda più i fanciulli, che gli adulti: le scrofole nei primi hanno per lo più la lor sede nelle glandule del collo, e del mesenterio: investono anche le linfatiche d'altre parti, le articolazioni, le mani, e i piedi. Gli occhi, il naso, le labbra, ec. son pure esposti al veleno scrofoloso: eccita questo nel collo, e nelle estremità dei tumori, che mostrano di partecipare della flogosi, e dello scirro: s'aprono con frequenza, e degenerano in ulcere ostinate, e talvolta cancerose, di cui la febbre lenta, e il marasmo sono la conseguenza ordinaria: il

ven-

ventre duro e tumefatto, che portano i fanciulli scrofolosi, non lascia alcun dubbio sopra lo stivamento delle glandule del mesenterio. Si crede con qualche fondamento, che i genitori, e la nutrice, infetti di celtico, o di scorbutico, possan comunicare le scrofole ai loro figliuoli. Non vi è quasi malattia, che sia così lunga e così ostinata, come questa, ed è pur troppo noto, che bene spesso è incurabile.

S'investe con gli evacuant, come coll' ipecacuana, e con i purganti replicati: nei primi tempi bisogna far uso grande degli allentanti, e degli addolcenti; poscia s'adopra la magnesia, e gli altri assorbenti; gli amari, e soprattutto la china; gli antiscorbutici, e i sudorifici; gli aperienti, e gl' incisivi, rimedj, de' quali abbiamo già parlato nell' articolo, che porta il titolo stesso. Le acque di Bonne, quelle di Bares, e altre minerali, untuose, e saponacee, possan molto giovare. Talvolta sono state date con riuscita le unzioni mercuriali; ma possono avere delle conseguenze funeste: finalmente sonosi aperti degli sfoghi con cauterj, e setoni, dai quali se ne sono costantemente sperimentati buoni effetti.

LA TOSSE.

Questa dipende nei fanciulli, come negli adulti da più cagioni, cui non è agevole il rintracciare. La catarrale più frequente d'ordinario è annunziata dallo starnutare, dalla corizza, e da un moto febbrile più rilevabile dal calore, che dalla frequenza del polso. Lo spettoramento, ch'è di sollievo grande agli adulti, manca assolutamente nei bambini, o segue imperfettissimamente, supplendo probabilmente a questa le altre evacuazioni. Si chiama *mal di castrone*, o ultimo grado della tosse catarrale, e di quella, di cui pur ora parleremo: è sovente epidemico, e si fa ben conoscere per mezzo di parossismi così violenti, che la faccia dei fanciulli diventa nera, e paonazza: in questi sforzi esce talora loro il sangue dal naso, e dalla bocca; per non parlare del vomito, e delle deiezioni involontarie, sì dell' orina, che degli escrementi. La tosse nel reuma ordinario, come nella maggior parte dei mali di castrone, par, che dipenda dalla sola affezione dei bronchi, e del polmone; ma negli altri casi ella è spesso sintomatica, o il prodotto d' un altro male: si fa,

fa, che lo scorbutico, il celtico, le scrofole, la rachitide, e l'atrofia, per non far parola della peripneumonia, della tifichezza, e d'altri morbi del petto, sovente vi danno motivo: e siccome questi mali sono talvolta occultissimi, così non è facile a rilevarsi il carattere della tosse. La dentificazione parimente d'ordinario eccita la tosse, producono l'effetto stesso i vermi. Finalmente ella ha il più delle volte la sua sorgente in materie accide, mucose, e tenaci, che covano nello stomaco. Questa specie di tosse, che addimandasi *stomacale*, frequentissima nei bambini, e da cui non vanno esenti gli adulti, non può manifestarsi, che per la cognizione, che si ha dello stato delle prime vie; cognizioni, che si ricavano dalla sfogliatezza, da rutti fetidi, dal gonfiamento dello stomaco, ec. ovvero dal buon effetto, che costantemente produce il vomito, sia questo naturale, sia procurato con gli emetici: la calma, che allora succede, e che non ci potremmo promettere da qualunque altro mezzo, fa patentemente vedere, che la tosse è stomacale.

Il reuma dei fanciulli non è mai senza pericolo, quando è a un certo grado: è più da temersi, se trovisi unito alla febbre, e al rantolo. Terribile è sempre la tosse violenta, e convulsiva, massime nel tempo della dentificazione, della rosolia, e del vajuolo: talora i bambini ne restano soffogati. Questi violenti sforzi del petto debbon anche far temere l'ernia, il prolapsio dell'ano, e talvolta anche la curvatura della spina. La tosse catarrale in alcune epidemie, dà occasione a ribollimenti, e a sudori, dai quali si fa buon augurio. Si rimedia agevolmente alla tosse stomacale; ma tutto si dee temere da quella, che dipende da un vizio organico. Finalmente il pericolo della sintomatica è relativo al mal principale.

Non vi è dubbio, che debbasi regolare la cura della tosse sopra le cognizioni, che si hanno del suo carattere; ma siccome intorno a ciò uno si abbandona a congetture, e non si posson cavar grandi lumi da tutto ciò, ch'è stato scritto intorno a tal soggetto, così proporremo semplicemente una cura generale, la quale colle necessarie modificazioni può essere applicata, non meno alla tosse catarrale, che alla stomacale. Quella, che dipende dall'infiammazione, dall'ulcera, o da ogni altro vizio del polmone, non riguarda il presente articolo.

ticolo : non potremmo similmente farvi entrare la sintomatica , senza esporci a ripetizioni , che ingrosserebbero inutilmente quest' Opera .

Abbiamo già annunziato il vomito come vantaggiosissimo: si risveglia col tartaro stibbiato, coll' ipecacuana, o col Kermes minerale : si può anche dare colla mira stessa lo spermaceti sciolto in un brodo, o stuzzicare in gola con una penna intinta nell'olio, ec. Può esser necessario il cavar sangue, quando son rilevabili assai la febbre, e l'oppressione : dicevolissimi a questo stato sono i purganti replicati : migliori degli altri in questo caso pajono il rabarbaro, e il mercurio dolce : gli allettanti, e gli addolcenti, come il siero, il brodo lungo di pollo, la ptisana di semi di rapa, lo spermaceti, lo sciroppo di malva, ec. non debbonsi trascurare : lo sciroppo d'erisimo può produrre de' buoni effetti ; ma gli altri bechici , che soglion si dare a man salva , poco giovano : non segue lo stesso degli assorbenti , e degli antispasmodici, l'uso de' quali non può esser mai troppo raccomandato : tali sono il corallo , gli occhj di granchio, e la polvere di gutteta , la peonia , il succino, lo zafferano, il castore, ec. Utilissimi sono alcuna volta i calmanti, ma, come dicemmo, debbonsi perpetuamente amministrare con gran riserva : i deostruenti, e i rimedj, che vanno alla traspirazione , come i centogambe, l'antimonio diaforetico, ec. son riputati efficacissimi contro la tosse divenuta abituale : sonosi anche ritratti nei casi stessi ottimi effetti dai vescicanti, dal cauterio, e dal setone , e singolarmente quando la tosse dipenda dal ritrocendimento d'alcuna fioritura cutanea : si possono inoltre fare delle unzioni sul petto col grasso umano , coll'olio di mandorle dolci , con quello di camomilla, ec. Qualche volta ha pure giovato l'olio di scorpione applicato ai reni, quando le orine sembravano troncate .

IL VOMITO.

Abbiamo già fatto osservare , come il vomito , massime quello, che viene da ripienezza, è salutare ai fanciulli ; quando è eccessivo , e accompagnato dal singhiozzo , può produrre tristi effetti. Si è veduto nell'ultimo articolo , che gli sforzi del petto possono eccitare il vomito , e che i rei fughi , che covano nello stomaco , e che lo solleticano , danno spesso occasione
alla

alla tosse . Il vomito può essere altresì nei fanciulli , come negli adulti , il foriere del vajuolo , della rosolia , della febbre , non meno continua , che intermittente , ec. Accade inoltre , ma di rado , che dipenda da una rea conformazione , che non si può nè conoscere , nè guarire . Il solo buon governo rimedia sovente al vomito dei fanciulli : se i lattanti rigettano solamente latte quagliato , non possiamo accusare , che la ripienezza di stomaco , e vi si rimedia col lasciar loro prendere manco latte per volta : negli altri casi dobbiam far uso degli allentanti , e degli evacuanti , che possono stemperare e portar via le materie , che stimolano lo stomaco : lo sciroppo di cicoria composto , e gli altri purganti miti , vi s' adattano a maraviglia ; gli assorbenti vi s' impiegano con vantaggio , se l' odor della bocca , o quello delle materie rigettate , e la qualità delle deiezioni manifesta la presenza di crudesse acide : gli stomachici , e i carminativi , come gli anaci , la noce moscada , l' olio di macis , la triaca , lo sciroppo di mele cotogne , ec. posson giovare , dopo d' essersi fatti precedere gli altri . Si deve nell' amministrazione di tutti questi rimedj conservare il corpo obbediente ; e questo è un punto de' più rilevanti : si applicano anche sullo stomaco de' piumaccioli inzuppati nel vino , ove sieno state in infusione le rose rosse , la cannella , i garofani , ec. Più familiarmente si fa uso d' un crostino inzuppato nel vino , e spolverizzato con gli stessi aromati ; della polpa di mela cotogna , della triaca , ec. Tutti questi fortificanti esterni non debbon essere trascurati ; ma non bisogna porvi mano , se non dopo le sufficienti evacuazioni .

DOLORI COLICI.

E' indubitato , che i fanciulli son soggetti ai dolori colici ; ma è altresì certissimo , che s' attribuiscon loro con pochissimo fondamento , e sulla semplice relazione delle donne . Per non far parola del *Meconio* , che ne fa sovente patire ai bambini nati di fresco , il latte di rea qualità , o preso in soverchia copia , la pappa mal preparata , i frutti , i dolci , i vermi , le flatulenze , i purganti irritanti , il raffreddamento del ventre , e dei piedi , finalmente la dentificazione , sono le cagioni più note , e più ovvie dei dolori colici ; imperciocchè non debbonsi così chiamare i dolori d' intestini cagionati dai
vizj

vizj del mesenterio, e delle altre viscere del basso ventre. Le inquietudini, le grida, gli scontorcimenti, la gonfiezza del ventre, l'esplosione delle ventosità, le dejezioni verdi, e di varia consistenza, la costipazione, ec. sono i segni ordinarij di questi dolori: eccitano alcuna volta la febbre, l'oppressione, le convulsioni, ec.

Gli addolcenti, come il brodo lungo di pollo, l'olio di mandorle dolci, e lo spermaceti, sono i rimedj, ai quali si dà mano da principio, e i più atti a calmare questa specie di dolori: i lassativi, come la cassia, la manna, e il rabarbaro, vi sono anche assai adoprati: tuttavia i purganti stimolanti sono talvolta i più efficaci; ma vi può esser del pericolo nell'adoprarli, massime se si è trascurato di far precedere gli allentanti, e i rilascianti: i carminativi, i quali non meritano il vanto, che loro si è dato in altri tempi, nè il disprezzo, che se ne fa ai dì nostri, posson essere utilissimi: l'iride di Firenze, la polvere, e l'olio d'anaci, l'acqua di menta, ec. sono quelli, che s'amministrano alla giornata con più riuscita: gli assorbenti, e i contravermi, come i testacei, il corallo, la corallina, il seme santo, ec. posson produrre ottimi effetti: i narcotici sono sospetti, checchè se ne dicano coloro, che non temono di farne un uso familiare. Ognun sa, che i lavativi, sì anodini, e carminativi, che lassativi, che si preparano col latte, e collo zucchero, con gli anaci, e con i fiori di camomilla, coll'olio, col butiro, colla cassia, ec. sono attissimi a calmare questi dolori: finalmente si fanno delle unzioni coll'olio di ruta, con quello di camomilla, o con i grassi, che si avvivano con alquante goccioline d'olio d'anaci: s'applica una vescica mezza piena di latte caldo, una focaccetta coll'olio di noce, ec.

SCIoglimento di VENTRE.

La dentificazione, la rea qualità del latte, e i falli nel governo, danno motivo alla diarrea, e alla dissenteria. La diarrea, che non è seguita da alcuno accidente, e che non risveglia la febbre, non è da temersi: quella, che nasce dalla dentificazione, è più salutare, che nociva; ma non è senza pericolo, quando è unita alla perdita dell'appetito, a dolori colici, a dejezioni fetide, alla vigilia, alla tosse, al vomito, ec. non vi è cosa più rea in tali circostanze della durezza del

del ventre, unita alla febbre lenta, che ci accerta, quasi diffi dello sfivamento scirroso del mesenterio. Si può fare a un di presso il giudizio stesso della dissenteria, che alcuni fanciulli portano per più mesi, senz'esserne gran fatto incomodati; ma che dee far paura, quando è congiunta con astre, con isvogliatezza, colla tensione del ventre, con dolori colici, con premiti, colla vigilia, e colla febbre lenta. Abbiamo detto altrove, che i fanciulli erano anche soggetti al *flusso celiaco*, ch'è per lo più conservato dalla copia dei mucchi, che intonacano le prime vie.

L'emetico, e i purganti, quando lo stato del polso, e del ventre ne permette l'uso, sono i rimedj più certi, che si possano opporre alla diarrea: il rabarbaro, e gli altri lassativi, come l'ipecacuana, s'addicono principalmente alla dissenteria. Per l'una, e per l'altra si fa grand'uso degli allentanti, e degli addolcenti, come del brodo di pollastra, della ptisana di riso, del siero, dell'olio di mandorla dolce, ec. S'adopra ancora gli assorbenti; ma si debbon praticate con gran riserva gli astringenti, tuttochè sembri, essersi amministrato alcuna volta con riuscita lo sciroppo di mele cotogne, e di mele granate: ugualmente son da temersi i narcotici, e per la diarrea, e per la dissenteria, chechè se ne pensino coloro, che gli danno familiarmente: i leggieri diaforetici, come il papavero eratico, la scorzonera, e altri, posson far qualche bene. I fanciulli da latte debbon succhiare poco, e spesso: agli altri bisogna far osservare una dicevol dieta, e soprattutto levar loro la carne. I clisteri addolcenti, e anodini, col latte puro, o mescolato col miele, non meno col torlo d'uovo, che col miele violato, col brodo di trippe, o di curatella di vitello, col decotto di riso nel siero, in questo caso sono efficacissimi. Si usano finalmente talora le fomite emollienti: si applicano pittime col vino astringente; ma poco possiamo prometterci da questi topici.

LA COSTIPAZIONE.

E' noto, che i fanciulli nel primo anno debbon andar del corpo, almeno una volta il giorno, e che quei, che stanno due, o tre giorni senza farlo, sono esposti a inquietudini, che disturbano il loro riposo, a gonfierezze dell'addome, a dolori colici, a difficoltà di respi-

ro, ec. La costipazione, più che in altro tempo, è pericolosa nel tempo del fare i denti. Un latte grossolano, e riscaldato, può dar motivo al male, di cui parliamo; ma dipende spessissimo dal temperamento del fanciullo: allora si danno dei rinfrescanti alla Nutrice; se le proibisce il vino, ec. Si sollecita il ventre del fanciullo con supposte semplicissime, cioè, con una candelletta, con un torsolo di pera, ec. Si danno lavativi emollienti: si fa uso dei lassativi, come dell' olio di mandorle dolci, del rabarbaro, della manna; ma di questi secondi è pericoloso il farne troppo uso. A molti riesce il dare ai bambini lattanti uno, o due grossi di sugo di parietaria: altri fanno dei linimenti col butiro, o coll' olio di mandorle dolci, ai quali uniscono talvolta la colocintida, la scamonea, i trocisci *albandal*: vi viene anche molto adoprato l'unguento d' *artamita*, come altri topici dell' indole stessa, dai quali abbiamo manca da temere, che dai purganti interni: finalmente si fa bagnar talora il deretano, e le cosce coll' acqua fredda: è vero, che per tal mezzo si può muovere il ventre; ma si corre pericolo di risvegliare i dolori colici.

I VERMI.

Questi son così rari nei bambini lattanti, come son comuni fra quei, che sono slattati: i segni ordinarij della loro dimora nelle prime vie, sono i rutti agri, manifestati dall' odore della bocca, la salivazione, il vomito, il singhiozzo, la sete, l' appetito, ora vorace, ora languido, il ventre tumefatto, i dolori di ventre, la diarrea, le dejezioni mucose, o putride, e l' abbandono: il loro viso è a vicenda pallido, e rubicondo: provano prurito al naso, delle paure dormendo, digrignamenti di denti, convulsioni, ec. Alcuni tossono; vi sono di quelli, che provano delle ansietà, e dei deliquj: eccitano parimente i vermi talora una febbre acuta: finalmente se ne rigettano e per bocca, e per secesso. Si può dire, che i vermi sono nei fanciulli spoppati, come i dolori colici, e la dentificazione nei lattanti: perpetuamente ci attacchiamo a uno di questi due disordini, allorchè sopravviene qualche male d' un carattere equivoco: tuttavia gli attacchi dei vermi sono meno comuni di quello si creda, e la loro stessa presenza provata per le dejezioni, non ci difende sempre dall' errore; imperciocchè tutti fanno, co-

me gli adulti , di pari che i fanciulli ne restituiscono spesso senza incomodo. Abbiamo detto, che i vermi risvegliano spesso la febbre; dobbiamo aggiungere, che la stessa prende talora secondo le circostanze il carattere di putrida, e di maligna. Il respiro faticoso, il ventre teso, gli occhi convulsi, l'estremità fredde, il polso eclissato, ec. in questo caso, come negli altri tutti, son segni mortali. Abbiamo detto altrove, che i vermi potevan uscir pel cinto muscoloso dell'addome.

E' indubitato, che i purganti, e specialmente i mercuriali, sono i migliori vermifughi: la giallappa, il diagridio, lo sciroppo di fiori di pesco, la polvere cornacchina, il mercurio dolce, ec. sono i più messi in opera: talora si dà l'emetico, quando vi sono convulsioni; ma ne possono succedere delle catastrofe, e non si lascia d'attribuirghele, di modo che l'amministrazione di questo rimedio ricerca molta prudenza. L'efficacia dei vermifughi è stata grandemente contrastata, e lo è tuttora; ma senza entrar quì in tali discussioni, diremo, che il seme santo, e gli altri amari; la corallina, e gli altri asforbenti; il petriolo, e gli altri oli; il mercurio crudo, il suo decotto, e le sue preparazioni, sono i vermifughi più adoprati: comunemente si mescolano con i purganti, ed è ottimo un tal uso. Si posson parimente ritrarre vantaggi grandissimi dagli antispasmodici, come da altri rimedj appropriati alle varie circostanze, che possono incontrarsi col male, di cui parliamo. Si praticano eziandio linimenti fatti col petriolo, coll'olio di camomilla, con quello d'assenzio, di lauro, ec. Si applica il fiele di bue, la tintura di mirra, e d'aloè, l'unguento d'artanita, ec. Finalmente i lavativi col latte, e collo zucchero, col decotto di fichi, e con altri addolcenti, posson essere utili; e se ne rileva benissimo la ragione.

Prima di terminar questo articolo faremo osservare, che i fanciulli non son soggetti alle *ascariidi*; che il *solitario* è estremamente raro in essi, e che non si può conoscerlo, se non dopo che ne hanno restituito qualche porzione. In questo caso si praticano i rimedj da noi altrove proposti, proporzionando le dosi all'età del paziente. Si parla ancora fra le malattie de' fanciulli, dei *vermi umbilicali*, dei *crinoni*, e dei *cironi*: non vi è dubbio, che i primi non sieno veri lombrichi, che forano gl'intestini, e il bellico: quanto agli altri, appartengono alle malattie della pelle.

TENSIONE DEL VENTRE.

Sono i fanciulli sommamente soggetti alla gonfiezza , e alla durezza del ventre ; la prima, che nasce da venti rinchiusi nelle budella , non è da temersi gran fatto ; ma talora da motivo a ernie , sì inguinali , che umbilicali , e ad altri sconcerti , di cui parliamo altrove. L'innalzamento dell'addome con durezza , prodotto dallo stivamento del mesenterio , e dell'altre viscere , è sempre un male pericolosissimo , al quale si è osservato , che le bambine vanno più soggette , che i bambini : la diarrea in questo caso è un accidente , che fa paura. L'uso del rabaarbaro , e degli altri lassativi giova pel gonfiamento , che nasce da flatulenze ; vi s'impiegano anche i carminativi ; la polvere di fiori di camomilla , e d'anaci ; l'olio d'anici , ed altri sono i più familiarmente messi in opera , e con molta riuscita. In questa cura debbon entrare anche gli allentanti , e sono talora più efficaci degli altri rimedj : non si debbon nemmeno trascurare le fomenta emollienti , e i lavativi della stessa qualità. S'investe la tensione , e la durezza del ventre , conseguenza dello stivamento delle viscere , con i rimedj da noi proposti per le ostruzioni , fra le quali il *Sale di Marte* è sembrato il più proprio per i fanciulli : si praticano parimente contro tal male le fomenta rilascianti , e risolventi , le pittime col fiele di manzo , la sugna , e l'aloë , gl'impiastri squaglianti , ec.

L'ERNIE.

Le allentature , alle quali danno motivo le grida , la tosse , le flatulenze , ec. non sono pericolose : si ricovrano , e si conservano con molta facilità. Il cataplasma coll'ossimèle , e colla farina di fave , l'empiaastro del *Prior di Cabrières* , od ogni altro topico attrinvente , sono attissimi a fortificar queste parti , e ad impedire una nuova calata : bisogna , per quanto si può , che i fanciulli per un mese si stieno a letto , o nella cunna. Lo spirito di sale , di cui si pongono alcune goccioline nella bevanda loro , è uno dei rimedj , che sono stati troppo vantati per la loro novità , e che non si stima gran fatto ai dì nostri , per avventura perchè è noto a tutti.

I di fresco nati , ai quali è stato legato male il belli-

conchio, vanno soggetti al tumore del bellico, il quale nella maggior parte è un vero *esofale*: questo secondo può essere anche dalla nascita, e allora si corre rischio, com'io stesso una volta ho veduto, che venga legata coll' bellicoconchio una porzione dell' intestino, il quale putrefacendosi lascia in questa parte un foro, o una specie d'ano artificiale, per cui escono materie escrementali, vizio, che si può soltanto palliare fino a una certa età; e che poi puossi guarire radicalmente, col far sopprimere questa piaga, e con procurarne la cicatrice con i mezzi a tutti noti. Quando il tumor del bellico s'infiamma, si fa uso dei cataplasmi emollienti, dell'impiaastro d'uova di rane, dell'unguento rosato, dell'*album rhasis*, del populeo, del cerotto ec. Se questa, si esulcera, si lava con un'acqua di calcina leggiera, o coll'acqua di piantaggine alluminosa: vi s'impiega similmente il ponsolice, l'impiaastro di cerusa, la polvere di tarlo di legno, ec. La fasciatura finalmente rimedia al semplice tumore, come all'ernia umbilicale.

IL CALCULO.

La formazione della pietra è sovente un male ereditario, da cui non sono esenti i bambini lattanti; ma non è agevole il rilevarla, nè ce ne possiamo assicurare, se non colla tenta, o col tatto, introducendo un dito nell'ano: si sottopongono i bambini a tali ricerche, quando orinano a goccia a goccia, gridando, e piangendo: quei, che hanno certa età, mettono spesso la mano alla verga; e questo osservabilissimo segno è forse uno dei più sicuri. I migliori *litontrittici* in questo caso nulla giovano, la sola operazione chirurgica può debellar questo male, nè tampoco siamo certi di poterlo tener sempre lontano, poichè con frequenza si riproduce.

L'*iscuria* è d'ordinario dipendente dalla pietra; ma può dipendere da varie altre cagioni, che non si fanno rilevare con maggior chiarezza: si procura di rimediarevi colle bevande addolcenti; col cataplasma di papietaria, con quello di cipolla, e con gli altri rimedj, da noi proposti altrove: fanno anche delle unzioni coll'olio di scorpione.

VIZI DELL' ANO.

L'allentatura del deretano, come è noto, è più ordinaria ai fanciulli, che agli adulti: si fa rientrare com-

comprimendolo semplicemente colle natiche, o uno si serve del dito inzavardato d'olio, o di butiro, per ridurlo: quindi si procura di fortificare queste parti rilassate, fomentandole coll'infusione di rose rosse, nel vino, con i decotti di piantaggine, d'assenzio, di scorza di melagrana, e di bacche di galla, ai quali si può aggiungere l'allume: si praticano altresì coll'intenzione stessa le polveri astringenti, delle quali si carica del cotone arrotolato a foggia di supposta, che introduceasi nell'ano: le materie più atte a quest'uso sono il sangue di drago, e il mastice: allora bisogna fare stare i fanciulli in piedi, quando si sgravano del ventre: ognun vede, che una tale attenzione non può risguardare i bambini in fasce: finalmente l'età, meglio che qualunque altra cosa, gli libera da siffatta indisposizione.

Le emorroidi son rarissime fra i fanciulli: con più frequenza sono interne, nè si manifestano, se non pel sangue, che gemono. Non vi è altro da opporre a questo male, che il buon governo, e il riposo: si procura però di placare il prurito, e i dolori, che talvolta tormentano i pazienti, con fomite non meno coll'acqua calda, o con qualche decotto emolliente, che col latte: colla stessa mira si applica pure l'unguento d'altea, il populeo, ec.

LE CONVULSIONI.

E' sovente difficilissimo il distinguere le convulsioni dall'epilessia, e si può anche domandare, se debbanlo essere. Tuttavolta siamo in costume di chiamare epilessia quella specie di convulsione, che ha i suoi periodi, o accessi, e la cui cagione è permanente; e di dire semplicemente convulsione quella, che dipende da una cagione passeggera, e comunemente molto manifesta. L'*incubo*, a cui son soggetti i bambini lattanti, e ch'è noto sotto la denominazione di *pavor nocturnus*, dee appartenere similmente a questo Articolo, non v'essendo dubbio, che lo spasmo non abbia gran parte in questo accidente, o si riguardi come una malattia del petto proveniente dallo stomaco; o che si prenda come una semplice affezione nervosa; oltre di che precede d'ordinario l'epilessia, di cui qui si tratta principalmente. E' noto, che è particolare ai fanciulli fino all'età di sett'anni, e che le convulsioni son comuni a tutte le età. Lo sbadigliamento, la vigilia, e

i terrori panici, sono i forieri dell'epilessia: il tremore, lo scuotimento delle braccia, e i movimenti irregolari degli occhi colla perdita del sentimento, la dichiarano. La dentificazione, i vermi, e il reo stato delle prime vie, il più delle volte son la cagione dell'epilessia, e delle convulsioni; ma le seconde sono ancora l'effetto degli acuti dolori colici, dei mali gravi, dei purganti stimolanti, ec. si dee sospettare la dentificazione, quando i bambini vomitano, che hanno lo scioglimento di ventre, e che le loro dejezioni sono verdastre. I fanciulli allevati colla maggior delicatezza, e che hanno il ventre costipato, sembrano più disposti all'epilessia: quelli, le cui madri nella lor gravidanza non hanno osservato alcun governo, le cui nutrici sono isteriche, gravide, o date in balia a qualche violenta passione, vi son parimente molto soggetti: i bambini tignosi rade volte sono epilettici, qualora questo sfogo non dia in dietro in un subito. Del rimanente l'epilessia è più pericolosa nel primo, o secondo mese dei bambini, che in qualunque altra età; e i suoi accessi debbon più temere, quanto più sono frequenti. Abbiamo detto altrove, che l'epilessia dei fanciulli termina per lo più sull'età della pubertà, e che si è creduto d'aver osservato, che la medesima dura, o sette mesi, o sette anni.

Di questa malattia segue, come dell'altre tutte: la cognizione delle cause, che non trascendono la nostra capacità, dee servir di regola per la scelta dei varj rimedj, che proponghiamo. Gli emetici, come il tartaro stibiato, il Kermes minerale, e l'ipeacuana, son sempre paruti i più efficaci: si debbono amministrare fuori del parossismo, se non ci troviamo in casi urgenti, nei quali ci esporremo a troppo rischio, se si aspettasse la calma: si proporzionano le dosi all'età, cioè, si dà la metà, un terzo, un quarto di grano di tartaro stibiato, e di Kermes minerale; alcuni gran d'ipeacuana, ec. I purganti in questo caso utilissimi, debbon parimente amministrare fuori del parossismo: il diagridio, la gialappa, la polvere cornacchina, e il mercurio dolce, in questa occasione sono quasi sempre da anteporsi ai lassativi, poichè questi secondi, par, che sdruciolino sopra le materie mucose, che intonacano le prime vie. Il cavar sangue nel parossismo ha talora prodotto buoni effetti: le emorragie, che sonosi ve-

dute

dute spesso terminate le convulsioni, pare, che autorizzino questa pratica: tuttavia s'usano di radissimo per i bambini lattanti. Gli assorbenti, e i vermifughi, come i testacei, il corallo, la corallina, gli occhi di granchio, la creta, le scorze d'uovo calcinate, la magnesia, sono d'un grand'uso in questo morbo: è bene il fare osservare, come questi rimedj, che par, che debbano costipare il ventre, producono d'ordinario l'effetto opposto, lo che dee riferirsi verisimilmente a una specie di sale neutro, che risulta dal loro incontrarsi con gli acidi delle prime vie. Si ritrae per lo più poco frutto dagli antispasmodici ordinarij se non si son fatte precedere buone evacuazioni; e anche un moderato uso degli assorbenti: i fiori ditiglio, e di quaglialatte, la radice di valeriana silvestre, il castore, il succino, la polvere di gutteta, e la triaca, sono i più frequentemente usati, e per i bambini, e per la nutrice.

Si dà nel tempo del parossismo lo spirito di succino, o di corno di cervo in alcun' acqua cefalica: si soffia nelle narici la polvere di fiori di tiglio, di radice di giglio, delle foglie della bottanica, della salvia, dello spigo, ec. Il fumo del tabacco spinto nella bocca, può, eccitando il vomito, dileguare l'epilessia: si danno ancora nell'acceso clisteri acri, e purganti, o antiepilettici: s'applicano coppette; si stropiccia la spina con del grasso di castore, ec. Sonosi veduti finalmente dei buoni effetti dai vescicanti, dal cauterio, e dal setone; ma ognun vede, che questi debbonsi praticare dopo il parossismo, e come preservativi.

LE A F T E .

Son queste bolle bianchicce, o pustule vescicolari, di rado accompagnate da infiammazione, che in brev'ora degenerano in ulcerette, e non solo occupano la bocca, ma talvolta ancora l'esofago, e perfino la trachea-arteria dei bambini; si sa, che vi vanno più soggetti i nati di fresco. Queste ulcere posson essere d'un reo carattere, lo che si rileva non meno alla loro negrezza, che alla loro estensione, e alla loro profondità, che talvolta giunge fino all'osso: si vede bene, che in tal caso debbon essere pericolosissime; e vanno anche a finire bene spesso nella cancrena. Segue ancora, che le aste si stendano per tutta la lunghezza dell'esofago, che guadagnino lo stomaco, e il decotto intesti-

nale, dal che risulta la febbre, i dolori colici, la diarrea, e la dissenteria, sintomi perpetuamente rei. Negli altri casi danno poco da temere, e si dileguano molto agevolmente. Il latte alterato dall'abuso, che le nutrici fanno del vino, o dalle passioni, che le dominano, le ree digestioni del fanciullo, i vermi, ec. sono le cagioni più familiari di questo male, che allora è molto leggiero; ma è più grade, allorchè nasce da veleno venereo, o scorbutico.

Dopo aver pensato a tutto ciò, che può riguardare la nutrice, si comincia da evacuare le prime vie, o con i vomitivi, o con i purganti: fra i secondi il più impiegato è il rabarbaro. Gli assorbenti non sono meno utili in questo, di quello siano nei casi precedenti: i diaforetici, gli antiscorbutici, e gli antiyenerici, secondo le circostanze possono essere vantaggiosissimi: gl'ipnotici amministrati con prudenza hanno alcuna volta prodotto ottimi effetti; ma di rado si ricorre a tutti questi rimedj per un male, che si dilegua di per sè, o per l'ajuto d'alcuni topici. Si lavano queste ulcere col vino, coll'acqua d'orzo, o col decotto di pervenca, ai quali s'aggiunge il miele rosato, lo sciroppo di rose secche, lo spirito di vetriolo, ec. Si toccano coll'essenza di Rabel, collo spirito di vetriolo, ec. L'olio di tartaro per deliquio adoprato nella guisa stessa è attissimo ad impedire la cancrena; e finalmente la tintura di lacca è la più propria per le ulcere scorbutiche. Abbiamo parlato altrove del male di gola cancrenoso, e abbiamo fatto osservare, che per lo più investe i fanciulli.

LA DENTIFICAZIONE.

Tutti fanno, che i primi dieci denti di cada una mascella, che si dicono denti del latte, spuntano nello spazio di circa due anni; che verso il settimo anno compariscono i due molari, che vengono dopo; che i seguenti non si fanno, se non sull'undecimo, o duodecimo anno; e che i due ultimi, che diconsi i denti della Sapienza, non ispuntano per lo più, se non verso il diciottesimo, o ventesimo anno, talora più tardi, o non mai. Parimente sull'anno settimo cominciano a cadere i denti del latte, che debbono esser rimpiazzati da quelli, che si portano per tutto il tempo della vita; e questa rinnovazione di denti non è per lo più

più compita prima dell'età dei quattordici, o quindici anni. Gl'incisivi non compariscono, se non sul sesto, o sul settimo mese. Gli altri spuntano successivamente, secondo il loro ordine: i soli canini non son sempre soggetti a questa regola, non comparendo sovente, se non dopo i primi molari. Si dee anche osservare, come i denti della mascella inferiore sono i primi a spuntare: tuttavia l'uscita dei denti è esposta a grandi variazioni, e si è talora veduto, che non cominciano a farsi vedere, se non sul decimo, e anche sul decimoquinto mese.

Gl'incisivi posson risvegliare molti sconcerti: tuttavia lo spuntar dei canini, e dei molari, è d'ordinario il più penoso; ma si teme soprattutto quello dei canini della mascella superiore. Nel tempo del mettere i denti, sempre lunghissimo, e che bisogna distinguere dallo spuntare dei medesimi, sopravvengono ai bambini i più rei accidenti, che talora precedono di due, o tre mesi l'uscita del dente: appunto in tali circostanze si gonfiano le gengive, e fanno sì dolorose: allora si incalorisce la bocca, e questo calore produce la sete: i bambini si mettono il dito, od altro alle gengive, e stringono anche il capezzolo della nutrice. I dolori inseparabili da tale stato, risvegliano con frequenza la salivazione, il vomito, i dolori colici scioglimento di ventre con deiezioni verdastre, e possono anche dar fomite alla febbre, infiammar le gengive, ed anche le mandorle, ove formansi pustule, o abscessi: la cagione medesima può gonfiare le labbra, e screpolare: eccitar nella bocca delle asfe, che stendonsi talora, come abbiamo detto, per la lunghezza dell'esofago, e penetrano fino nella trachea-arteria, ove danno occasione alla tosse più ostinata. I terrori panici, gli scuotimenti in dormendo, le grida; che nulla può quietare, le vigilie, e finalmente le convulsioni, sono le molto ovvie conseguenze della dentificazione: si fa pur troppo, che può precipitare in una malattia mortale; che si ha più da temere per i bambini ben pasciuti, che per i pletorici, e per quelli, che hanno il capo grosso, o il ventre duro, e costipato: nulladimeno alcuna volta segue senza il menomo accidente, ed anche senza tampoco accorgersene.

La dentificazione è lavoro della Natura, il disturbar la quale con dei rimedj è sempremai pericoloso:

possiamo soltanto favorire questa operazione, ammollando le gengive con del butiro, e col midollo di vitello, o col grasso di pollo: si lava la bocca con acqua melata, col decotto di fichi; si premono le gengive col dito; si dà anche a masticare un pezzetto di ligustria, una radice di malva, una caudeletta, o cosa simile. Nei casi pressanti, e quando il dente è per ispuntare, si può fare una incisione alla gengiva, che poscia si lava col miele rosato; ma tale operazione non dee mai ammetterfi, che nel secondo tempo della dentificazione; se si fa più presto, si corre pericolo di richiamarvi la cancrena. Quando la febbre è vivace, e i sintomi violenti, si posson calmare colla cavata del sangue: i purganti miti, sendo lontani i dolori, ed anche l'emetico, posson far gran bene, ma dobbiamo guardare dall'amministrar questi rimedj nei parossismi: non vi è da temere dei lavativi, e delle supposte, che posson supplirvi: niente meno sospetti dei purganti sono i narcotici, tuttochè sembri essere stati dati alcuna volta con riuscita: lo sciroppo di papavero eratico può passare per un leggiero calmante, del quale non possiamo temere. Due Pratici famosi, il *Sydenham*, e il *Boerhaave* si servivano utilmente dello spirito di corno di cervo alla dose di due, a quattro goccioline; a me però è sembrato, che non produca gli stessi effetti in questi nostri climi.

L' IDROCEFALO.

E' questo un tumore acquoso di tutta la testa, che talora ne diviene mostruosa, e mezzo trasparente: questo morbo è particolare ai fanciulli; imperciocchè non si dee dare tal denominazione all'idropisia del cervello, che s'incontra così frequentemente nelle altre età, ma che non accresce il volume della testa. La contusione, e la sorgente più ordinaria di questo stivamento: la dentificazione, i vermi, le convulsioni, posson parimente promoverla. Questo raccoglimento d'acque, ora è sotto la pelle, ora sotto il cranio, o sotto questa cassa, e la dura madre, e sotto questo involuppo, più o meno profondamente, sino ai ventricoli, che ne sono quasi sempre inondati. I fanciulli attaccati da questo male son pallidi, deboli, e languidi: lo spuntare dei loro denti è tardo: hanno gli occhi in fuori colla pupilla dilatata: la maggior parte ha delle leggieri con-

convulsioni nella bocca, e nelle palpebre, digrignamenti di denti, e cadono in progresso in una specie di soporimento, che fa tener per certo lo stravasamento interno.

Ha fatto vedere l'apertura dei cadaveri, che l'acqua contenuta nella cavità trovavasi spesso in tanta quantità nel centro, che dilungava il cervello verso i suoi involucri dilatati, e riduceva talvolta questa viscera ad alcune linee di grossezza: si è anche veduto il condotto della spinal midolla inondato: si è inoltre trovato il plesso corroide gremito di granelli glandulosi, la glandula pituitaria scirrofa, di pari che il cervello, e la midolla spinale: la volta orbitale appianata; le ossa del cranio dilungate talvolta di due, o tre dita trasverse l'une dall'altre, e spinte all'infuori, ec. L'acqua non occupa sempre l'interno del cervello: ella inonda alcuna volta i suoi anfratti; si è ancora veduto lo stravasamento fra il cranio, e gl'involucri; e in questo caso il cervello sommamente compresso, ridotto talvolta al volume d'una mela mezzana: I fanciulli attaccati dall'idrocefalo nel ventre della madre, d'ordinario muojono in uscendo d'esso ventre. E' quasi impossibile rimediare a questo male, quando è inondato il cervello; ma si dee sperar molto, se il male stesso si trova tutto fuori del cranio: in tal caso può durare lunghissimo tempo, e per conseguente darci tutto l'agio d'investirlo.

L'idrocefalo richiede la cura stessa delle altre idropisie, che verte, com'è noto sopra gl'idragoghi, i diuretici, gli aperienti, i fortificanti, e gli epatici: il rabarbaro, la gialappa, il diagridio, il mercurio dolce, sono i rimedj usati più familiarmente. Eternamente si praticano i risolventi, e i discuzienti, cioè le fomentate coll'acqua di calce pura, o mescolata coll'acquavite; col decotto di fiori di camomilla, di sambuco, di stecas, di bettonica, e altri, del quale s'inzuppano pezze, e piumaccioli: l'applicazione dello zolfo ridotto in pomata coll'olio di camomilla può giovare. Sarebbe agevole in alcuni casi il praticar la puntura, o il fare delle scarificazioni; ma le prove, che sono state fatte dell'una, e delle altre, non sono state felici: sonosi veduti per lo contrario de' buoni effetti dai vescicanti, dal cauterio, e dal setone; ma questi sfoghi non son riusciti salutari, se non quando sono

stati fatti precedere i rimedj atti a correggere il vizio del sangue, o degli umori.

LA RACHITIDE.

I fanciulli posson precipitare nel languore dall'età di nove mesi fino ai due anni: è cosa rara, che questo male cominci prima, o dopo; non si dee più temerlo, quando i fanciulli, che non ne son punto attaccati, son giunti all'età di quattro anni. L'annodatura (*rachitis*) vien per lo più annunciata dalla debolezza delle gambe, da una specie d'intorpidimento di tutte le parti, dall'ingegno sviluppato innanzi tempo, dalla grossezza della testa, e dall'estenuazione delle estremità; e finalmente dallo spuntar tardo, e malagevole dei denti, che in brev'ora si guastano. Si manifesta con nodi, e protuberanze nelle giunture, pel gonfiamento delle apofisi vertebrali, per tumori alle costole vicine allo sterno, e per la curvatura delle ossa delle gambe, e delle cosce. Il petto in tali circostanze acquista rea conformazione: si stivano i polmoni, onde risultano la tosse, la difficoltà di respiro, con i sputi purulenti: si caricano le ossa, ec. Si vede bene, come la febbre lenta dee essere inseparabile da questo stato; ma si rinforza talvolta, e faasi acuta: lo scioglimento del ventre è allora un sintoma orribile: va finalmente a terminare nel marasma, nella rischezza, e nell'idropisia, che mandano in brev'ora i pazienti al sepolcro. Quelli, che non ne guariscono prima dell'età di cinque, o di sei anni, restano per tutta la vita loro infermicci, e contrattati.

L'ispezione anatomica ci espone stivamenti scirrofi, tubercoli geffosi, e putrefazioni nel polmone, nel fegato, nel pancreas, nel mesenterio, ec. Sonosi trovati stravasamenti nel cervello, nella midolla spinale, e altrove, flogosi nelle viscere del basso ventre, un gonfiamento straordinario nelle budella, ec. Si crede, che questo morbo abbia la sua sorgente nel vizio scrofoloso, celtico, o scorbutico dei genitori, o della nutrice: si è più volte osservato, che i fanciulli, che nascono da un padre vecchio, infermo, o consumato dagli stravizzi, divengono rachitici: il tornare in dentro della tigna, e d'altre sfortture rognose, la prava cura del vajuolo, o d'ogn'altra malattia grave, possono parimente darvi occasione.

Questo morbo vuol di rado la cavata del sangue; ma

ma gli emetici, e i purganti replicati sono indispensabili: vi si dee più che d' altro far uso grandissimo del rabarbaro. Somministrano buone medicine gli aperienti, e gli squaglianti, come la garancia, la curcuma, i centogambe, i marziali, antimoniali, e i mercuriali, ai quali bisogna aggiungere la cassia legnosa, l' elisir *proprietas*, e gli altri fortificanti, che corrispondono alle stesse intenzioni: i bechici, gli antispasmodici, e i diaforetici, come le capillari, la tussilagine, la veronica, il crescione, il guajaco, ec. posson parimente aver parte in questa cura. I lavativi emollienti, e addolcenti sono dicevolissimi, massime quando il ventre è duro, e sollevato: fannosi inoltre delle fregagioni alla schiena, e alle estremità con pezze asciutte, e profumate d' aromati: sono stimati i bagni, e le fomentate aromatiche col vino, oppure si fa un decotto colla salvia, col timo, col rosmarino, collo spigo, colle coccole di ginepro, e d'alloro: si fanno unzioni coll' olio di lauro, coll' unguento marziale, e con altri fortificanti: i vescicanti, e il cauterio alla nuca posson produrre ottimi effetti: viene anche proposta l' immersione di tutto il corpo nell' acqua fredda, non meno per prevenire la rachitide, che per guarirla: veramente un tal rimedio può giovare; ma bisogna anche confessare, che la sua applicazione non è indifferente: ognun sa finalmente, che ai fanciulli, i quali si trovano in questo stato, dobbiamo far osservare un buon governo, fargli spesso camminare, trasportargli in luogo asciutto, ec.

MALE DI COSCIA.

Sotto il presente Titolo, seguendo le tracce del chiarissimo, e sperimentatissimo Sig. *de Haen*, vogliamo, che venga intesa quella multiplice affezione della coscia, da cui non va esente alcuna età; ma ch' è propria singolarmente dei fanciulli, la quale non solamente suol tirar seco lo zoppicamento, od anche l' impotenza fisica di muoversi, ma eziandio il termine della vita. Un simigliante morbo vien minacciato da cadute da un luogo eminente, da percosse, o da qualvoglia altra cagione: lo promuovono altresì gli sforzi gagliardi, i salti, e ogn' altro scherzevole movimento energico del corpo. Un tal malore viene annunziato dai dolori fissi nella parte, accompagnati talora da gonfiezza della medesima. Può anche il male di coscia dipendere da ca-

gioni interne: imperciocchè lo produce una concorrenza d'umori in questa parte nelle malattie acute; nè è rara una fistola metastasi nel vajuolo, nella rachitide, nell'affezione scrofolosa, scorbutica, e venerea; e finalmente negli adulti può produrlo la diatesi atritica, e reumatica: per altro questo morbo prodotto essendo da cagione esterna, vien conservato dalla discrasia degli umori. Ognuno poi fa, come dalla contusione dei ligamenti, da urto, da sfivamento, o da qualsivoglia altro violento slungamento, come dalla lussazione, e dalla frattura, nasce un acuto dolore, che vien succeduto da confluenza d'umori, o da una genuina infiammazione. Si scioglie questa affezione per lo più colla risoluzione, qualora non si oppongano al lavoro della Natura rimedj amministrati mal a proposito; altrimenti vi si formano delle marce, dalle quali risultano dolori più atroci, la febbre lenta, e la tabe. Vien poi giudicato più malagevole a risolversi un tal decubito d'umori, se nasca da trasferimento della materia morbica nei mali acuti, vale a dire, nel vajuolo, nella febbre maligna, nella putrida ec. dalla rachitide, dalle scrofole, o da qualunque altra virulenza: dal che ne risulta un tumore più, o meno rilevabile, il quale sulla fine, o più presto, o più tardi promuove le marce. Laonde non è maraviglia, se un grande abscesso nella maggior parte corrompa totalmente la connessione dell'osso, e le parti ad esso adjacenti. Questa putredine sciogliendo i ligamenti, insensibilmente viene a smuoversi dalla sua sede l'intestatura del femore, e la gamba, a motivo di fistola lussazione, da principio suole a poco a poco allungarsi, per divenir poscia più corta. Ognun vede, che dal piede accorciato ne deve seguire lo zoppicamento; ma vi è un'altra cagione, cioè il dolore, per cui i pazienti non possono reggersi sul piede offeso.

Questo genuino difetto organico, siccome è patente dopo morte per l'apertura de' cadaveri, così è oscuro, e intrigatissimo nell'infermo vivente: in fatti le dissezioni anatomiche ci fanno vedere la lussazione del femore, la cui intestatura, per trovarsi slungato più del dovere, o rotto il ligamento terete, scacciata dalla sua incassatura, occupa una diversa sede, o superiore, o inferiore, anteriore, o posteriore. Per lo più la detta intestatura è aderente all'orlo della fossa, e per un anfilosi viene a formare un sol corpo coll'acetabolo, o
 sia

sia incassatura . Talvolta riempie questa cavità un certo corpo, che ha l'aspetto di glandula . A motivo del covamento della sozzura purulenta nelle accennate parti, le ossa vengono spogliate delle loro cartilagini , e del periostio , sono intaccate di carie , e si sciolgono non di rado in una sporchissima putredine . In guisa somigliante si corrompono i ligamenti, dei quali spesse fiate non si rileva vestigio . Nella maggior parte questa sozzura si stende per ogni dove, dalla quale non di rado rimane offesa tutta la coscia . Torna bene però osservare, che talvolta la marcia ivi cova senza corrodere le parti vicine, per essere questa peravventura d' indole più mite , o per farvi minor dimora . Finalmente, oltre la strage divisata, si trova la coscia rotta nella cervice, coll' intestatura rimasa staccata entro l' incassatura ; ma con più frequenza nei cadaveri de' soggetti più giovani sciolta l' epifisi dall' osso ; per non far parola degl' intacchi dei polmoni , del fegato , del pancreas , dell' omento , del mesenterio , e delle altre viscere , originati, come sembra probabile, dalla marcia framischiata col sangue .

Questa malattia giunta a certo tal dato termine smentisce ogni Medica industria , quando cioè siamo certi, che vi ha putrefazione e carie delle ossa : in questo stato gl' infelici pazienti vanno insensibilmente struggendosi, e incamminandosi al sepolcro . Per lo contrario abbiamo non lieve speranza di ricovrar la sanità nei principj del male, mentre la parte non si dilunga dalla forma naturale , e soltanto si lagnano i pazienti d' un dolore nel muover la gamba . Contuttociò non vogliono alcuna medicatura , ma abbisognano di riposo, anzi forz'è, che stieno distesi in letto, per uno, o per due mesi , e anche di vantaggio , se il caso lo esiga ; vale a dire, allorchè con cautela fatta prova delle forze della gamba, i pazienti per anche zoppicano , o nel muovar la gamba sentono ancora qualche dolore : è noto anche a tutti, che dobbiamo unirvi una dicevole dieta . Rispetto poi ai soccorsi Medici, o Chirurgici ; assicurati dalla moltiplicata esperienza non dubitiamo d' afferire, come tutti i topici risolutivi migliori, e singolarmente le usate tanto irrigazioni dalla parte superiore , non solo non rimediano alla confluenza degli umori, ma par piuttosto , che ve gli richiamino viepiù . Sanno ciò molto bene i dotti Pratici , i quali so-
glio-

gliono lasciar tutta l'opera in mano della Natura; dove per lo contrario gli scioli affaltano questo male con istolta e temeraria sicurezza con rimedj a capriccio, fino a tanto che peggiorando grandemente gli ammalati, sienq costoro forzati a dar luogo.

Ci vien poi quasi tolta ogni speranza di guarigione, qualora vi sieno segni di purulenza, mentre dal luogo covar delle marce le cartilagini, e le ossa son divorate dalla carie, o rovinate da schifosissima putredine. In questo caso si dee tentar tutto per richiamare le marce verso la cute, lo che effettuano gli *emollienti*, e i *maturanti*. Tosto poi, che si rilevi della fluttuazione, o altri segni additanti la fucina del male, incontanente si faccia un'ampia incisione, ond' escano le marce. Alcuni amano servirsi a tal uopo d' un cauterio; ma con questo infuocamento viene a ritardarsi l' esito delle marce, e l' angusto foro è d' impedimento alla dovuta deterzione dell' ulcera fistolosa. Tuttavia nella maggior parte l' uno, e l' altro compenso ha un' infelice riuscita, qualora non sieno sane le parti, che circondano l' abscesso, lo che, come additammo poc' anzi, è rarissimo. In queste angustie, se si eccettui la dieta lattea, pochi rimedj ci s' offrono nella Pratica: non dobbiamo però lasciar di dire, che la China ci somministra in questo caso un *antisettico* singolarissimo. Il soprallodato Sig. de Haen dandone mezz' oncia il giorno col latte di capra, nello spazio di quattro mesi giunse a superare una simigliante affezione data per disperata. Ma questa corteccia non comportano quei che hanno la tosse, in qualunque dose si amministri. Lo stesso chiarissimo Autore prescrive, che si applichino anche alla parte dei tovagliolini bene inzuppati nel decotto della stessa China; lo che può effettuarsi senza pericolo. Nulla poi aggiungiamo rispetto agli altri ajuti interni, riguardanti il vario vizio degli umori.

MALI DELLA CUTE.

Questi non son descritti con più chiarezza di quelli degli adulti, la cui istoria come dicemmo, è sommamente invilupata. La tigna, ch' è uno dei principali, ha ricevuto varie denominazioni, che non corrispondono nè ai suoi gradi, nè ai suoi aspetti, *tinea*, *crusta lactea*, *ignis volaticus*, *porrigo*, *furfuratio*, *scabies capitis*, *achores*, & *favi*, sono denominazioni poco

note ai Pratici, e la cui applicazione è stata così arbitraria, ch'è quasi inutile l'esporle. E' la tigna una specie di volatica scagliosa, e corrosiva, che manda sovente fuori un reo odore, e che viene alla testa: ne' bambini lattanti, si spande più sul viso, che sulla cotenna capellata, e si dilata ancora sopra le altre parti del corpo; ma il volto dei fanciulli slattati per lo più n'è va esente: negli uni, e negli altri le parti detratte delle orecchie per lo più sono intaccate, e talora ne risulta un copioso scolo: alcuni chiamano crosta lattea questo morbo: altri pure chiamano così quella specie d'intonaco, o di grasso, per lo più grasso, e umido, che si vede sulla testa, e sulle ciglia dei bambini, che si dilegua dipersi, o coll' applicazione dell'olio di mandorle dolci, o del butiro fresco: la scabbia, il fuoco salvarico, ec. sono ancora nomi attribuiti a quella specie di rogna del viso, che non è diversa dalla tigna, che per la sua sede. La tigna, che dee abbracciare tutte queste affezioni, il più delle volte è leggiera, e superficiale; ma incava talora ulcere profonde, che penetrano fino alle ossa del cranio, e le cariano: ciò segue specialmente, allorchè dipende da un vizio scrofoloso, venereo, e scorbutico: tuttavia una tal fioritura è per lo più salutare ai bambini; e per conseguenza ci dobbiamo ben astenere dal farla rientrare con dei topici: ella si dilegua comunemente più presto, o più tardi per se medesima: dobbiamo prometterci ogni più reo malore, allorchè si dilegua in un subito: la febbre, la tosse, la diarrea, le convulsioni, ec. sono gli accidenti, che ne seguono.

Allora solo è permesso investire la tigna con rimedj, quando è d'un reo carattere: dopo i generali, si giudicano necessarij gli epatici, e i depuranti, come, l'agrimonia, la pazienza, il fumosterno, la veronica, e il crescione; e questi sono i più adattati, e il cui effetto non può farci paura: quindi possiamo passare ai diaforetici, e anche agli squaglianti; tali sono la scabbiosa, il cardo benedetto, le vipere, il Kermes minerale, l'antimonio diaforetico, il sal volatile di corno di cervo, l'etiope minerale, e altri rimedj appropriati ai varj stati del sangue, e degli umori: si danno altresì gli assorbenti, se lo richieggano le crudesse acide dello stomaco. Bisogna in tutta questa cura, quando è creduta necessaria, operare lentissimamente, poichè sa-

reb-

rebbe pericoloso il fare sparire in un subito questo morbo : siamo perfino obbligati, quando ciò segue, a fare ogni sforzo per richiamarla, o supplirvi con altre evacuazioni : i vescicanti in tal circostanza, sono i rimedj, dai quali sonosene veduti cento volte ottimi effetti.

L'applicazione dei topici non richiede minor prudenza dell'amministrazione dei rimedj interni : dobbiamo bandirne tutti i *repercussivi* ; ma si possono usare senza alcun rischio i rilassanti, e gli addolcenti, quando la cute è tesa, e che son seccate le croste : l'acqua di malva, l'olio di mandorle dolci, le foglie di lattuga peste, coll'olio rosato, e coperte di burro fresco, son destinate a tal uso : fanno anche talvolta delle lavande col decotto di fumosterno, di pazienza, di veronica, e di celidonia : s'applica una specie di pomata fatta coll'olio di mandorla dolce, e coll'olio di tartaro per deliquio ben ben battuti insieme : s'usano parimente alcuni unguenti, in cui si fa entrare lo zolfo, e il mercurio ; ma sarebbe cosa imprudentissima il servirsi di questi ultimi topici, senza aver fatto precedere i rimedj interni. E' bene l'osservare, che gli oleosi, e i grassi non si convengono alla faccia, alla quale al più al più si può applicare del butiro fresco, o della crema di latte ; ma bisogna soprattutto impedire, che i fanciulli si tocchino. In molti spedali vien fatto uso dell'impiaastro di pece, che s'applica alla testa, dopo d'averne tagliati i capelli : si stacca in capo a ventiquattr'ore, e si porta via la tigna con il rimanente dei capelli, lo che non può eseguirsi senza grandissimi dolori : allora s'addolcisce questa piaga sanguinosa coll'olio d'uova, e si asciuga col metodo ordinario : si può replicare questo violento rimedio, ch'è uno de' migliori, che possano praticarsi, ma che non ci dispensa dalla preparazione ordinaria. E' talora permesso, quando l'ulcere s'inoltrano molto, e che la sanie, che ne scola è troppo copiosa, impiegar la creta, la tuzia, la cerusa, la pietra calaminare, e altre polveri disseccanti ; ma fuori di questi casi estremi è cosa imprudente l'usarle. Quando i fanciulli hanno dei pidocchj, come avviene ai tignosi, si lava loro la testa col decotto di stasisagria nella rannata ordinaria ; si spolvera colla polvere dello stesso seme, ec.

Sono i fanciulli sottoposti a una malattia, che ha grande affinità con quello, di cui abbiamo parlato, e che

che per lo più dipende dalla stessa cagione : è questo un trasudamento sanioso, e purulento delle orecchie : è d'ordinario preceduto da uno stivamento infiammatorio, che talora è sì doloroso, che risveglia le convulsioni: dobbiamo sospettarvi la flogosi, quando la febbre è vivace, e che i fanciulli mandano alte grida ogni volta, che si toccan loro le orecchie inferme : termina sovente colla carie degli ossicini, e colla sordità. Si procura di calmare i dolori, facendo scolare del latte, o dell'olio di mandorle dolci nel condotto uditario: quando lo scolo della sanie annunzia l'ulcera, sanosi delle iniezioni coll'orina, o colle infusioni amare, deterfive, e antiputride. Quanto ai rimedj interni, non sono diversi da quelli da noi proposti per la tigna, e richieggiono le cautele medesime.

La rogna dei fanciulli è parimente un male, che ha relazione grande con i precedenti, ma che comparisce in altre circostanze; non s' affomiglia in verun conto a quella, che negli adulti ha la stessa denominazione. La rogna, di cui parliamo, è effetto d'una specie di depurazione della massa del sangue, che non manca di venire a quelli, che hanno succhiato un latte riscaldato, o di rea qualità: comunemente si manifesta dopo d'avergli slattati, massime quando questo nuovo governo non ha loro prodotto lo scioglimento del ventre. Questa fioritura si stende per lo più per tutto il corpo, e somiglierebbe molto, sul principio, alla rosolia, se non la distinguesse la lontananza dei sintomi propri alla seconda: le pustole in questa specie di rogna, sono più, o meno numerose: quelle, che occupano le parti più calde, sono più grosse: eccitano sovente un pizzicore, che tormenta i fanciulli, e son talora ostinatissime singolarmente intorno al bellico. E' cosa rara, che dobbiamo por mano a' rimedj in questo male, che dee riguardarsi come un lavoro salutare della Natura, ch'è sempre male il frastornare, e ancor più il fermare con applicarvi il litargirio, lo zolfo, o il mercurio, come talvolta vien praticato: è riputata così vantaggiosa, che si teme per quei ragazzi, i quali sull'età di sette anni non hanno avuto alcuna di queste fioriture. Bisogna aggiungere, che son talvolta conservate dalla dentificazione, nè per quanto vi si possa fare, se ne vede il termine, se non dopo l'uscita del ventesimo dente. Quando adunque un tal male

le ci offre il suo aspetto ordinario , ci dobbiamo limitare ad addolcire il gran pizzicore colla crema , coll' burro fresco , coll' olio di mandorla dolce , ec. e a dare , quando è sul suo termine , dell' acqua di rabarbaro , o lo sciroppo di cicoria composto . Ma se vi si rileva un reo carattere , si medica con i purganti , con gli stomatici , e con gli amari ; con i depuranti , e con i diaforetici ; con gli aperienti , e con gli squaglianti , ec. con altri , de' quali più volte abbiamo fatto menzione : si può anche in tal caso far uso esternamente dell' unguento mercuriale , o di quello , che si prepara collo zolfo , e colla radice di pazienza ; ma non possiamo dar di mano a questi topici , se non dopo un lungo uso de' rimedj interni .

Si vede anche comunissimamente nei bambini in fasce un' altra affezione cutanea , che si spande sopra tutte le parti , che sono esposte all' azione dell' orina , cioè sopra l' ipogastro , sopra le anche , sopra l' anguinaja , sopra le cosce , e sopra le gambe : è un rossore vivacissimo , formante delle placche assai estese , e delle pustole con una leggiera flogosi , che sul principio comparisce resipelacea : prende quindi un aspetto volaticoto , e talvolta quello della scottatura : il calor del sangue , e l' acrimonia dell' orina , ne sono la cagione ; ma ne troveremo la sorgente nei vizj del latte , vizj , ch' è necessario scuoprire , e correggere . Questi rossori non si medicano esternamente , se non se con addolcenti , come col burro fresco , e colla crema ; dopo d' avergli lavati coll' acqua di malva , o col latte tiepido , vi si può impiegare talvolta le lavande detergenti : l' acqua di piantaggine con una quarta parte d' acqua di calce , vi s' adatta assai bene ; ma il cerotto , l' *album rhabis* , e le pomate , che soglionvi si applicare , non vi riescono gran fatto .

Le scorticature , o le escoriazioni son parimente assai ovvie nei fanciulli : non solamente le parti che sono esposte all' azione degli escrementi , e dell' orina , vi sono esposte , ma il collo altresì , le parti deretane dell' orecchie , la ascelle , ec. Non richieggono se non pulizia , ed alcune lavande coll' acqua di malva : si spolverizzano poscia colla polvere di legno tarlato , colla ruzia , colla pietra calaminare , ec. Si fa parimente uso dell' *album rhabis* , del ponsolice , del nutrito , dell' unguento di cerusa , e d' altri addolcenti , e disseccanti .

Le screpolature sono specie di laceramenti della pelle, che sono molto ovvj nel naso, nelle labbra, e nelle dita dei fanciulli: vi si formano talvolta delle callosità difficoltose a sciogliersi: la cagione ordinaria n'è il freddo. La loro cura è semplicissima: ci contenteremo di lavarle col vino calao, e d'applicarvi alcun linimento addolcente, come l'olio di mardorla dolce, l'olio d'uova, il sègo lavato, il cerotto di *Galeno*, ec. Non faremo parola in questo luogo dei pedignoni, e d'altri mali cutanei comuni a tutte l'età, e che abbiamo trattati altrove.

Finalmente noi termineremo il presente Articolo, e questo Trattato con un male non gran fatto noto in Europa, prodotto da insetti, che investono la pelle dei fanciulli: questi si chiamano *Crinoni*, per non esser più grossi del capello: affomiglianti molto ai vermi del formaggio, se non più, come si pretende, perchè hanno la testa nera: si generano nella pelle delle braccia, delle gambe, e della schiena dei bambini lattanti, che ne patiscono orridi pizzicori, vigilie, e che poscia precipitano nell'atrofia. Vi sono felicemente applicati i bagni, poichè rilasciando la pelle, favoriscono l'uscita di questi insetti. Si stropicciano le parti infette col miele, per richiamargli fuori; quindi si tolgon via con grandissima pazienza, dopo d'aver forate, o distrutte in qualunque altra guisa le picciolissime vescichette, che gli racchiudono. Le fregagioni, o le lavande mercuriali possono in questo caso molto giovare: quello è per avventura il mezzo più spedito per distruggerli totalmente: del rimandnte si praticano in questa occasione i rimedj da noi proposti per l'atrofia, ch'è, come additammo, la conseguenza del male, di cui parliamo. Si danno parimente altri insetti, meno rari dei precedenti, che diconsi *Cironi*: son questi una specie di vermi pediculari, che si trovano in varie specie di pustule purulente, ove cagionano orrido pizzicore: l'olio, e lo zolfo sono topici nati fatti per distruggerli, e quelli altresì, che vengono più impiegati.

I L F I N E.

TA-

TAVOLA

DELLE MATERIE

Contenute nel secondo Tomo.

A		matrice.	
A Bordo .	197	Cancrena esterna .	132
<i>Abscesso esterno .</i>	8	dello scroto .	122
<i>al seno .</i>	238	Cancro .	23
<i>Affezione isterica .</i>	207	delle labbra .	90
<i>Afie .</i>	93	della bocca .	92
<i>cancerenosa .</i>	101	delle poppe .	209
<i>dei fanciulli .</i>	245	delle parti genitali .	113
<i>Ammaccatura .</i>	156	della matrice .	213
<i>Ancilosi .</i>	147	Carbonchio .	18
<i>Aneurisma esterno .</i>	28	Carie .	149
<i>per la cavata del sangue .</i>	143	Carnosità dell' uretra .	117
<i>Angina .</i>	100	Cataratta .	77
<i>convulsiva .</i>	102	Cavata di sangue , suoi acci-	
<i>cancerenosa .</i>	101	denti .	143
<i>Annodatura dei fanciulli .</i>	229	Cefalalgia .	54
<i>Ano , suoi mali .</i>	126	Celico dei fanciulli .	230
<i>Api , lor puntura .</i>	39	Chiodo , vedi furunculo .	162
<i>Appetito depravato .</i>	183	<i>rico .</i>	
<i>Arrosia generale .</i>	2	Cironi .	155. 240. e 259
<i>delle estremità .</i>	135	Collica dei fanciulli .	236
<i>dei fanciulli .</i>	228	delle puerpere .	200
B		Colostrazione .	226
B Asso-ventre gonfiato dei		Commozione .	60
<i>fanciulli .</i>	241	Concepimento .	193
<i>Bellico tumefatto dei fanciul-</i>		Condiloma delle parti geni-	
<i>li .</i>	242	<i>tali .</i>	112
<i>Bocca storta .</i>	89	dell' ano .	132
<i>suoi mali .</i>	90	Confunzione .	2
<i>Borsa gonfiata dei fanciulli .</i>	230	Contrazione delle membra .	135
<i>Broncocele .</i>	64	Contusione .	44
<i>Bubbone .</i>	15	Convulsioni dei fanciulli .	243
<i>Bubonoccele .</i>	107	Corni .	33
C		Corso di ventre . V. diarrea .	
C Aduta dell' ano .	132	Costipazione dei fanciulli .	238
<i>nei fanciulli .</i>	243	Cranio , sua depressione .	60
<i>dell' uvola .</i>	96	sua frattura .	ivi .
<i>della vagina , e della</i>		Creste delle parti genitali .	112
		<i>dell'</i>	

dell' ano.	132
Crinoni.	259
Cristallino.	112
Crosta di latte.	254

D

D Eglutizione difficile.	96
Dentificazione.	246
Diarrea colliquativa.	4
della gravidanza.	197
delle puerpere.	199
dei fanciulli.	237

Difficoltà d' inghiottire.	97
Dignagnar dei denti.	95
Discese.	107
dei fanciulli.	241
Dissenteria de' fanciulli.	237
Dolor di testa.	54
d' orecchie.	85
di denti.	94
Dolori colici. V. Colica. Dis-	
senteria.	

E

E Chimosi.	156
Edema.	21
Elefantiasi.	193
Emaciamento.	2
Emorragia.	6
del naso.	81
della verga.	121
della matrice.	190
delle puerpere.	199
Emorroidi.	126
sopresse.	130
bianche.	131
dei fanciulli.	25
Enfisema.	21
Enterocolo.	107
Ernia.	ivi.
ventosa.	125
carnosa.	126
varicosa.	125
della vescica.	188
della matrice.	110
dei fanciulli.	242

Epilesia de' fanciulli.	243
Epinitidi.	20
Epiplonfale.	109
Esantema.	156
Escoriazione.	49
dei fanciulli.	258
Esfrescenze.	34
Esonfale.	109
dei fanciulli.	242
Esofosi.	148

F

F alsa angina.	101
Falso parto.	215
Falsa gravidanza.	214
pleuritide.	105
squinzia.	99
nephritide.	106
gonorrea.	115
Febbre isterica.	178
lenta.	3
resipelacea.	164
scarlattina.	166
del latte.	204
de' fanciulli.	227
miliare.	206
Feto morto.	198
Fiato ferente.	100
Fichi all' ano.	132
Fimosi.	112
Fistola.	11
lagrimale.	71
all' ano.	127
Flati de' fanciulli.	241
Flemmone.	8
Flitteni.	22
Flogosi esterna.	8
Frattura.	146
del cranio.	60
Fluor bianco.	220
Flusso epatico.	155
emorroidale.	128
menstruale.	185
vaginale.	189
de' lochi.	201

del-

della bocca .	94
resipelaceo .	164
Fuoco salvarico .	254
Furore uterino .	209
Furunculo .	20

G

G Anglione .	31
Gattoni .	63. 101
Geloni .	140
Gengive , loro mali .	90
Gonorrea .	115
semplice .	119
falsa .	120
Genorrea esterna .	119
per la birra .	221
delle donne .	210
Gottarosa .	65
serena .	78
Gozzo .	64
Grassezza eccessiva .	1
Gravidanza , suoi segni .	193
suoi mali .	ivi .
Gusto depravato .	183

I

I Datidi delle palpebre .	68
Idrocele .	123
falso .	124
Idrocefalo .	248
Idronfalo .	110
Idrofobia .	40
Idropisia della matrice .	218
de' fanciulli .	229
de' ovaje .	219
Impotenza .	115
Infiammazione della matrice .	211
esterna .	8
della gola .	99
del seno .	205
dello scroto .	122
Intollamento delle palpebre .	67
Incubo .	223
Insolazione .	58
Ipogastrocele .	111

I popion .	73
Iscuria delle Donne gravide .	196
de' fanciulli .	242
Istericismo .	
literizia de' fanciulli .	229

L

L Agrimamento .	700
Latte : sconcerti del latte .	2365
stravasato .	204
Lebbra .	162
Lebbra , loro mali .	90
Lochj soppressi .	201
troppo copiosi .	203
Lombrichi .	240
Lombaggine .	106
Lupe .	31
Lupo , ulcera alle gambe .	24
Lussazione .	146
osso sesamoide .	145

M

M Agrezza .	2
Mal di ventura .	139
di gola .	101
di gola cancrenoso .	ivi .
Male di coscia .	251
Mal del castrone .	233
Mammelle , loro mali .	207
loro strivamento pel latte .	204
Mandorle , loro mali .	92
Marasmo .	2
de' fanciulli .	228
Marcia , sua formazione .	8
Meconio ritenuto .	236
Menstrui soppressi .	186
diminuiti .	188
irregolari .	ivi .
difficiliosi .	189
trasmodati .	190
sregolati .	185
Micrania .	55
Mala : sue specie .	215
Morbo pedicolare .	154

Morpioni, o piattoni.	ivi.	Polipo del naso.	84
Morso degli animali velenosi.	35	della matrice.	213
arrabbiati.	36	Porpora rossa, e paonazza.	158
Mucco emorroidale.	131	rilevata.	ivi.
Muso leprino.	90	Porri.	33
N		delle parti genitali.	113
Nausee, v. Vomito.		dell' ano.	126
Naso, suoi mali.	80	Prapismo.	114
Nodo, v. Ganglione.		Prurito.	159
della verga.	113	Ptialismo.	94
Nutrici, loro mali.	205	Puntura del tendine.	144
O		dell' arteria.	145
Orefusa.	1	degli animali velenosi.	36
Occhi loro mali.	67	Puzzore della bocca.	100
Odontalgia.	94	del sudore.	152
Oftalmia.	72	de' piedi.	146
Operazione Cesarea.	198	R	
Orecchie, loro mali.	85	Rabbia.	40
Orzajolo.	68	dei cani.	ivi.
Ossa, loro mali.	146	Rachitide.	250
Ostruzioni dell' esofago.	99	Ranula.	91
Ozzena.	83	Ragade delle parti genitali.	114
P		dell' ano.	133
Pallidi colori.	184	Ragno sua puntura.	39
Palpebre, lor mali.	67	Regole. v. menstrui.	
Parafimosi.	112	Resipola.	164
Paralisi dell' esofago.	96	bollata.	ivi.
della bocca.	89	Reuma del cervello.	80
delle palpebre.	67	de' fanciulli.	233
Pavoride.	62	Reumatismo dell' addome.	106
Parti genitali, loro mali.	112	de' lombi.	ivi.
Parto difficile.	196	Ribollimento.	157
suo termine.	197	Riscaldamento.	ivi.
Passione isterica.	177	degli occhi.	67
Patereccio.	138. 139	Riso sardonico.	89
Pelle, suoi mali.	152. 254	Ritensione della secondina.	201
sue macchie.	155	de' menstrui.	217. 218
Perdita di sangue. v. Emorragia.		Rogna.	160
Pierre ne' fanciulli.	242	lebbrosa.	162
Piaghe.	44	de' fanciulli.	240
Pidocchi.	154	Rosolia.	167
Pleuritide spuria.	105	Rossori.	155
Pneumatocele.	125	Roversciamento delle palpe-	
Polluzione notturna.	121	bre.	67

S

S Alivazione.	94
Sangue del naso.	81
Sarcocele.	125
Sarcoma.	33
degli occhi.	69
Scarlattina.	166
Sciatica.	207
Scirro esterno.	23
al seno.	208
alla matrice.	212
Scolamento.	115
incordato.	116
caduto nello scroto.	ivi.
delle donne.	220
Scottatura.	49
pel fulmine.	50
Scorpione, sua puntura.	38
Scorbuto de' fanciulli.	231
Scroto. v. borsa.	
Scrofole de' fanciulli.	232
Screpoli.	91
delle mammelle.	206
delle parti genitali.	113
delle gravide.	196
dei fanciulli.	259
Secondina ritenuta.	201
Sete febbrile.	96
Sfogliamento delle ossa.	150
Sfacelo.	52
Soppressione delle emorroidi.	130
de' menstui.	186
de' lochi.	201
del sudore.	152
Sordità.	87
Spasmo cinico.	89
Spina ventosa.	151
Spinanzia.	101
Sternuto.	80
Storcimento del piede.	145
dei lombi.	106
Storticare.	49

de' fanciulli.

Stafiloma.	74
Sterilità.	111
Sudore, suoi vizj.	152
ferente.	161
emorroidale.	131
delle Donne gravide.	195
de' piedi.	154
Superfetazione.	194
Suppurazione esterna.	99

T

T Acche dell'occhio.	766
della pelle.	155
Tarantismo.	400
Tigna.	254
Tosse de' fanciulli.	233
Trombo.	143
Tumori infaccati.	311
di grasso.	107
bianchi.	137
linfatici.	32
Tuono, sua scottatura.	500

V

V Apori.	178
Varici.	288
Varicocele.	125
Vajuolo de' fanciulli.	171
volante.	173
Venti della matrice.	217
Ventre gonfio dei fanciulli.	241
Vermi de' fanciulli.	239
Vespe, lor puntura.	399
Vipera, suo morso.	377
Voglie delle Donne gravide.	184
Volatiche.	158
Vomito de' fanciulli.	235
Ultera della matrice.	213
esterna.	114
delle narici.	83
della bocca.	92
delle articolazioni.	137
delle parti genitali.	114
Uvola rilasciata.	96

